
A BMI
Experimental
Control
Mean Difference
Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Random, 95% CI
IV, Random, 95% CI
Chen 2003, after 12 mo 23.3 2.2 39 25.1 3.4 39 19.4% -1.80 [-3.07, -0.53]
Liu 2013, after 12 mo 25.5 1.3 33 25.9 1.4 30 30.4% -0.40 [-1.07, 0.27]
Mooijaart 2019, after 12 mo 27.6 4.4 90 27.1 3.9 121 21.4% 0.50 [-0.64, 1.64]
Stott 2017, after 12 mo 27.9 5.1 318 27.7 4.6 320 28.7% 0.20 [-0.55, 0.95]
Total (95% CI) 480 510 100.0% -0.31 [-1.10, 0.48]
Heterogeneity: Tau² = 0.42; Chi² = 8.92, df = 3 (P = 0.03); I² = 66%
Test for overall effect: Z = 0.76 (P = 0.45)
-10 -5 0 5 10
Favours [experimental] Favours [control]
B Systolic blood pressure
Experimental
Control
Mean Difference
Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI
IV, Fixed, 95% CI
Liu 2013, after 12 mo 129 8 33 130 9 30 26.1% -1.00 [-5.22, 3.22]
Mooijaart 2019, after 12 mo 141.3 19 90 142.6 20.7 122 16.1% -1.30 [-6.68, 4.08]
Stott 2017, after 12 mo 138.3 18.7 318 138.4 17.8 320 57.9% -0.10 [-2.93, 2.73]
Total (95% CI) 441 472 100.0% -0.53 [-2.68, 1.63]
Heterogeneity: Chi² = 0.21, df = 2 (P = 0.90); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.48 (P = 0.63)
-20 -10 0 10 20
Favours [experimental] Favours [control]
C Diastolic blood pressure
Experimental
Control
Mean Difference
Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI
IV, Fixed, 95% CI
Liu 2013, after 12 mo 79 6 33 80 5 30 24.4% -1.00 [-3.72, 1.72]
Mooijaart 2019, after 12 mo 68.7 11.9 90 69.6 12.5 122 16.4% -0.90 [-4.21, 2.41]
Stott 2017, after 12 mo 72.8 11.4 318 73.5 11.1 320 59.2% -0.70 [-2.45, 1.05]
Total (95% CI) 441 472 100.0% -0.81 [-2.15, 0.54]
Heterogeneity: Chi² = 0.04, df = 2 (P = 0.98); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.18 (P = 0.24)
-10 -5 0 5 10
Favours [experimental] Favours [control]