


Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	0.0%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	4.2%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	4.1%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	13.8%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	6.4%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	6.9%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**91**			**91**	**35.4%**	**0.13 [-3.95, 4.21]**
Heterogeneity: Tau² = 8.58; Chi² = 6.72, df = 4 (P = 0.15); I² = 40%								
Test for overall effect: Z = 0.06 (P = 0.95)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	11.3%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	21.1%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	15.6%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	10.6%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	6.0%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**122**			**122**	**64.6%**	**-0.63 [-2.94, 1.68]**
Heterogeneity: Tau² = 1.54; Chi² = 5.13, df = 4 (P = 0.27); I² = 22%								
Test for overall effect: Z = 0.53 (P = 0.59)								
Total (95% CI)			**213**			**213**	**100.0%**	**-0.40 [-2.38, 1.59]**
Heterogeneity: Tau² = 2.39; Chi² = 11.91, df = 9 (P = 0.22); I² = 24%								
Test for overall effect: Z = 0.39 (P = 0.69)								
Test for subgroup differences: Chi² = 0.10, df = 1 (P = 0.75), I² = 0%								




Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	8.7%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	0.0%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	5.2%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	12.6%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	7.3%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	7.8%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**83**			**83**	**41.6%**	**-1.45 [-6.60, 3.70]**
Heterogeneity: Tau² = 22.58; Chi² = 12.25, df = 4 (P = 0.02); I² = 67%								
Test for overall effect: Z = 0.55 (P = 0.58)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	11.1%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	16.1%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	13.6%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	10.7%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	7.0%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**122**			**122**	**58.4%**	**-0.63 [-2.94, 1.68]**
Heterogeneity: Tau² = 1.54; Chi² = 5.13, df = 4 (P = 0.27); I² = 22%								
Test for overall effect: Z = 0.53 (P = 0.59)								
Total (95% CI)			**205**			**205**	**100.0%**	**-0.87 [-3.28, 1.54]**
Heterogeneity: Tau² = 6.92; Chi² = 17.79, df = 9 (P = 0.04); I² = 49%								
Test for overall effect: Z = 0.71 (P = 0.48)								
Test for subgroup differences: Chi² = 0.08, df = 1 (P = 0.77), I² = 0%								




Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	8.7%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	5.1%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	0.0%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	12.6%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	7.3%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	7.8%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**82**			**82**	**41.5%**	**-1.00 [-6.10, 4.11]**
Heterogeneity: Tau² = 22.06; Chi² = 12.07, df = 4 (P = 0.02); I² = 67%								
Test for overall effect: Z = 0.38 (P = 0.70)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	11.1%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	16.2%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	13.6%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	10.6%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	6.9%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**122**			**122**	**58.5%**	**-0.63 [-2.94, 1.68]**
Heterogeneity: Tau² = 1.54; Chi² = 5.13, df = 4 (P = 0.27); I² = 22%								
Test for overall effect: Z = 0.53 (P = 0.59)								
Total (95% CI)			**204**			**204**	**100.0%**	**-0.72 [-3.11, 1.66]**
Heterogeneity: Tau² = 6.64; Chi² = 17.44, df = 9 (P = 0.04); I² = 48%								
Test for overall effect: Z = 0.60 (P = 0.55)								
Test for subgroup differences: Chi² = 0.02, df = 1 (P = 0.90), I² = 0%								




Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	9.4%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	5.6%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	5.6%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	0.0%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	7.9%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	8.4%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**64**			**64**	**36.9%**	**-0.83 [-6.66, 4.99]**
Heterogeneity: Tau² = 28.54; Chi² = 11.57, df = 4 (P = 0.02); I² = 65%								
Test for overall effect: Z = 0.28 (P = 0.78)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	12.0%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	17.4%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	14.7%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	11.5%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	7.5%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**122**			**122**	**63.1%**	**-0.63 [-2.94, 1.68]**
Heterogeneity: Tau² = 1.54; Chi² = 5.13, df = 4 (P = 0.27); I² = 22%								
Test for overall effect: Z = 0.53 (P = 0.59)								
Total (95% CI)			**186**			**186**	**100.0%**	**-0.53 [-3.03, 1.97]**
Heterogeneity: Tau² = 6.88; Chi² = 16.71, df = 9 (P = 0.05); I² = 46%								
Test for overall effect: Z = 0.42 (P = 0.68)								
Test for subgroup differences: Chi² = 0.00, df = 1 (P = 0.95), I² = 0%								




Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	8.3%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	4.5%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	4.5%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	13.4%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	0.0%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	7.3%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**80**			**80**	**37.9%**	**-2.99 [-6.97, 0.99]**
Heterogeneity: Tau² = 8.21; Chi² = 6.77, df = 4 (P = 0.15); I² = 41%								
Test for overall effect: Z = 1.47 (P = 0.14)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	11.3%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	19.0%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	14.8%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	10.7%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	6.3%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**122**			**122**	**62.1%**	**-0.63 [-2.94, 1.68]**
Heterogeneity: Tau² = 1.54; Chi² = 5.13, df = 4 (P = 0.27); I² = 22%								
Test for overall effect: Z = 0.53 (P = 0.59)								
Total (95% CI)			**202**			**202**	**100.0%**	**-1.45 [-3.57, 0.67]**
Heterogeneity: Tau² = 3.70; Chi² = 13.59, df = 9 (P = 0.14); I² = 34%								
Test for overall effect: Z = 1.34 (P = 0.18)								
Test for subgroup differences: Chi² = 1.01, df = 1 (P = 0.31), I² = 1.4%								




Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	8.7%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	5.1%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	5.0%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	13.1%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	7.3%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	0.0%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**80**			**80**	**39.2%**	**-2.42 [-7.25, 2.41]**
Heterogeneity: Tau² = 17.10; Chi² = 9.64, df = 4 (P = 0.05); I² = 59%								
Test for overall effect: Z = 0.98 (P = 0.33)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	11.4%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	17.3%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	14.3%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	10.9%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	6.9%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**122**			**122**	**60.8%**	**-0.63 [-2.94, 1.68]**
Heterogeneity: Tau² = 1.54; Chi² = 5.13, df = 4 (P = 0.27); I² = 22%								
Test for overall effect: Z = 0.53 (P = 0.59)								
Total (95% CI)			**202**			**202**	**100.0%**	**-1.24 [-3.57, 1.09]**
Heterogeneity: Tau² = 5.67; Chi² = 15.99, df = 9 (P = 0.07); I² = 44%								
Test for overall effect: Z = 1.04 (P = 0.30)								
Test for subgroup differences: Chi² = 0.43, df = 1 (P = 0.51), I² = 0%								




Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	9.3%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	5.6%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	5.5%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	13.4%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	7.8%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	8.3%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**96**			**96**	**49.9%**	**-1.42 [-5.85, 3.00]**
Heterogeneity: Tau² = 17.47; Chi² = 12.29, df = 5 (P = 0.03); I² = 59%								
Test for overall effect: Z = 0.63 (P = 0.53)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	0.0%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	17.0%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	14.4%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	11.3%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	7.4%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**95**			**95**	**50.1%**	**-0.73 [-3.60, 2.13]**
Heterogeneity: Tau² = 3.13; Chi² = 4.76, df = 3 (P = 0.19); I² = 37%								
Test for overall effect: Z = 0.50 (P = 0.62)								
Total (95% CI)			**191**			**191**	**100.0%**	**-1.05 [-3.55, 1.45]**
Heterogeneity: Tau² = 7.09; Chi² = 17.25, df = 9 (P = 0.04); I² = 48%								
Test for overall effect: Z = 0.82 (P = 0.41)								
Test for subgroup differences: Chi² = 0.07, df = 1 (P = 0.80), I² = 0%								




Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	9.9%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	6.1%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	6.0%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	13.8%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	8.4%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	8.9%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**96**			**96**	**53.1%**	**-1.42 [-5.85, 3.00]**
Heterogeneity: Tau² = 17.47; Chi² = 12.29, df = 5 (P = 0.03); I² = 59%								
Test for overall effect: Z = 0.63 (P = 0.53)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	12.3%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	0.0%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	14.7%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	11.9%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	8.0%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**95**			**95**	**46.9%**	**0.24 [-2.72, 3.19]**
Heterogeneity: Tau² = 2.08; Chi² = 3.88, df = 3 (P = 0.28); I² = 23%								
Test for overall effect: Z = 0.16 (P = 0.88)								
Total (95% CI)			**191**			**191**	**100.0%**	**-0.62 [-3.29, 2.05]**
Heterogeneity: Tau² = 8.40; Chi² = 17.25, df = 9 (P = 0.04); I² = 48%								
Test for overall effect: Z = 0.46 (P = 0.65)								
Test for subgroup differences: Chi² = 0.37, df = 1 (P = 0.54), I² = 0%								




Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	9.6%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	5.8%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	5.8%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	13.6%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	8.1%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	8.6%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**96**			**96**	**51.5%**	**-1.42 [-5.85, 3.00]**
Heterogeneity: Tau² = 17.47; Chi² = 12.29, df = 5 (P = 0.03); I² = 59%								
Test for overall effect: Z = 0.63 (P = 0.53)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	12.1%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	17.1%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	0.0%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	11.6%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	7.7%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**90**			**90**	**48.5%**	**0.10 [-2.73, 2.94]**
Heterogeneity: Tau² = 2.40; Chi² = 4.16, df = 3 (P = 0.24); I² = 28%								
Test for overall effect: Z = 0.07 (P = 0.94)								
Total (95% CI)			**186**			**186**	**100.0%**	**-0.61 [-3.18, 1.96]**
Heterogeneity: Tau² = 7.59; Chi² = 17.25, df = 9 (P = 0.04); I² = 48%								
Test for overall effect: Z = 0.46 (P = 0.64)								
Test for subgroup differences: Chi² = 0.32, df = 1 (P = 0.57), I² = 0%								



Study or Subgroup	Nitrate Mean	SD	Total	Placebo Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic								
Baião et al. 2019	83.5	4.8	5	92.3	5.4	5	8.7%	-8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1]	77	12	13	78	12	13	4.8%	-1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2]	84	13	14	88	12	14	4.8%	-4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015	80	9	32	83.4	9	32	13.8%	-3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1]	91.6	9.2	16	85.4	11.6	16	7.1%	6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2]	90.3	8	16	86.9	11.6	16	7.6%	3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI)			**96**			**96**	**46.8%**	**-1.42 [-5.85, 3.00]**
Heterogeneity: Tau² = 17.47; Chi² = 12.29, df = 5 (P = 0.03); I² = 59%								
Test for overall effect: Z = 0.63 (P = 0.53)								
1.2.2 Ambulatory								
Bondonno et al. 2015	74.4	9.606	27	73.8	9.3532	27	11.8%	0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013	75.5	4.8	27	77.7	6.6	27	19.4%	-2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015	80.2	8.5	32	82.8	7.875	32	15.3%	-2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018	83	9	20	79	8	20	0.0%	4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020	89.8	10.72	16	89.45	11.04	16	6.7%	0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI)			**102**			**102**	**53.2%**	**-1.62 [-3.73, 0.49]**
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 1.37, df = 3 (P = 0.71); I² = 0%								
Test for overall effect: Z = 1.51 (P = 0.13)								
Total (95% CI)			**198**			**198**	**100.0%**	**-1.51 [-3.70, 0.69]**
Heterogeneity: Tau² = 3.98; Chi² = 13.68, df = 9 (P = 0.13); I² = 34%								
Test for overall effect: Z = 1.35 (P = 0.18)								
Test for subgroup differences: Chi² = 0.01, df = 1 (P = 0.94), I² = 0%								




Nitrate
Placebo
Mean Difference
Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Random, 95% CI
IV, Random, 95% CI
1.2.1 Clinic
Baião et al. 2019 83.5 4.8 5 92.3 5.4 5 8.9% -8.80 [-15.13, -2.47]
Broxterman et al. 2019 [1] 77 12 13 78 12 13 5.3% -1.00 [-10.23, 8.23]
Broxterman et al. 2019 [2] 84 13 14 88 12 14 5.3% -4.00 [-13.27, 5.27]
Kapil et al. 2015 80 9 32 83.4 9 32 12.8% -3.40 [-7.81, 1.01]
Siervo et al. 2020 [1] 91.6 9.2 16 85.4 11.6 16 7.5% 6.20 [-1.05, 13.45]
Siervo et al. 2020 [2] 90.3 8 16 86.9 11.6 16 8.0% 3.40 [-3.50, 10.30]
Subtotal (95% CI) 96 96 47.6% -1.42 [-5.85, 3.00]
Heterogeneity: Tau² = 17.47; Chi² = 12.29, df = 5 (P = 0.03); I² = 59%
Test for overall effect: Z = 0.63 (P = 0.53)
1.2.2 Ambulatory
Bondonno et al. 2015 74.4 9.606 27 73.8 9.3532 27 11.3% 0.60 [-4.46, 5.66]
Gilchrist et al. 2013 75.5 4.8 27 77.7 6.6 27 16.4% -2.20 [-5.28, 0.88]
Kapil et al. 2015 80.2 8.5 32 82.8 7.875 32 13.8% -2.60 [-6.61, 1.41]
Kerley et al. 2018 83 9 20 79 8 20 10.8% 4.00 [-1.28, 9.28]
Siervo et al. 2020 89.8 10.72 16 89.45 11.04 16 0.0% 0.35 [-7.19, 7.89]
Subtotal (95% CI) 106 106 52.4% -0.59 [-3.32, 2.14]
Heterogeneity: Tau² = 3.11; Chi² = 5.02, df = 3 (P = 0.17); I² = 40%
Test for overall effect: Z = 0.42 (P = 0.67)
Total (95% CI) 202 202 100.0% -0.96 [-3.39, 1.47]
Heterogeneity: Tau² = 6.92; Chi² = 17.62, df = 9 (P = 0.04); I² = 49%
Test for overall effect: Z = 0.78 (P = 0.44)
Test for subgroup differences: Chi² = 0.10, df = 1 (P = 0.75), I² = 0%
-10 -5 0 5 10
Favours [Nitrate] Favours [Placebo]