
A

| Study or Subgroup | pre surgery Mean | SD | Total | post surgery Mean | SD | Total | Weight | Mean Difference IV, Random, 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asano1 2001 | 3,243 | 1,463 | 8 | 10.9 | 4.58 | 8 | 2.5% | 3232.10 [2218.31, 4245.89] |
| Kiyoshi 1984 | 519 | 152 | 12 | 9.2 | 1.4 | 12 | 15.9% | 509.80 [423.80, 595.80] |
| Michael 2009 | 374 | 92 | 176 | 87 | 17 | 176 | 16.6% | 287.00 [273.18, 300.82] |
| Naguib1 1986 | 98 | 75 | 45 | 29 | 21 | 45 | 16.5% | 69.00 [46.24, 91.76] |
| Naguib2 1986 | 142 | 87 | 26 | 23 | 14 | 26 | 16.5% | 119.00 [85.13, 152.87] |
| Naguib3 1986 | 333 | 202 | 17 | 104 | 121 | 17 | 15.5% | 229.00 [117.07, 340.93] |
| Winnie 2018 | 3,627.05 | 31 | 184 | 265 | 31 | 0 | | Not estimable |
| Xin 2011 | 974.6 | 181.1 | 87 | 243.6 | 43.1 | 87 | 16.4% | 731.00 [691.88, 770.12] |
| **Total (95% CI)** | | | **555** | | | **371** | **100.0%** | **396.80 [222.33, 571.27]** |

Heterogeneity: Tau² = 47786.96; Chi² = 974.47, df = 6 (P < 0.00001); I² = 99%
Test for overall effect: Z = 4.46 (P < 0.00001)




B

| Study or Subgroup | pre DA Mean | SD | Total | post DA Mean | SD | Total | Weight | Mean Difference IV, Random, 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert 1992 | 1,569 | 1,906 | 29 | 439 | 601 | 29 | 0.6% | 1130.00 [402.63, 1857.37] |
| Alessandro 2013 | 3,715 | 5,718 | 43 | 529 | 712 | 43 | 0.1% | 3186.00 [1463.74, 4908.26] |
| Annamaria1 2004 | 1,517 | 1,523 | 20 | 5.8 | 3.7 | 20 | 0.7% | 1511.20 [843.73, 2178.67] |
| Annamaria2 2004 | 2,019 | 2,123 | 41 | 17 | 29 | 41 | 0.8% | 2002.00 [1352.10, 2651.90] |
| Annamaria3 2004 | 182 | 62.8 | 10 | 9.74 | 12.17 | 10 | 8.8% | 172.26 [132.61, 211.91] |
| Arijit1 2005 | 564.6 | 421.9 | 15 | 48.5 | 29.8 | 15 | 4.2% | 516.10 [302.06, 730.14] |
| Arijit2 2005 | 2,913.1 | 1,146.8 | 14 | 35.5 | 34 | 14 | 0.9% | 2877.60 [2276.62, 3478.58] |
| Asano2 2001 | 4,450 | 2,007 | 5 | 20.6 | 8.44 | 5 | 0.1% | 4429.40 [2670.20, 6188.60] |
| Bhansali 2010 | 6,249.3 | 3,259.3 | 15 | 46.9 | 14.9 | 15 | 0.1% | 6202.40 [4552.98, 7851.82] |
| Cannavo1 1999 | 193.8 | 23.4 | 26 | 11.1 | 1.6 | 26 | 9.2% | 182.70 [173.68, 191.72] |
| Cannavo2 1999 | 407.8 | 98.3 | 11 | 11.1 | 1.11 | 11 | 8.4% | 396.70 [338.61, 454.79] |
| Christine1 2016 | 91.3 | 95.8 | 27 | 16.4 | 18.8 | 27 | 8.9% | 74.90 [38.08, 111.72] |
| Christine2 2016 | 44.2 | 16.2 | 30 | 87 | 221.8 | 30 | 7.9% | -42.80 [-122.38, 36.78] |
| Corsello 2003 | 5,794 | 1,996 | 10 | 77 | 38 | 10 | 0.2% | 5717.00 [4479.66, 6954.34] |
| Eun-Hee 2009 | 11,426 | 3,666 | 10 | 109 | 68 | 10 | 0.1% | 11317.00 [9044.44, 13589.56] |
| Ilan 2007 | 10,006.3 | 6,582.6 | 10 | 12.7 | 7.2 | 10 | 0.0% | 9993.60 [5913.73, 14073.47] |
| Maria 2015 | 119 | 57 | 29 | 16 | 5.7 | 29 | 9.1% | 103.00 [82.15, 123.85] |
| Midhat1 2013 | 1,290 | 1,342 | 20 | 5.9 | 0.6 | 20 | 0.9% | 1284.10 [695.95, 1872.25] |
| Midhat2 2013 | 169.2 | 32.3 | 10 | 5.6 | 3.6 | 10 | 9.1% | 163.60 [143.46, 183.74] |
| Myoung1 2017 | 219.2 | 460.6 | 30 | 5 | 5.1 | 30 | 5.4% | 214.20 [49.37, 379.03] |
| Myoung2 2017 | 936.5 | 1,947 | 59 | 4.2 | 4.6 | 59 | 1.2% | 932.30 [435.49, 1429.11] |
| Panagiotis 2011 | 165 | 26 | 79 | 12.2 | 2.3 | 79 | 9.2% | 152.80 [147.04, 158.56] |
| Renata 2013 | 789.3 | 239.3 | 61 | 8.4 | 10.1 | 61 | 8.4% | 780.90 [720.79, 841.01] |
| Renata 2015 | 2,028.1 | 4,407.7 | 32 | 8.6 | 11.3 | 32 | 0.1% | 2019.50 [492.33, 3546.67] |
| Sema1 2018 | 793 | 1,743 | 257 | 22 | 41 | 257 | 4.2% | 771.00 [557.84, 984.16] |
| Sema2 2018 | 1,062 | 1,705 | 51 | 41 | 91 | 51 | 1.4% | 1021.00 [552.40, 1489.60] |
| Shrikrishna 2010 | 10,789 | 14,278 | 10 | 541.7 | 1,272.3 | 10 | 0.0% | 10247.30 [1362.80, 19131.80] |
| **Total (95% CI)** | | | **954** | | | **954** | **100.0%** | **375.26 [316.21, 434.31]** |

Heterogeneity: Tau² = 9865.07; Chi² = 1076.78, df = 26 (P < 0.00001); I² = 98%
Test for overall effect: Z = 12.46 (P < 0.00001)

