

Experimental
Control
Std. Mean Difference
Std. Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Random, 95% CI
IV, Random, 95% CI
1.2.1 ketamine
Cai 2013 13 2.83 8 8.5 2.55 8 7.2% 1.58 [0.41, 2.74]
Mehmet 2009 -2.79 1.63 6 -9.25 2.96 6 5.6% 2.50 [0.83, 4.16]
Subtotal (95% CI) 14 14 12.8% 1.88 [0.93, 2.84]
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 0.78, df = 1 (P = 0.38); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 3.86 (P = 0.0001)
1.2.2 isoflurane
Dong 2016 11.75 0.88 39 8 0.58 37 8.0% 4.95 [4.03, 5.88]
Subtotal (95% CI) 39 37 8.0% 4.95 [4.03, 5.88]
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 10.49 (P < 0.00001)
1.2.3 pentobarbital
Cao 2017 12.17 0.69 24 10.36 0.66 24 8.4% 2.64 [1.85, 3.43]
Chen 2015 13.65 0.8 20 11.37 0.5 17 7.7% 3.28 [2.26, 4.30]
Chen1 2014 12.88 0.73 25 11.43 0.67 24 8.7% 2.03 [1.33, 2.73]
Chen2 2014 12.92 1.35 24 11.35 0.94 24 8.9% 1.33 [0.70, 1.96]
Shi 2018（1） 13.92 0.4 18 12.68 0.45 18 7.9% 2.85 [1.89, 3.80]
Shi 2018（2） 14.15 0.62 18 12.68 0.45 18 8.0% 2.65 [1.73, 3.57]
Shi 2018（3） 14.58 2.23 12 12.75 2.26 12 8.3% 0.79 [-0.05, 1.62]
Yu 2017（1） 16 1.2 26 13 0.75 30 8.5% 3.01 [2.23, 3.79]
Yu 2017（2） 12.24 0.68 24 10.33 0.68 24 8.4% 2.76 [1.95, 3.57]
Zhao 2017 14.07 0.76 6 10.43 1.14 6 4.6% 3.47 [1.43, 5.50]
Subtotal (95% CI) 197 197 79.2% 2.39 [1.86, 2.92]
Heterogeneity: Tau² = 0.52; Chi² = 33.95, df = 9 (P < 0.0001); I² = 73%
Test for overall effect: Z = 8.82 (P < 0.00001)
Total (95% CI) 250 248 100.0% 2.56 [1.97, 3.16]
Heterogeneity: Tau² = 0.94; Chi² = 66.08, df = 12 (P < 0.00001); I² = 82%
Test for overall effect: Z = 8.41 (P < 0.00001)
Test for subgroup differences: Chi² = 26.63, df = 2 (P < 0.00001), I² = 92.5%
-4
-2
0
2
4
Favours [experimental]
Favours [control]