

Statins
Fibrates
Mean Difference
Mean Difference
Study or Subgroup
Mean [% change]
SD [% change]
Total
Mean [% change]
SD [% change]
Total
Weight
IV, Fixed, 95% CI [% change]
IV, Fixed, 95% CI [% change]
No imputation
Jones 2009 -36.4738 13.5133 634 -13.5 13.0673 242 13.2% -22.97 [-24.93, -21.02]
Goldberg 2009 -32.9391 13.7416 266 -10.1 13.4614 104 5.4% -22.84 [-25.91, -19.77]
Sweany 1995 -24.5 13.5 76 -8.1 14.3 84 2.7% -16.40 [-20.71, -12.09]
Roth 2010 -25 13.0403 241 -10.3 12.7115 229 9.3% -14.70 [-17.03, -12.37]
Mohiuddin 2009 -26.5437 13.9514 284 -12.4 12.7562 113 6.2% -14.14 [-17.00, -11.29]
Ziegler 1990 -29 9 92 -19 13 92 4.8% -10.00 [-13.23, -6.77]
Greten 1994 -18 10.76 64 -13.2 11.54 66 3.4% -4.80 [-8.63, -0.97]
Subtotal (95% CI) 1657 930 45.1% -16.86 [-17.92, -15.80]
Heterogeneity: Chi² = 114.34, df = 6 (P < 0.00001); I² = 95%
Test for overall effect: Z = 31.23 (P < 0.00001)
Imputed SD
Tikkanen 1988 -30.2067 13.95 164 -14.0537 13.46 164 5.7% -16.15 [-19.12, -13.19]
Sanchez 1991 -26 13.95 19 -10 13.46 20 0.7% -16.00 [-24.61, -7.39]
Arntz 1991 -22.8 13.95 58 -10.47 13.46 38 1.6% -12.33 [-17.92, -6.74]
Wiklund 1993 -26.25 13.95 64 -15.18 13.46 64 2.2% -11.07 [-15.82, -6.32]
D'Agostino 1992 -22 13.95 47 -12 13.46 46 1.6% -10.00 [-15.57, -4.43]
Pover 1995 -20.1465 13.95 1365 -14.3967 13.46 605 29.7% -5.75 [-7.05, -4.45]
Skoloudik 2007 -20 13.95 189 -15 13.46 187 6.6% -5.00 [-7.77, -2.23]
Sinzinger 1995 -18 13.95 192 -15 13.46 193 6.7% -3.00 [-5.74, -0.26]
Subtotal (95% CI) 2098 1317 54.9% -7.07 [-8.03, -6.11]
Heterogeneity: Chi² = 61.90, df = 7 (P < 0.00001); I² = 89%
Test for overall effect: Z = 14.46 (P < 0.00001)
Total (95% CI) 3755 2247 100.0% -11.49 [-12.20, -10.77]
Heterogeneity: Chi² = 356.84, df = 14 (P < 0.00001); I² = 96%
Test for overall effect: Z = 31.68 (P < 0.00001)
Test for subgroup differences: Chi² = 180.59, df = 1 (P < 0.00001), I² = 99.4%
-50
-25
0
25
50
Favours statins
Favours fibrates