Study or Subgroup	Statins Mean [% change]	Statins SD [% change]	Statins Total	Fibrates Mean [% change]	Fibrates SD [% change]	Fibrates Total	Weight	Mean Difference IV, Fixed, 95% CI [% change]
No imputation								
Jones 2009	-43.2879	18.8889	601	-6.5	18.2185	223	14.5%	-36.79 [-39.62, -33.96]
Goldberg 2009	-39.8903	18.8992	248	-3.4	18.7128	97	6.0%	-36.49 [-40.89, -32.09]
Sweany 1995	-33.1	15.6	76	-4.4	23.1	84	3.2%	-28.70 [-34.76, -22.64]
Mohiuddin 2009	-29.6123	21.4225	277	-4	20.2744	107	5.5%	-25.61 [-30.21, -21.02]
Roth 2010	-28.6	20.3367	241	-4.1	20.5047	245	8.8%	-24.50 [-28.13, -20.87]
Ziegler 1990	-35	12	92	-22	16	92	6.9%	-13.00 [-17.09, -8.91]
Greten 1994	-23.9	12.16	64	-16.8	14.98	66	5.3%	-7.10 [-11.78, -2.42]
Subtotal (95% CI)			**1599**			**914**	**50.2%**	**-26.44 [-27.96, -24.92]**
Heterogeneity: Chi² = 180.23, df = 6 (P < 0.00001); I² = 97%								
Test for overall effect: Z = 34.08 (P < 0.00001)								
Imputed SD								
Tikkanen 1988	-38.6451	21.42	164	-15.8537	20.5	164	5.6%	-22.79 [-27.33, -18.25]
Sanchez 1991	-35	21.42	19	-15	20.5	20	0.7%	-20.00 [-33.17, -6.83]
D'Agostino 1992	-32	21.42	47	-13	20.5	46	1.6%	-19.00 [-27.52, -10.48]
Wiklund 1993	-33.54	21.42	64	-16.8	20.5	68	2.3%	-16.74 [-23.90, -9.58]
Arntz 1991	-28.5	21.42	58	-14.8	20.5	38	1.6%	-13.70 [-22.24, -5.16]
Pover 1995	-27.0127	24.42	1264	-15.3023	20.5	569	25.0%	-11.71 [-13.87, -9.55]
Skoloudik 2007	-26	21.42	189	-16	20.5	187	6.5%	-10.00 [-14.24, -5.76]
Sinzinger 1995	-27	21.42	192	-20	20.5	193	6.6%	-7.00 [-11.19, -2.81]
Subtotal (95% CI)			**1997**			**1285**	**49.8%**	**-12.75 [-14.28, -11.23]**
Heterogeneity: Chi² = 33.03, df = 7 (P < 0.0001); I² = 79%								
Test for overall effect: Z = 16.38 (P < 0.00001)								
Total (95% CI)			**3596**			**2199**	**100.0%**	**-19.63 [-20.70, -18.55]**
Heterogeneity: Chi² = 368.27, df = 14 (P < 0.00001); I² = 96%								
Test for overall effect: Z = 35.70 (P < 0.00001)								
Test for subgroup differences: Chi² = 155.00, df = 1 (P < 0.00001), I² = 99.4%								

