Study or Subgroup	Statins Mean [% change]	Statins SD [% change]	Statins Total	Fibrates Mean [% change]	Fibrates SD [% change]	Fibrates Total	Weight	Mean Difference IV, Fixed, 95% CI [% change]
No imputation								
Goldberg 2009	-35.294	15.3985	265	-12.4	15.2	104	13.5%	-22.89 [-26.35, -19.43]
Jones 2009	-38.4767	16.7839	623	-16.2	16.39	239	26.7%	-22.28 [-24.74, -19.82]
Sweany 1995	-27.8	14.1	76	-11.4	19.2	84	6.0%	-16.40 [-21.59, -11.21]
Ziegler 1990	-27	15	92	-13	23	92	5.1%	-14.00 [-19.61, -8.39]
Mohiuddin 2009	-31.4745	16.717	337	-17.6	15.35	112	14.3%	-13.87 [-17.23, -10.52]
Roth 2010	-26.4	15.27	238	-13.6	15.4	242	21.4%	-12.80 [-15.54, -10.06]
Subtotal (95% CI)			**1631**			**873**	**87.0%**	**-17.76 [-19.12, -16.40]**
Heterogeneity: Chi² = 41.09, df = 5 (P < 0.00001); I² = 88%								
Test for overall effect: Z = 25.56 (P < 0.00001)								
Imputed SD								
Wiklund 1993	-28.76	16.78	64	-15.29	23	68	3.4%	-13.47 [-20.31, -6.63]
Sanchez 1991	-26.1	16.78	19	-13.1	23	20	1.0%	-13.00 [-25.59, -0.41]
Tikkanen 1988	-29.7268	16.78	164	-20.6122	23	164	8.5%	-9.11 [-13.47, -4.76]
Subtotal (95% CI)			**247**			**252**	**13.0%**	**-10.58 [-14.11, -7.05]**
Heterogeneity: Chi² = 1.26, df = 2 (P = 0.53); I² = 0%								
Test for overall effect: Z = 5.88 (P < 0.00001)								
Total (95% CI)			**1878**			**1125**	**100.0%**	**-16.83 [-18.10, -15.56]**
Heterogeneity: Chi² = 56.22, df = 8 (P < 0.00001); I² = 86%								
Test for overall effect: Z = 25.96 (P < 0.00001)								
Test for subgroup differences: Chi² = 13.86, df = 1 (P = 0.0002), I² = 92.8%								

