
Study or Subgroup	log[Odds Ratio]	SE	Weight	Odds Ratio IV, Fixed, 95% CI
Kantor 2017	0.43825493	0.20468022	4.1%	1.55 [1.04, 2.32]
Nishida 2016	0.65544531	0.46470189	0.8%	1.93 [0.77, 4.79]
Ohgi 2020	1.30019166	0.37517811	1.2%	3.67 [1.76, 7.66]
Yamashita 2016	3.04927304	1.10838956	0.1%	21.10 [2.40, 185.24]
Zarzavadjian Le Bian 2019	0.09712671	0.0434676	91.8%	1.10 [1.01, 1.20]
Zou 2020	0.76453718	0.306442	1.8%	2.15 [1.18, 3.92]
Total (95% CI)			**100.0%**	**1.16 [1.07, 1.26]**

Heterogeneity: Chi² = 24.90, df = 5 (P = 0.0001); I² = 80%


Test for overall effect: Z = 3.53 (P = 0.0004)



Study or Subgroup	log[Odds Ratio]	SE	Weight	Odds Ratio IV, Fixed, 95% CI
Kantor 2017	0.43825493	0.20468022	4.1%	1.55 [1.04, 2.32]
Nishida 2016	0.65544531	0.46470189	0.8%	1.93 [0.77, 4.79]
Ohgi 2020	1.30019166	0.37517811	1.2%	3.67 [1.76, 7.66]
Yamashita 2016	3.04927304	1.10838956	0.1%	21.10 [2.40, 185.24]
Zarzavadjian Le Bian 2019	0.09712671	0.0434676	91.8%	1.10 [1.01, 1.20]
Zou 2020	0.76453718	0.306442	1.8%	2.15 [1.18, 3.92]
Total (95% CI)			**100.0%**	**1.16 [1.07, 1.26]**

Heterogeneity: Chi² = 24.90, df = 5 (P = 0.0001); I² = 80%


Test for overall effect: Z = 3.53 (P = 0.0004)



Study or Subgroup	log[Odds Ratio]	SE	Weight	Odds Ratio IV, Fixed, 95% CI
Bardol 2020	3.41124672	0.99485904	0.8%	30.30 [4.31, 212.97]
Chen 2015	1.5040774	0.29304059	9.0%	4.50 [2.53, 7.99]
Huang 2020	0.87129337	0.60722114	2.1%	2.39 [0.73, 7.86]
Kanda 2014	1.6524974	0.47106319	3.5%	5.22 [2.07, 13.14]
Kang 2019	0.62003871	0.19690055	19.9%	1.86 [1.26, 2.73]
Kawai 2011	0.99325177	0.29672215	8.8%	2.70 [1.51, 4.83]
Ke 2018	1.66297868	0.43586419	4.1%	5.28 [2.24, 12.39]
Li 2019	1.38629436	0.47354541	3.4%	4.00 [1.58, 10.12]
Malleo 2013	0.78390154	0.28274706	9.7%	2.19 [1.26, 3.81]
Nagai 2015	1.1055879	0.48743698	3.2%	3.02 [1.16, 7.85]
Nakamura 2020	2.17588744	0.67601694	1.7%	8.81 [2.34, 33.14]
Nishida 2016	2.76952152	0.79239451	1.2%	15.95 [3.38, 75.38]
Ohgi 2020	0.62593843	0.38240155	5.3%	1.87 [0.88, 3.96]
Pratt 2008	1.18784342	0.56596924	2.4%	3.28 [1.08, 9.95]
Tabchouri 2020	1.68026909	0.20842621	17.8%	5.37 [3.57, 8.08]
Xia 2018	0.73716407	0.32805399	7.2%	2.09 [1.10, 3.98]
Total (95% CI)			**100.0%**	**3.19 [2.68, 3.79]**

Heterogeneity: Chi² = 35.23, df = 15 (P = 0.002); I² = 57%


Test for overall effect: Z = 13.19 (P < 0.00001)



Study or Subgroup	log[Odds Ratio]	SE	Weight	Odds Ratio IV, Fixed, 95% CI
Bardol 2020	3.41124672	0.99485904	0.8%	30.30 [4.31, 212.97]
Chen 2015	1.5040774	0.29304059	9.0%	4.50 [2.53, 7.99]
Huang 2020	0.87129337	0.60722114	2.1%	2.39 [0.73, 7.86]
Kanda 2014	1.6524974	0.47106319	3.5%	5.22 [2.07, 13.14]
Kang 2019	0.62003871	0.19690055	19.9%	1.86 [1.26, 2.73]
Kawai 2011	0.99325177	0.29672215	8.8%	2.70 [1.51, 4.83]
Ke 2018	1.66297868	0.43586419	4.1%	5.28 [2.24, 12.39]
Li 2019	1.38629436	0.47354541	3.4%	4.00 [1.58, 10.12]
Malleo 2013	0.78390154	0.28274706	9.7%	2.19 [1.26, 3.81]
Nagai 2015	1.1055879	0.48743698	3.2%	3.02 [1.16, 7.85]
Nakamura 2020	2.17588744	0.67601694	1.7%	8.81 [2.34, 33.14]
Nishida 2016	2.76952152	0.79239451	1.2%	15.95 [3.38, 75.38]
Ohgi 2020	0.62593843	0.38240155	5.3%	1.87 [0.88, 3.96]
Pratt 2008	1.18784342	0.56596924	2.4%	3.28 [1.08, 9.95]
Tabchouri 2020	1.68026909	0.20842621	17.8%	5.37 [3.57, 8.08]
Xia 2018	0.73716407	0.32805399	7.2%	2.09 [1.10, 3.98]
Total (95% CI)			**100.0%**	**3.19 [2.68, 3.79]**

Heterogeneity: Chi² = 35.23, df = 15 (P = 0.002); I² = 57%


Test for overall effect: Z = 13.19 (P < 0.00001)



Study or Subgroup	log[Odds Ratio]	SE	Weight	Odds Ratio IV, Fixed, 95% CI
Kang 2019	0.11689375	0.19654879	48.1%	1.12 [0.76, 1.65]
Ke 2018	-1.10262031	0.46772533	8.5%	0.33 [0.13, 0.83]
Malleo 2013	-0.63487827	0.37317205	13.4%	0.53 [0.26, 1.10]
Williamsson 2020	-0.65392647	0.26324513	26.8%	0.52 [0.31, 0.87]
Yamashita 2016	0.26236426	0.76640715	3.2%	1.30 [0.29, 5.84]
Total (95% CI)			**100.0%**	**0.75 [0.57, 0.98]**

Heterogeneity: Chi² = 10.59, df = 4 (P = 0.03); I² = 62%


Test for overall effect: Z = 2.12 (P = 0.03)



Study or Subgroup	log[Odds Ratio]	SE	Weight	Odds Ratio IV, Fixed, 95% CI
Kang 2019	0.11689375	0.19654879	48.1%	1.12 [0.76, 1.65]
Ke 2018	-1.10262031	0.46772533	8.5%	0.33 [0.13, 0.83]
Malleo 2013	-0.63487827	0.37317205	13.4%	0.53 [0.26, 1.10]
Williamsson 2020	-0.65392647	0.26324513	26.8%	0.52 [0.31, 0.87]
Yamashita 2016	0.26236426	0.76640715	3.2%	1.30 [0.29, 5.84]
Total (95% CI)			**100.0%**	**0.75 [0.57, 0.98]**

Heterogeneity: Chi² = 10.59, df = 4 (P = 0.03); I² = 62%


Test for overall effect: Z = 2.12 (P = 0.03)



Study or Subgroup	log[Odds Ratio]	SE	Weight	Odds Ratio IV, Fixed, 95% CI
Kang 2019	0.11689375	0.19654879	0.0%	1.12 [0.76, 1.65]
Ke 2018	-1.10262031	0.46772533	16.4%	0.33 [0.13, 0.83]
Malleo 2013	-0.63487827	0.37317205	25.8%	0.53 [0.26, 1.10]
Williamsson 2020	-0.65392647	0.26324513	51.7%	0.52 [0.31, 0.87]
Yamashita 2016	0.26236426	0.76640715	6.1%	1.30 [0.29, 5.84]
Total (95% CI)			**100.0%**	**0.51 [0.35, 0.74]**

Heterogeneity: Chi² = 2.35, df = 3 (P = 0.50); I² = 0%

Test for overall effect: Z = 3.52 (P = 0.0004)



Study or Subgroup	log[Odds Ratio]	SE	Weight	Odds Ratio IV, Fixed, 95% CI
Kang 2019	0.11689375	0.19654879	0.0%	1.12 [0.76, 1.65]
Ke 2018	-1.10262031	0.46772533	16.4%	0.33 [0.13, 0.83]
Malleo 2013	-0.63487827	0.37317205	25.8%	0.53 [0.26, 1.10]
Williamsson 2020	-0.65392647	0.26324513	51.7%	0.52 [0.31, 0.87]
Yamashita 2016	0.26236426	0.76640715	6.1%	1.30 [0.29, 5.84]
Total (95% CI)			**100.0%**	**0.51 [0.35, 0.74]**

Heterogeneity: Chi² = 2.35, df = 3 (P = 0.50); I² = 0%

Test for overall effect: Z = 3.52 (P = 0.0004)

