	NST		No NST			
Study	**N**	**Total**	**N**	**Total**	**Weight**	**MH, Random, 95% CI**
Fisher et al	1	122	19	77	10.6%	−0.24 [−0.34, −0.14]
ChrisAnderson et al	5	128	1	29	11.1%	0.00 [−0.07, 0.08]
Trujillo et al	9	49	70	160	9.6%	−0.25 [−0.39, −0.12]
Saalwachter et al	39	383	62	194	11.2%	−0.22 [−0.29, −0.15]
Hearnshaw et al	11	61	24	132	10.0%	−0.00 [−0.12, 0.12]
Sriram et al	45	271	87	303	11.3%	−0.12 [−0.19, −0.05]
Boitano et al	1	30	12	30	8.0%	−0.37 [−0.55, −0.18]
Martin et al	44	167	38	111	10.2%	−0.08 [−0.19, 0.03]
Prado	5	29	12	29	6.9%	−0.24 [−0.47, −0.02]
Meyer et al	6	218	83	202	11.2%	−0.38 [−0.45, −0.31]
Total (95% CI)	**166**	**1458**	**408**	**1267**	**100.0%**	**−0.18 [−0.28, −0.09]**

Heterogeneity: $Tau^2 = 0.02$; $Chi^2 = 78.96$, df = 9 (P < 0.01); $I^2 = 89\%$

Test for overall effect: Z = −3.93 (P < 0.01)