
NST
No NST
Risk Difference
Study
N
Total
N
Total
Weight
MH, Random, 95% CI
MH, Random, 95% CI
in−hospital mortality
Hickey et al 3 9 12 41 1.9% 0.04 [−0.30, 0.38]
Traeger et al 9 24 12 45 3.7% 0.11 [−0.12, 0.34]
Kennedy et al 9 75 23 54 7.4% −0.31 [−0.46, −0.15]
Chong et al 27 106 39 106 9.6% −0.11 [−0.24, 0.01]
Parent et al 81 422 77 372 19.1% −0.02 [−0.07, 0.04]
Lee et al 7 62 12 62 9.4% −0.08 [−0.21, 0.05]
Total (95% CI) 136 698 175 680 51.1% −0.08 [−0.18, 0.02]
Heterogeneity: Tau² = < 0.01; Chi² = 15.8, df = 5 (P < 0.01); I² = 68%
Test for overall effect: Z = −1.56 (P = 0.12)
28−day mortality
Hearnshaw et al 9 61 29 132 10.7% −0.07 [−0.19, 0.04]
Total (95% CI) 9 61 29 132 10.7% −0.07 [−0.19, 0.04]
Heterogeneity: not applicable
Test for overall effect: Z = −1.24 (P = 0.21)
30−day mortality (after stopping PN)
Hvas et al 37 303 28 180 17.6% −0.03 [−0.10, 0.03]
Braun et al 38 357 48 378 20.7% −0.02 [−0.07, 0.03]
Total (95% CI) 75 660 76 558 38.2% −0.02 [−0.06, 0.01]
Heterogeneity: Tau² = 0; Chi² = 0.1, df = 1 (P = 0.75); I² = 0%
Test for overall effect: Z = −1.30 (P = 0.19)
Total (95% CI) 220 1419 280 1370 100.0% −0.06 [−0.11, −0.01]
Heterogeneity: Tau² < 0.01; Chi² = 17.33, df = 8 (P = 0.03); I² = 54%
Residual heterogeneity: Tau² = NA; Chi² = 15.90, df = 6 (P = 0.01); I² = 62%
Test for overall effect: Z = −2.29 (P = 0.02)
Test for subgroup differences: Chi² = 1.44, df = 2 (P = 0.49)
−1
−0.5
0
0.5
1
Favours NST
Favours no NST