Appendix G – Subgroup analyses

Table 1. Overview of subgroup analysis results.

Analysis	**Number of trials**	**Effect estimate (95% CI)**	**Heterogeneity (I^2)**	**Subgroup differences (Q)**
Case difficulty: simple	6	0.23 (-0.02-0.48)	I^2 = 41%, $x^2(5)$ = 8.52, p = 0.130	Q(1) = 0.12, p = 0.730
Case difficulty: complex	9	0.27 (0.14-0.41)	I^2 = 0%, $x^2(8)$ = 6.91, p = 0.550	
Diagnostic task: patient (actors)	2	0.41 (0.33-0.49)	I^2 = 0%, $x^2(1)$ = 0, p = 0.970	Q(2) = 22.10, p < 0.001
Diagnostic task: visual diagnosis	7	0.25 (0.01-0.50)	I^2 = 28%, $x^2(6)$ = 8.35, p = 0.210	
Diagnostic task: written clinical vignettes	17	0.16 (0.05-0.28)	I^2 = 45%, $x^2(16)$ = 28.81, p = 0.030	
Expertise: novice (medical students)	10	0.22 (-0.01-0.44)	I^2 = 58%, $x^2(9)$ = 21.58, p = 0.010	Q(2) = 0.15, p = 0.929

Expertise: intermediate (residents, fellows)	13	0.23 (0.14-0.32)	I^2 = 0%, x^2(12) = 6.69, p = 0.880	
Expertise: expert (faculty, specialists)	3	0.19 (-0.29-0.66)	I^2 = 0%, x^2(2) = 1.12, p = 0.570	
Intention: evaluate tool performance	22	0.18 (0.07-0.28)	I^2 = 42%, x^2(21) = 36.41, p = 0.020	Q(1) = 1.45, p = 0.229
Intention: fix induced errors with tool	4	0.30 (0.03-0.57)	I^2 = 0%, x^2(3) = 2.00, p = 0.570	
Intervention (1): checklists	11	0.12 (0.01-0.21)	I^2 = 0%, x^2(10) = 4.33, p = 0.930	Q(1) = 0.55, p = 0.460
Intervention (2): guided reflection	11	0.19 (0.02-0.36)	I^2 = 63%, x^2(10) = 26.72, p < 0.001	
Intervention (2): content	24	0.21 (0.11-0.31)	I^2 = 40%, x^2(23) = 38.16, p = 0.020	Q(1) = 1.94, p = 0.163

Intervention (2): process	3	0.12 (-0.07-0.35)	I^2 = 0%, x^2(2) = 0.49, p = 0.780	
Intervention moment: during initial diagnosis	10	0.15 (-0.05-0.35)	I^2 = 61%, x^2(9) = 22.80, p = 0.010	Q(1) = 0.29, p = 0.593
Intervention moment: verification after initial diagnosis	16	0.20 (0.11-0.30)	I^2 = 3%, x^2(15) = 15.47, p = 0.420	
Intervention items: acknowledge	10	0.22 (0.09-0.36)	I^2 = 0%, x^2(9) = 8.60, p = 0.480	Q(1) = 0.16, p = 0.691
Intervention items: report	16	0.19 (0.05-0.33)	I^2 = 50%, x^2(15) = 30.21, p = 0.010	
Same cases used with and without intervention: yes	12	0.14 (0.03-0.24)	I^2 = 0%, x^2(11) = 10.14, p = 0.520	Q(1) = 1.59, p = 0.207
Same cases used with and without intervention: yes	14	0.25 (0.09-0.40)	I^2 = 56%, x^2(12) = 29.30, p < 0.010	