

Experimental
Control
Std. Mean Difference
Std. Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI
IV, Fixed, 95% CI
1.1.1 perennial allergic rhinitis
Ciprandi 2005 3.7 0.7 10 4 0.8 10 3.0% -0.38 [-1.27, 0.50]
Costa 2014 -2.7 3.48 215 -2.46 3.57 210 65.4% -0.07 [-0.26, 0.12]
Delgiudice 2017 -5.8 1.93132079 20 2.6 1.75783958 20 1.6% -4.46 [-5.66, -3.26]
Helin 2002 7.8 15.5296 15 13.6 19.3296 16 4.7% -0.32 [-1.03, 0.39]
Subtotal (95% CI) 260 256 74.7% -0.19 [-0.37, -0.01]
Heterogeneity: Chi² = 50.40, df = 3 (P < 0.00001); I² = 94%
Test for overall effect: Z = 2.12 (P = 0.03)
1.1.2 seasonal allergic rhinitis
Kang 2020 -1.69 2.50311746 47 -0.65 2.26832008 48 14.3% -0.43 [-0.84, -0.03]
Lue 2012 -8.45 7.1 30 -3.78 5.83 27 8.2% -0.71 [-1.24, -0.17]
Singh 2013 -3.4 2.92162626 10 -1.1 2.73665855 10 2.8% -0.78 [-1.70, 0.14]
Subtotal (95% CI) 87 85 25.3% -0.56 [-0.87, -0.25]
Heterogeneity: Chi² = 0.88, df = 2 (P = 0.64); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 3.58 (P = 0.0003)
Total (95% CI) 347 341 100.0% -0.29 [-0.44, -0.13]
Heterogeneity: Chi² = 55.39, df = 6 (P < 0.00001); I² = 89%
Test for overall effect: Z = 3.64 (P = 0.0003)
Test for subgroup differences: Chi² = 4.12, df = 1 (P = 0.04), I² = 75.7%
-4
-2
0
2
4
Favours [experimental]
Favours [control]