

Experimental
Control
Std. Mean Difference
Std. Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI
IV, Fixed, 95% CI
4.1.1 Probiotics combined with antihistamines
Ciprandi 2005 3.7 0.7 10 4 0.8 10 3.0% -0.38 [-1.27, 0.50]
Costa 2014 -2.7 3.48 215 -2.46 3.57 210 65.4% -0.07 [-0.26, 0.12]
Lue 2012 -8.45 7.1 30 -3.78 5.83 27 8.2% -0.71 [-1.24, -0.17]
Subtotal (95% CI) 255 247 76.6% -0.15 [-0.32, 0.03]
Heterogeneity: Chi² = 5.09, df = 2 (P = 0.08); I² = 61%
Test for overall effect: Z = 1.66 (P = 0.10)
4.1.2 Mixed probiotics
Delgiudice 2017 -5.8 1.931321 20 2.6 1.75784 20 1.6% -4.46 [-5.66, -3.26]
Kang 2020 -1.69 2.503117 47 -0.65 2.26832 48 14.3% -0.43 [-0.84, -0.03]
Subtotal (95% CI) 67 68 15.9% -0.85 [-1.23, -0.46]
Heterogeneity: Chi² = 38.71, df = 1 (P < 0.00001); I² = 97%
Test for overall effect: Z = 4.31 (P < 0.0001)
4.1.3 Single probiotic
Helin 2002 7.8 15.5296 15 13.6 19.3296 16 4.7% -0.32 [-1.03, 0.39]
Singh 2013 -3.4 2.921626 10 -1.1 2.736659 10 2.8% -0.78 [-1.70, 0.14]
Subtotal (95% CI) 25 26 7.5% -0.49 [-1.05, 0.07]
Heterogeneity: Chi² = 0.60, df = 1 (P = 0.44); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.72 (P = 0.09)
Total (95% CI) 347 341 100.0% -0.29 [-0.44, -0.13]
Heterogeneity: Chi² = 55.39, df = 6 (P < 0.00001); I² = 89%
Test for overall effect: Z = 3.64 (P = 0.0003)
Test for subgroup differences: Chi² = 11.00, df = 2 (P = 0.004), I² = 81.8%
-4
-2
0
2
4
Favours [experimental]
Favours [control]