

Experimental
Control
Std. Mean Difference
Std. Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI
IV, Fixed, 95% CI
1.8.1 perennial allergic rhinitis
Ishida 2005 -8.8 27.87472 25 -6.8 23.10348 24 19.7% -0.08 [-0.64, 0.48]
Nishimura 2009(low dose) 0 1.162 15 0 1.396319 15 12.1% 0.00 [-0.72, 0.72]
Nishimura 2009(high dose) 0 1.162 15 0 1.396319 15 12.1% 0.00 [-0.72, 0.72]
Subtotal (95% CI) 55 54 43.9% -0.03 [-0.41, 0.34]
Heterogeneity: Chi² = 0.04, df = 2 (P = 0.98); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.18 (P = 0.86)
1.8.2 seasonal allergic rhinitis
Kawase 2009 4.4 6.082763 21 1.5 3.874274 19 15.4% 0.55 [-0.08, 1.18]
Nagata 2010 0 29.17893 9 -0.1 17.9134 10 7.6% 0.00 [-0.90, 0.90]
Xiao 2006a 0.7 12.06524 20 -0.3 23.65143 20 16.1% 0.05 [-0.57, 0.67]
Xiao 2006b 16.2 21.98257 22 14.5 43.05277 20 16.9% 0.05 [-0.56, 0.66]
Subtotal (95% CI) 72 69 56.1% 0.18 [-0.15, 0.51]
Heterogeneity: Chi² = 1.81, df = 3 (P = 0.61); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.07 (P = 0.28)
Total (95% CI) 127 123 100.0% 0.09 [-0.16, 0.34]
Heterogeneity: Chi² = 2.56, df = 6 (P = 0.86); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.69 (P = 0.49)
Test for subgroup differences: Chi² = 0.72, df = 1 (P = 0.40), I² = 0%
-4
-2
0
2
4
Favours [experimental]
Favours [control]