






Outcome: Frequency, days/week
Study
Sample size (intervention/control)
Effect size (95% CI)
% Weight
Chen, 2016 56/43 0.58 (0.18, 0.99) 30.74
Cook, 2015 140/138 0.10 (-0.13, 0.34) 45.87
Low, 2015 28/29 0.10 (-0.42, 0.61) 23.39
Overall, DL (I^2 = 54.0%, p = 0.114) 0.25 (-0.07, 0.56) 100.00
-1 -.5 0 .5 1
Favours control
Favours exercise


Outcome: Moderate-to-vigorous physical activity
Study
Sample size (intervention/control)
Effect size (95% CI)
% Weight
Arao, 2007 70/58 0.48 (0.13, 0.84) 33.10
Bergman, 2018 40/40 0.18 (-0.26, 0.62) 25.57
Strijik, 2012 95/101 0.04 (-0.24, 0.32) 41.33
Overall, DL (I^2 = 46.4%, p = 0.155) 0.22 (-0.05, 0.50) 100.00
-1 -.5 -.25 0 .25 .5 1
Favours control
Favours exercise


Outcome: Cardiorespiratory fitness
Study
Sample size (intervention/control)
Effect size (95% CI)
% Weight
Arao, 2007 72/57 0.55 (0.20, 0.90) 46.77
Strijik, 2012 138/122 0.04 (-0.21, 0.28) 53.23
Overall, DL (I^2 = 81.8%, p = 0.019) 0.28 (-0.22, 0.78) 100.00
-1 -.5 0 .5 1
Favours control
Favours exercise


Outcome: Balance
Study
Sample size (intervention/control)
Effect size (95% CI)
% Weight
Granacher, 2011 17/15 0.45 (-0.23, 1.14) 38.01
Palumbo, 2012 6/5 2.36 (0.89, 3.83) 22.30
Qi, 2019 20/20 0.10 (-0.51, 0.71) 39.69
Overall, DL (I^2 = 74.3%, p = 0.020) 0.74 (-0.21, 1.69) 100.00
-2 -1 -.5 0 .5 1 2
Favours control
Favours exercise


Outcome: Strength
Study
Sample size (intervention/control)
Effect size (95% CI)
% Weight
Chopp-Hurley, 2017 12/12 0.00 (-0.80, 0.80) 43.64
Granacher, 2011 17/15 0.48 (-0.23, 1.18) 56.36
Overall, DL (I^2 = 0.0%, p = 0.380) 0.27 (-0.26, 0.80) 100.00
-1.5 -1 -.5 -.25 0 .25 .5 1 1.5
Favours control
Favours exercise


Outcome: Flexibility
Study
Sample size (intervention/control)
Effect size (95% CI)
% Weight
Kocur, 2017 21/18 0.65 (0.02, 1.28) 74.60
Palumbo, 2012 6/5 0.07 (-1.01, 1.16) 25.40
Overall, DL (I^2 = 0.0%, p = 0.366) 0.50 (-0.04, 1.05) 100.00
-1 -.5 0 .5 1
Favours control
Favours exercise