

A

Study_Aβ40	PET (+) Total	Mean	SD	PET (-) Total	Mean	SD	SMD	95%−CI	Weight
Group = ELISA									
Chatterjee 2019	32	332.82	73.7100	63	307.44	54.1600	0.41	[−0.02; 0.84]	10.0%
Palmqvist 2019	151	483.00	73.0000	226	485.00	71.0000	−0.03	[−0.23; 0.18]	10.1%
Vergallo 2019	74	295.50	75.4000	203	301.90	87.8000	−0.08	[−0.34; 0.19]	10.0%
Random effects model	257			492			0.04	[−0.17; 0.25]	30.1%
Heterogeneity: I^2 = 48%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0144, p = 0.15									
Group = Simoa									
Li 2019	48	221.76	109.5300	36	219.14	116.1500	0.02	[−0.41; 0.46]	10.0%
Verberk 2020	176	157.00	28.0000	76	165.00	30.0000	−0.28	[−0.55; −0.01]	10.0%
Random effects model	224			112			−0.18	[−0.46; 0.10]	20.0%
Heterogeneity: I^2 = 26%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0117, p = 0.25									
Group = IMR									
Lin 2019	22	50.90	7.7000	30	49.10	7.3000	0.24	[−0.31; 0.79]	9.9%
Wang 2020	18	51.84	6.7500	28	48.57	7.7100	0.44	[−0.16; 1.04]	9.9%
Random effects model	40			58			0.33	[−0.08; 0.74]	19.8%
Heterogeneity: I^2 = 0%, $\hat{\tau}^2$ = 0, p = 0.63									
Group = IP−MS									
Nakamura 2018	187	8.28	1.8200	186	8.73	2.0440	−0.23	[−0.44; −0.03]	10.1%
Random effects model	187			186			−0.23	[−0.44; −0.03]	10.1%
Heterogeneity: not applicable									
Group = xMAP									
Park 2017	100	136.60	3.3700	253	118.70	2.0900	7.09	[6.52; 7.67]	9.9%
Random effects model	100			253			7.09	[6.52; 7.67]	9.9%
Heterogeneity: not applicable									
Group = LC−MS/MS									
West 2021	161	452.33	103.9330	253	440.44	81.8700	0.13	[−0.07; 0.33]	10.1%
Random effects model	161			253			0.13	[−0.07; 0.33]	10.1%
Heterogeneity: not applicable									
Random effects model	**969**			**1354**			**0.76**	**[−0.61; 2.14]**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 98%, $\hat{\tau}^2$ = 4.8775, p < 0.01									
Test for subgroup differences: χ^2_5 = 580.14, df = 5 (p < 0.01)									



B

Study_Aβ42	PET (+) Total	Mean	SD	PET (-) Total	Mean	SD	SMD	95%−CI	Weight
Group = ELISA									
Chatterjee 2019	32	15.71	3.4800	63	16.01	3.7400	−0.08	[−0.51; 0.34]	9.3%
Palmqvist 2019	151	29.90	4.7000	226	32.70	4.7000	−0.59	[−0.80; −0.38]	14.1%
Vergallo 2019	74	15.10	4.0000	203	18.40	5.8000	−0.61	[−0.88; −0.34]	12.7%
Random effects model	257			492			−0.48	[−0.76; −0.20]	36.0%
Heterogeneity: I^2 = 59%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0377, p = 0.09									
Group = IP−MS									
Kaneko 2014	40	0.14	0.0650	22	0.21	0.0720	−1.02	[−1.58; −0.47]	7.1%
Nakamura 2018	187	0.29	0.0670	186	0.38	0.0950	−1.07	[−1.29; −0.85]	13.9%
Random effects model	227			208			−1.06	[−1.26; −0.86]	21.0%
Heterogeneity: I^2 = 0%, $\hat{\tau}^2$ = 0, p = 0.88									
Group = Simoa									
Li 2019	48	9.01	4.8700	36	10.91	5.4400	−0.37	[−0.80; 0.07]	9.1%
Verberk 2020	176	23.00	6.0000	76	27.00	6.0000	−0.66	[−0.94; −0.39]	12.6%
Random effects model	224			112			−0.57	[−0.84; −0.29]	21.7%
Heterogeneity: I^2 = 22%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0095, p = 0.26									
Group = IMR									
Lin 2019	22	16.30	2.3000	30	17.60	3.3000	−0.44	[−1.00; 0.12]	7.0%
Random effects model	22			30			−0.44	[−1.00; 0.12]	7.0%
Heterogeneity: not applicable									
Group = LC−MS/MS									
West 2021	161	40.42	9.6980	253	44.48	8.6370	−0.45	[−0.65; −0.25]	14.3%
Random effects model	161			253			−0.45	[−0.65; −0.25]	14.3%
Heterogeneity: not applicable									
Random effects model	**891**			**1095**			**−0.60**	**[−0.80; −0.41]**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 73%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0578, p < 0.01									
Test for subgroup differences: χ^2_4 = 22.30, df = 4 (p < 0.01)									



C

Study_Aβ42/Aβ40	PET (+) Total	Mean	SD	PET (-) Total	Mean	SD	SMD	95%−CI	Weight
Group = ELISA									
Chatterjee 2019	32	0.05	0.0050	63	0.05	0.0080	−0.69	[−1.13; −0.26]	7.1%
Doecke (18m) 2020	77	0.08	0.0200	99	0.09	0.0270	−0.70	[−1.01; −0.39]	7.2%
Palmqvist 2019	151	0.06	0.0078	226	0.07	0.0077	−0.75	[−0.96; −0.53]	7.3%
Perez−Grijalba 2019	18	0.10	0.0197	41	0.13	0.0208	−1.60	[−2.23; −0.97]	6.9%
Random effects model	278			429			−0.78	[−0.94; −0.62]	28.6%
Heterogeneity: I^2 = 57%, $\hat{\tau}^2$ = 0, p = 0.07									
Group = IP−MS									
Kaneko 2014	40	0.01	0.0030	22	0.01	0.0050	−1.03	[−1.59; −0.48]	7.0%
Nakamura 2018	187	0.04	0.0040	186	0.04	0.0060	−1.76	[−2.00; −1.52]	7.3%
Schindler 2019	43	0.12	0.0060	115	0.13	0.0090	−1.56	[−1.95; −1.17]	7.2%
Tosun (CI) 2021	46	0.11	0.0090	40	0.13	0.0100	−2.09	[−2.62; −1.56]	7.1%
Tosun (CU) 2021	37	0.11	0.0100	50	0.12	0.0100	−0.99	[−1.44; −0.54]	7.1%
Random effects model	353			413			−1.50	[−1.89; −1.11]	35.6%
Heterogeneity: I^2 = 75%, $\hat{\tau}^2$ = 0.1506, p < 0.01									
Group = Simoa									
Li 2019	48	0.04	0.0203	36	0.06	0.0231	−0.65	[−1.09; −0.20]	7.1%
Verberk 2020	176	0.14	0.0300	76	0.17	0.0300	−1.00	[−1.28; −0.71]	7.2%
Random effects model	224			112			−0.87	[−1.20; −0.54]	14.4%
Heterogeneity: I^2 = 41%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0247, p = 0.19									
Group = IMR									
Lin 2019	22	0.33	0.1090	30	0.37	0.1170	−0.35	[−0.90; 0.21]	7.0%
Random effects model	22			30			−0.35	[−0.90; 0.21]	7.0%
Heterogeneity: not applicable									
Group = xMAP									
Park 2017	100	0.30	0.0100	253	0.36	0.0100	−5.99	[−6.49; −5.49]	7.1%
Random effects model	100			253			−5.99	[−6.49; −5.49]	7.1%
Heterogeneity: not applicable									
Group = LC−MS/MS									
West 2021	161	0.09	0.0100	253	0.10	0.0100	−1.10	[−1.31; −0.89]	7.3%
Random effects model	161			253			−1.10	[−1.31; −0.89]	7.3%
Heterogeneity: not applicable									
Random effects model	**1138**			**1490**			**−1.44**	**[−2.17; −0.72]**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 97%, $\hat{\tau}^2$ = 1.8712, p < 0.01									
Test for subgroup differences: χ^2_5 = 393.77, df = 5 (p < 0.01)									

