Study or Subgroup	Tocilizumab Mean	SD	Total	Control Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
8.1.1 Survival patients								
Capra 2020	11.75	3.03	60	9.5	2.45	12	19.0%	2.25 [0.67, 3.83]
Somers 2020	23.33	16.86	44	22.57	9.5	30	8.2%	0.76 [-5.27, 6.79]
Subtotal (95% CI)			**104**			**42**	**27.1%**	**2.15 [0.62, 3.69]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.00$; $Chi^2 = 0.22$, df = 1 (P = 0.64); $I^2 = 0\%$								
Test for overall effect: Z = 2.76 (P = 0.006)								
8.1.2 Survival and Death								
De Rossi 2020	9.1	8.1	90	6	3.1	68	18.4%	3.10 [1.27, 4.93]
Kewan 2020	13.08	12.69	28	8.5	6.72	23	9.2%	4.58 [-0.86, 10.02]
Klopfenstein 2020	17	10.1	30	15.2	12	176	12.4%	1.80 [-2.23, 5.83]
Masia 2020	14.93	7.41	76	9.33	5.31	62	17.6%	5.60 [3.47, 7.73]
Zheng 2020	30.75	11.34	92	20.7	8.55	89	15.4%	10.05 [7.13, 12.97]
Subtotal (95% CI)			**316**			**418**	**72.9%**	**5.13 [2.36, 7.89]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 7.22$; $Chi^2 = 18.38$, df = 4 (P = 0.001); $I^2 = 78\%$								
Test for overall effect: Z = 3.64 (P = 0.0003)								
Total (95% CI)			**420**			**460**	**100.0%**	**4.23 [2.02, 6.44]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 6.04$; $Chi^2 = 26.55$, df = 6 (P = 0.0002); $I^2 = 77\%$								
Test for overall effect: Z = 3.76 (P = 0.0002)								
Test for subgroup differences: $Chi^2 = 3.40$, df = 1 (P = 0.07), $I^2 = 70.6\%$								

