

99/11/12

07 (7) if $\sum_{i=1}^p w_i x_i + w_0 \leq 0$

08 Then class is +, Else class is -


09

10 $w_i = \frac{\mu_{i0} - \mu_{i1}}{\sigma_i^2}$, $w_0 = \ln \frac{1 - P(y=1)}{P(y=1)} + \sum_{i=1}^p \frac{\mu_{i1}^2 - \mu_{i0}^2}{2\sigma_i^2}$


11 A : positive class

figure 3

12 $\mu_{10} = E(x_1 | y=B) = x_{1, \text{center}}$



16 $\mu_{20} = E(x_2 | y=B) = x_{2, \text{center}}$



بزرگشت حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) به ایران (۱۳۵۷ هـ ش) و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی

۱۲

بهمن

یکشنبه

31. Jan. 2021

۱ جمادی الثانی ۱۴۴۲

(7)

$$\rightarrow w_1 \leq \frac{M_{10} - M_{11}}{b_1^r} \leq 0 \quad w_r \leq \frac{M_{r0} - M_{r1}}{b_r^r} = 0$$


$$p(y=1) = \frac{r_1}{r_1 + r_2} \rightarrow w_0 \leq \ln \frac{\frac{r_1}{r_1 + r_2}}{\frac{r_2}{r_1 + r_2}} \ln \frac{1}{\Delta} = -\ln \Delta \leq 0$$

→ class is positive or equivalently

the labeled test data belongs to class A

Figure 4

A: positive class



$$M_{10} = E(x_1 | y = B) = x_1^B$$

$$M_{r0} = E(x_r | y = B) = x_r^A$$

$$M_{11} = x_1^A \quad \text{and} \quad M_{r1} = x_r^A$$

$$\rightarrow w_1 \leq \frac{M_{10} - M_{11}}{b_1^r} \leq \frac{x_1^B - x_1^A}{b_1^r} > 0$$

$$w_r \leq \frac{M_{r0} - M_{r1}}{b_r^r} \leq 0$$

99/11/1.

7

$$w_0 = ? \quad P(y=A) = \frac{1}{1+e^{\frac{1}{29.3}}} = 0.1293$$

08

$$w_0 = \frac{-\ln(0.1293)}{1} + \frac{(x_1^B)^T - (x_1^A)^T}{1.6} =$$

09

$$= 1.1111 + \frac{(x_1^B)^T - (x_1^A)^T}{1.6} > 0$$

11

$$\rightarrow \sum_{i=1}^I w_i x_i + w_0$$

12

$$= w_1 x_1 + w_0 = A \quad \left| \quad x_1 = x_1^c > 0 \right.$$

13

14 \rightarrow class is negative or equivalently

15 the labeled test data belongs to class B

16

29. Jan. 2022

مادى الثانيه ١٤٤٢

17

18

19