

1	2	3	4	5	Σ	
14	10	20	14	0	8	66

Beschreibungslogik | Übung 02

A. Mahdavi, C. Dhimitris, D. Marschner

Aufgabe 1.1

Gegeben Interpretationen $\mathcal{I}_1, \mathcal{J}_1$

Behauptung Es gibt ein \mathcal{ALC} -Konzept C mit $d \notin C^{\mathcal{I}_1}$ und $x \in C^{\mathcal{J}_1}$

Lösung Sei $C = \exists r.(A \sqcap B)$. Dann ist $d \notin C^{\mathcal{I}_1} = \{\}$ und $x \in C^{\mathcal{J}_1} = \{x\}$

✓

6/6

Aufgabe 1.2

Gegeben Interpretationen $\mathcal{I}_2, \mathcal{J}_2$

Behauptung $(\mathcal{I}_2, d) \sim (\mathcal{J}_2, x)$

✓

Lösung Die Bisimulation $\rho = \Delta^{\mathcal{I}_2} \times \Delta^{\mathcal{J}_2}$ zeigt, dass $(\mathcal{I}_2, d) \sim (\mathcal{J}_2, x)$

2/7

Aufgabe 1.3 sind $(\mathcal{I}_2, d) \sim (\mathcal{J}_2, z)$ und $(\mathcal{I}_1, f_i) \sim (\mathcal{J}_2, y_j)?$

Gegeben Interpretationen $\mathcal{I}_3, \mathcal{J}_3$

Behauptung Es gibt ein \mathcal{ALC} -Konzept C mit $d \in C^{\mathcal{I}_3}$ und $x \notin C^{\mathcal{J}_3}$

Lösung Sei $C = \forall r.(\exists r.A \sqcap \exists r.B)$. Dann ist $d \in C^{\mathcal{I}_3} = \{d\}$ und $x \notin C^{\mathcal{J}_3} = \{\}$

✓

6/6
14/20


Aufgabe 2 a)

Behauptung Die Eigenschaft $E = \{(\mathcal{I}, d) \mid \text{für alle } e \in \Delta^{\mathcal{I}} \text{ gilt } (d, e) \in r^{\mathcal{I}}\}$ kann nicht als \mathcal{ALC} -Konzept ausgedrückt werden, wobei r ein fester Rollenname ist.

Beweis Um zu zeigen, dass E nicht als \mathcal{ALC} -Konzept ausgedrückt werden kann, genügt es laut Theorem 3.5 (Methodologie-Theorem) zu zeigen, dass es zwei Interpretationen \mathcal{I}_1 und \mathcal{I}_2 gibt, wobei $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$ und

$(\mathcal{I}_1, d_1) \in E$ und $(\mathcal{I}_2, d_2) \notin E$.

Gegeben seien die folgenden Interpretationen $\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2$



5/10

r-Nachfolger!

dann ist offensichtlich, dass $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$.

Die Eigenschaft $E = \{(\mathcal{I}, d) \mid \text{für alle } e \in \Delta^{\mathcal{I}} \text{ gilt } (d, e) \in r^{\mathcal{I}}\}$ beschreibt in Worten eigentlich nur, dass alle Elemente, die diese Eigenschaft haben, automatisch einen r -Vorgänger haben. **NEIN! d hat alle Elemente als**

Wenn es so ein \mathcal{ALC} -Konzept C gäbe, welches die Eigenschaft ausdrücken könnte, dann wäre offensichtlich $d_1 \in C^{\mathcal{I}_1}$. Da $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$ müsste dann laut Definition Bisimulation $d_2 \in C^{\mathcal{I}_2}$ gelten. Das ist allerdings offensichtlich nicht der Fall, da d_2 gar keinen r -Vorgänger hat.

Somit haben wir gezeigt, dass es zwei Interpretationen \mathcal{I}_1 und \mathcal{I}_2 gibt, wobei $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$ und $(\mathcal{I}_1, d_1) \in E$ und $(\mathcal{I}_2, d_2) \notin E$.



Demzufolge ist E nicht als \mathcal{ALC} -Konzept ausdrückbar. \square

Aufgabe 2 b)

Behauptung Die Eigenschaft $E = \{(\mathcal{I}, d) \mid \text{es gibt ein } e \in \Delta^{\mathcal{I}} \text{ mit } (d, e) \in r^{\mathcal{I}} \text{ und } (e, d) \in s^{\mathcal{I}}\}$ kann nicht als \mathcal{ALC} -Konzept ausgedrückt werden, wobei r und s feste Rollennamen sind.

Beweis Um zu zeigen, dass E nicht als \mathcal{ALC} -Konzept ausgedrückt werden kann, genügt es laut Theorem 3.5 (Methodologie-Theorem) zu zeigen, dass es zwei Interpretationen \mathcal{I}_1 und \mathcal{I}_2 gibt, wobei $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$ und $(\mathcal{I}_1, d_1) \in E$ und $(\mathcal{I}_2, d_2) \notin E$.

Gegeben seien die folgenden Interpretationen $\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2$

\mathcal{I}_1  \mathcal{I}_2 

5/10

10/20

dann ist offensichtlich, dass $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$.

Die Eigenschaft $E = \{(\mathcal{I}, d) \mid \text{es gibt ein } e \in \Delta^{\mathcal{I}} \text{ mit } (d, e) \in r^{\mathcal{I}} \text{ und } (e, d) \in s^{\mathcal{I}}\}$ beschreibt in Worten eigentlich nur, dass alle Elemente, die diese Eigenschaft haben, automatisch einen r -Vorgänger und einen s -Nachfolger haben.

Wenn es so ein \mathcal{ALC} -Konzept C gäbe, welches die Eigenschaft ausdrücken könnte, dann wäre offensichtlich $d_1 \in C^{\mathcal{I}_1}$. Da $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$ müsste dann laut Definition Bisimulation $d_2 \in C^{\mathcal{I}_2}$ gelten. Das ist allerdings offensichtlich nicht der Fall, da d_2 gar keinen r -Vorgänger hat.

Somit haben wir gezeigt, dass es zwei Interpretationen \mathcal{I}_1 und \mathcal{I}_2 gibt, wobei $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$ und $(\mathcal{I}_1, d_1) \in E$ und $(\mathcal{I}_2, d_2) \notin E$.

Demzufolge ist E nicht als \mathcal{ALC} -Konzept ausdrückbar. \square

Aufgabe 3

der: einen r -Nachfolger haben, der gleichzeitig s -Vorgänger ist

Siehe Abbildungen 1 und 2.

Aufgabe 4 a)

$$\Delta^{\mathcal{I}} = \{d, e, f, g, h\}$$

$$A^{\mathcal{I}} = \{d, e, f, g\}$$

$$B^{\mathcal{I}} = \{f, g, h\}$$

$$\exists r.B^{\mathcal{I}} = \{d, f, g, e, h\}$$

$$(A \sqcup B)^{\mathcal{I}} = \{d, e, f, g, h\}$$

$$(A \sqcap \neg B)^{\mathcal{I}} = \{d, e\}$$

$$(\exists s.(A \sqcap \neg B))^{\mathcal{I}} = \{d, e\}$$

$$\text{sub}(C, \mathcal{T}) = \{A, B, \exists r.B, \forall r.B, A \sqcup B, A \sqcap \neg B, \exists s.(A \sqcap \neg B)\}$$

$$t_{\mathcal{I}}(d) = \{A, \exists r.B, \forall r.B, A \sqcup B, A \sqcap \neg B, \exists s.(A \sqcap \neg B)\}$$


$$t_{\mathcal{I}}(e) = \{A, \exists r.B, \forall r.B, A \sqcup B, A \sqcap \neg B, \exists s.(A \sqcap \neg B)\}$$

$$t_{\mathcal{I}}(f) = \{A, B, \exists r.B, \forall r.B, A \sqcup B\}$$

$$t_{\mathcal{I}}(g) = \{A, B, \exists r.B, \forall r.B, A \sqcup B\}$$


✓

7B fehlt - 1P.



✓ 10/10

Abbildung 1: Unravelling der Interpretation \mathcal{I}_2



✓ 10/10

20/20


Abbildung 2: Unravelling der Interpretation \mathcal{I}_3

$$t_{\mathcal{I}}(h) = \{B, \forall r. B, A \sqcup B\} \quad \checkmark$$

Weil d und e die gleichen Typen haben, gilt: $[d] \simeq [e]$ und weil f und g die gleichen Typen haben gilt: $[f] \simeq [g]$. \checkmark

Damit gibt es 3 Äquivalenzklassen: $[d] = \{d, e\}, [f] = \{f, g\}$ und $[h] = \{h\}$. \checkmark

Die Filtration \mathcal{J} bzgl. C und \mathcal{T} :



49: 14/15

Nein: z.B.:
 $d \in (\forall r. A)^{\mathcal{I}}$,
aber $[d] \notin (\forall r. A)^{\mathcal{J}}$

Aufgabe 4 b)

Ja es gilt $(\mathcal{I}, d) \sim (\mathcal{J}, [d])$, denn für alle $d \in \Delta^{\mathcal{I}}$ und $D \in \text{sub}(C, \mathcal{T})$ gilt:
 $d \in D^{\mathcal{I}}$ gdw. $[d] \in D^{\mathcal{J}}$.

Selbst wenn die rechte Seite gelten würde, würde daraus
nicht $(\mathcal{I}, d) \sim (\mathcal{J}, [d])$ folgen – siehe Folie 3,15! 48: 0/5

4: 14/20

Aufgabe 5 a)

Wir wissen aus der Vorlesung, dass eine TBox eine endliche Menge von Konzeptinklusionen ist (Definition 2.5). Weiterhin wissen wir, dass die Erfüllbarkeit von Konzepten bezüglich TBoxen definiert ist in Definition 2.6. Hier ist C erfüllbar bzgl. \mathcal{T} gdw. \mathcal{T} besitzt ein Modell \mathcal{I} in dem $C^{\mathcal{I}} \neq \emptyset$.

Beweis für Aufgabenstellung a) Nehmen wir an, C sei ein \mathcal{ALC} -Konzept und \mathcal{I} eine Interpretation, wobei $C^{\mathcal{I}} = \emptyset$. Dann gilt auch $C \equiv \perp$. Hier besteht aber ein Widerspruch, denn laut Definition 2.6 (i) ist C nur erfüllbar, wenn auch $C^{\mathcal{I}} \neq \emptyset$. \square

nicht zielführend

0/10

Aufgabe 5 b)

kein - alle Elemente sind in C gdw sie in D sind

Hier müssen wir zeigen, dass alle Elemente sowohl in C als auch in D sind.

Beweis für Aufgabenstellung b) Wir zeigen, dass es kein Element gibt, dass in C aber nicht in D besteht, und dass diese Elemente \top subsumieren.

Nehmen wir an, C und D seien \mathcal{ALC} -Konzepte und \mathcal{I} ist eine Interpretation.

Wenn $e \in C^{\mathcal{I}}$ dann folgt daraus, dass $e \notin \neg C^{\mathcal{I}}$.

Und wenn auch $e \in D^{\mathcal{I}}$ dann folgt $e \notin \neg D^{\mathcal{I}}$.

Somit ist auch $e \notin (\neg C \sqcap \neg D)^{\mathcal{I}}$.

Und auch $e \in (C \sqcap D)^{\mathcal{I}}$.

Hier kommen wir zur Schlussfolgerung.

Laut Definition 2.9 (iii) wird \top von $(C \sqcap D) \sqcup (\neg C \sqcap \neg D)$ subsumiert gdw.

$\mathcal{T} \models C \equiv D$.

Das war ja gerade zu zeigen.

Somit bestehen Konzepte C und D , in dieser Interpretation, aus den Elementen die sich aus der Konjunktion erschließen.

Was bedeutet, dass C und D die gleichen Elemente besitzen.

Und somit auch $C \equiv D$. □


6/10

0/20

Aufgabe 6 a)

Gegeben seien die folgenden Interpretationen \mathcal{I}_1 , \mathcal{I}_2 und das \mathcal{ALC} -Konzept $C \equiv 2r.\top$.

\mathcal{I}_1



\mathcal{I}_2



Dann ist offensichtlich $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$ und $d_1 \in C^{\mathcal{I}_1}$ aber $d_2 \notin C^{\mathcal{I}_2}$. □

Geht die Bisimulation an.

6a: 4/5

Ob d_2', d_2'' von d_2 verschieden sind, ist nicht relevant.
 unser Gegenbeispiel aus a) geht ja auch durch, wenn d_2
 statt der r -Schleife einen neuen r -Nachfolger d_2' hätte.
 Wichtig ist $d_2' \neq d_2''$. (*)

Aufgabe 6 b)

Zusätzlich muss gelten: ... und $(d_2, d_2'), (d_2, d_2'') \in r^{\mathcal{I}_2}$ mit $d_2 \neq d_2'$ und $d_2 \neq d_2''$
 für einen Rollennamen r .

Das bedeutet, wir wollen den Fall verhindern, dass eine Bisimulation wie $(\mathcal{I}_1, d_1) \sim (\mathcal{I}_2, d_2)$ zustande kommt, da demnach d_2 mit der Kante r zu sich selbst nicht ausreicht. Daher würde durch die modifizierte Bedingung gelten: $(\mathcal{I}_1, d_1) \not\sim (\mathcal{I}_2, d_2)$.

Modifizierte Bedingung 4. Wenn $d_1 \rho d_2$ und $(d_1, d_1'), (d_1, d_1'') \in r^{\mathcal{I}_1}$ mit $d_1' \neq d_1''$ und $(d_2, d_2'), (d_2, d_2'') \in r^{\mathcal{I}_2}$ mit $d_2 \neq d_2'$ und $d_2 \neq d_2''$ für einen Rollennamen r , dann gibt es $d_2', d_2'' \in \Delta^{\mathcal{I}_2}$ mit $d_1' \rho d_2'$ und $d_1'' \rho d_2''$ sowie $(d_2, d_2'), (d_2, d_2'') \in r^{\mathcal{I}_2}$

6b: 2/7

Aufgabe 6 c)

Es ist nur der Induktionsschritt $\geq nr.C$ nötig, weil $\leq nr.C$ dadurch bereits
 inbegriffen ist. - Ja, aber warum?

Induktionsschritt: Fall für Konzepte der Form $(\geq nr.C)$

$C \models \geq nr.D$ für alle natürlichen Zahlen n

Für die Richtung " \Rightarrow " argumentieren wir so:

$d_1 \in C^{\mathcal{I}_1}$

\Rightarrow es gibt ein $e_1 \in \Delta^{\mathcal{I}_1}$ mit $(d_1, e_1) \in r^{\mathcal{I}_1}$ und $e_1 \in D$ [Regel: Semantik " $\geq n$ "]

\Rightarrow es gibt ein $e_2 \in \Delta^{\mathcal{I}_2}$ mit $(d_2, e_2) \in r^{\mathcal{I}_2}$ und $e_1 \rho e_2$ [Regel: Bedingung 4. (modifiziert) Bisim.ALCQ]

$\Rightarrow e_2 \in D^{\mathcal{I}_2}$ [Regel: Induktionsvoraus.]

$\Rightarrow d_2 \in \geq nr.D$ [Regel: Semantik " $\geq n$ ".]

— Nein: das ist die Semantik von $\exists r.D$
 bzw. $(\geq 1r.D)$
 nicht $(\geq nr.D)$
 für $n \geq 2$.

Das Argument für die Rückrichtung " \Leftarrow " ist analog, unter der Verwendung von der neuen modifizierten Bedingung (4) für Bisimulation.

Nein, denn dazu
 braucht man die
 „Umkehrung“
 von Regel (4)

(so, wie (3) die
 Umkehrung von (2) ist).

6c: 2/8



Außerdem müssen die d_1', d_1'' bzw. d_2', d_2'' durch n paarweise
 verschiedene Elemente ersetzt werden, und es fehlt die
 „Umkehrung“ von Bedingung (4), siehe auch Bemerkungen bei c).

6: 8/20