

BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC 2

Câu 1. Trong các đồ thị nào dưới đây đồ thị nào có cạnh bội?

1. Đơn đồ thị vô hướng.
2. Đa đồ thị vô hướng.
3. Giả đồ thị vô hướng.
4. Đơn đồ thị có hướng.
5. Đa đồ thị có hướng.

A. 1, 4, 5.

B. 2, 3.

C. 2, 5.

D. 1, 2, 4, 5.

E. Tất cả phương án đều sai..

Lời giải.

Đáp án đúng: 2, 3

Chọn đáp án **B**

□

Câu 2. Hãy điền vào chỗ còn thiếu dưới đây:

Đồ thị có hướng $G = \langle V, E \rangle$ được gọi là ... nếu giữa hai đỉnh bất kỳ $u \in V, v \in V$ đều có đường đi từ u đến v .

- A. Định chiều được.
- B. Thành phần liên thông.
- C. Liên thông mạnh.
- D. Liên thông yếu.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: Liên thông mạnh

Chọn đáp án **C**

□

Câu 3. Hãy điền vào chỗ còn thiếu dưới đây:

... $G = \langle V, E \rangle$ bao gồm V là tập các đỉnh, E là tập các cặp có thứ tự gồm hai phần tử của V , gọi là các cung.

- A. Đa đồ thị có hướng.
- B. Đơn đồ thị có hướng.
- C. Đa đồ thị vô hướng.
- D. Giả đồ thị vô hướng.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: Đơn đồ thị có hướng

Chọn đáp án **B**

□

Câu 4. Hãy điền vào chỗ còn thiếu dưới đây:

Đồ thị $G = \langle V, E \rangle$ được gọi là ... nếu tập đỉnh V của nó có thể phân hoạch thành hai tập X và Y sao cho mỗi cạnh của đồ thị chỉ có dạng (x, y) , trong đó $x \in X$ và $y \in Y$.

- A. Đồ thị đầy đủ.
- B. Đồ thị vòng.
- C. Đồ thị hai phía.
- D. Đồ thị bánh xe.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: Đồ thị hai phía

Chọn đáp án **C**

□

Câu 5. Cho một đồ thị vòng có số đỉnh là 5. Hỏi cần thêm bao nhiêu cạnh nữa để đồ thị trên thành đồ thị đầy đủ?

- A. 7.
- B. 4.
- C. 3.
- D. 5.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: 5

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 6. Cho một đồ thị đồ thị vòng có số đỉnh là 15. Hỏi đồ thị đó có bao nhiêu cạnh?

A. 15.

B. 28.

C. 105.

D. 208.

E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: 15

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 7. Hãy điền vào chỗ còn thiếu dưới đây:

Ta gọi ... của đỉnh v trên đồ thị có hướng là số cung của đồ thị đi vào v và ký hiệu là $\deg^-(v)$.

A. Bán bậc ra.

B. Đỉnh trụ.

C. Cạnh cầu.

D. Bán bậc vào.

E. Tất cả phương án đều sai.


Lời giải.

Đáp án đúng: Bán bậc vào

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 8. Cho đồ thị vô hướng dưới đây. Hãy liệt kê các đỉnh treo của đồ thị?



A. $\{4\}$.

B. $\{6\}$.

C. $\{2, 4, 7\}$.

D. $\{2, 3, 7\}$.

E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{6\}$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 9. Đây là công thức tính số cạnh của đồ thị bánh xe có n đỉnh?

A. Số cạnh: $2n$.

B. Số cạnh: $n(n-1)$.

C. Số cạnh: n .

D. Số cạnh: $2(n-1)$.

E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: Số cạnh: $2(n-1)$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 10. Cho biết các tính chất nào dưới đây là của đơn đồ thị có hướng $G = \langle V, E \rangle$.

1. Không có cạnh bội.
 2. Có cạnh bội.
 3. Không có cung lặp.
 4. Tổng số bậc của tất cả các đỉnh bằng 2 lần số cạnh.
 5. Có cung.
 6. Số các đỉnh có bậc lẻ là số chẵn.
- A. 1, 3, 6. B. 1, 3, 5. C. 2, 4.
D. 2, 4, 6. E. Tất cả phương án đều sai.


Lời giải.

Đáp án đúng: 1, 3, 5

Chọn đáp án **B**

□

Câu 11. Cho đồ thị vô hướng. Chỉ ra đâu là cạnh cầu?



- A. (5, 6). B. (1, 2). C. (2, 3).
D. (3, 6). E. Tất cả phương án đều sai.


Lời giải.

Đáp án đúng: (3, 6)

Chọn đáp án **D**

□

Câu 12. Cho biết đồ thị dưới đây là loại đồ thị nào?



- A. Đồ thị bánh xe, đồ thị đầy đủ.
B. Đồ thị bánh xe.
C. Đồ thị vòng.
D. Đồ thị đầy đủ.
E. Tất cả phương án đều sai.




Lời giải.

Đáp án đúng: Đồ thị bánh xe

Chọn đáp án **B**

□

Câu 13. Cho biết những đồ thị dưới đây là loại đồ thị nào?



A. Đồ thị đầy đủ.

B. Đơn đồ thị có hướng.

C. Đồ thị bánh xe.

D. Đồ thị vòng.

E. Tất cả phương án đều sai.


Lời giải.

Đáp án đúng: Đồ thị bánh xe

Chọn đáp án **C**

□

Câu 14. Cho biết đồ thị dưới đây là loại đồ thị nào?



A. Đa đồ thị vô hướng.

B. Đa đồ thị có hướng.

C. Đơn đồ thị có hướng.

D. Đồ thị có trọng số.

E. Tất cả phương án đều sai.


Lời giải.

Đáp án đúng: Đa đồ thị vô hướng

Chọn đáp án **A**

□

Câu 15. Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$. Chọn phương án đúng:



- A. G là đồ thị hai phía với các tập $X = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ và $Y = \{1, 2\}$.
 B. G là đồ thị hai phía với các tập $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$ và $Y = \{6\}$.
 C. G là đồ thị hai phía với các tập $X = \{1, 2, 4, 5, 7, 10\}$ và $Y = \{8, 9, 3, 6\}$.
 D. G là đồ thị hai phía với các tập $X = \{9, 5, 7\}$ và $Y = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$.
 E. Tất cả phương án đều sai.


Lời giải.

Đáp án đúng: G là đồ thị hai phía với các tập $X = \{1, 2, 4, 5, 7, 10\}$ và $Y = \{8, 9, 3, 6\}$

Chọn đáp án **C**

☐

Câu 16. Cho đồ thị vô hướng dưới đây. Hỏi đồ thị có bao nhiêu đỉnh treo?



- A. 3.
D. 1.
- B. 5.
- C. 4.
E. Tất cả phương án đều sai.


Lời giải.

Đáp án đúng: 3

Chọn đáp án **A**

☐

Câu 17. Cho đồ thị có hướng. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



- A. $\deg^-(2) + \deg^+(4) + \deg^-(5) = 5$.
 B. $\deg^-(2) + \deg^+(4) + \deg^-(5) = 7$.
 C. $\deg^-(2) + \deg^+(4) + \deg^-(5) = 8$.
 D. $\deg^-(2) + \deg^+(4) + \deg^-(5) = 2$.
 E. Tất cả phương án đều sai.


Lời giải.

Đáp án đúng: $\deg^-(2) + \deg^+(4) + \deg^-(5) = 5$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 18. Cho đồ thị có hướng. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



- A. $\deg^+(1) + \deg^+(2) + \deg^+(3) + \deg^+(4) + \deg^+(5) + \deg^+(6) = 12$.
 B. $\deg^+(1) + \deg^+(2) + \deg^+(3) + \deg^+(4) + \deg^+(5) + \deg^+(6) = 14$.
 C. $\deg^+(1) + \deg^+(2) + \deg^+(3) + \deg^+(4) + \deg^+(5) + \deg^+(6) = 13$.
 D. $\deg^+(1) + \deg^+(2) + \deg^+(3) + \deg^+(4) + \deg^+(5) + \deg^+(6) = 11$.
 E. Tất cả phương án đều sai.


Lời giải.

Đáp án đúng: $\deg^+(1) + \deg^+(2) + \deg^+(3) + \deg^+(4) + \deg^+(5) + \deg^+(6) = 11$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 19. Cho đồ thị có hướng. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



- A. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^-(3) + \deg^-(4) + \deg^-(5) = 5$.
 B. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^-(3) + \deg^-(4) + \deg^-(5) = 6$.
 C. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^-(3) + \deg^-(4) + \deg^-(5) = 7$.
 D. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^-(3) + \deg^-(4) + \deg^-(5) = 4$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^-(3) + \deg^-(4) + \deg^-(5) = 5$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 20. Bảng dưới đây cần loại bỏ những hàng nào để trở thành danh sách cạnh của đồ thị vô hướng ?

Đỉnh	Đỉnh kề
1	3
1	8
8	1
2	3
2	4
4	2
2	6
6	2
2	7
3	5
3	8
4	5
4	8
5	6
5	8
6	7
7	8

- A. Không cần loại bỏ hàng nào.
- B. Hàng 3,6.
- C. Hàng 4,7,8.
- D. Hàng 3,6,8.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 21. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ biểu diễn dưới dạng ma trận kề dưới đây, ma trận liên thuộc của G gồm bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ?

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. 6 hàng,6 cột.
- B. 5 hàng,5 cột.
- C. 5 hàng,6 cột.
- D. 5 hàng,10 cột.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 22. Đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm 4 đỉnh, 6 cạnh được biểu diễn dưới dạng ma trận liên thuộc. Đỉnh nào có bán bậc ra bằng 3

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. Đỉnh 1.
- B. Đỉnh 2.
- C. Đỉnh 3.
- D. Đỉnh 4.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 23. Đơn đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách kề. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận kề A thì

Đỉnh	Danh sách kề
1	2, 3, 4
2	1, 3, 4, 5
3	1, 2, 4
4	1, 2, 3, 5
5	2, 4

- A. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 2 là $(1,0,1,1,1)$.
- B. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 2 là $(1,0,0,1,1)$.
- C. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 4 là $(1,0,0,0,1)$.
- D. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 5 là $(0,1,1,0,0)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án (A)

□

Câu 24. Cho đồ thị có hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách cạnh. Nếu biểu diễn G dưới dạng danh sách kề thì:

Đỉnh	Đỉnh kề
1	5
3	4
3	5
4	1
4	2
4	3
4	5
5	1
5	2
5	3
5	4

- A. Đỉnh 2 có mặt trong Ke(1) và Ke(5).
- B. Đỉnh 3 có mặt trong Ke(4) và Ke(5).
- C. Đỉnh 4 có mặt trong Ke(1) và Ke(3).
- D. Đỉnh 6 không có mặt trong danh sách kề.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án (B)

□

Câu 25. Cho đồ thị có hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dưới dạng sách cạnh với trọng số. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận trọng số A thì:

Đỉnh	Đỉnh kề	Trọng số
1	2	9
1	3	10
2	1	10
2	3	7
3	1	10
3	2	6
4	1	4
4	3	5

- A. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 2 là $(4,0,1,2)$.
- B. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có cột 2 là $(4,0,1,2)$.
- C. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 3 là $(0,1,0,5)$.
- D. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 4 là $(4,0,5,0)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án (D)

□

Câu 26. Cho đồ thị vô hướng có trọng số biểu diễn bằng ma trận trọng số $A = [a_{i,j}]_{n \times n}$, trong đó $a_{i,j} = 0$ nếu không có cạnh (i,j) , nếu có cạnh (i,j) thì $a_{i,j}$ là trọng số của cạnh (i,j) . Tổng trọng số của tất cả các cạnh của đồ thị bằng bao nhiêu ?

1. (Tổng tất cả phần tử của ma trận A) / 2
2. Tổng tất cả phần tử trên đường chéo chính
3. Tổng tất cả phần tử dưới đường chéo chính
4. Tổng các phần tử trong ma trận
5. (Tổng tất cả phần tử trên đường chéo chính) / 2

A. 1,2.

B. 1,4,5.

C. 2,3,5.

D. 1,2,3.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **D**

□

Câu 27. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như dưới đây. Giá trị của $\text{Deg}(2)$ là bao nhiêu ?

Đỉnh	Đỉnh kề
1	2
1	3
2	3
2	5
2	6
3	4
3	5
3	6
4	5
4	6
5	6

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **D**

□

Câu 28. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như dưới đây. Đỉnh nào là đỉnh treo của đồ thị ?

Đỉnh	Đỉnh kề
1	2
1	4
1	5
2	5
2	6
3	6
4	5

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 6.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **C**

□

Câu 29. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận liên thuộc. Đồ thị này có bao nhiêu cạnh ?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **C**

□

Câu 30. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G dưới dạng ma trận có trọng số. Đồ thị có bao nhiêu cạnh ?

$$\begin{bmatrix} \infty & 8 & \infty & 10 & \infty & 8 \\ 8 & \infty & 8 & 5 & \infty & 3 \\ \infty & 8 & \infty & \infty & 7 & 5 \\ 10 & 5 & \infty & \infty & 10 & \infty \\ \infty & \infty & 7 & 10 & \infty & \infty \\ 8 & 3 & 5 & \infty & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

A. 8.

B. 9.

C. 18.

D. 20.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **B**

□

Câu 31. Đồ thị $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số dưới đây. Tổng tất cả bán đỉnh bậc vào các đỉnh của đồ thị là bao nhiêu ?

$$\begin{bmatrix} \infty & 4 & 6 & \infty & 6 & 10 \\ 5 & \infty & 4 & \infty & 8 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 7 & 3 \\ \infty & 2 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 8 & 8 & \infty & \infty & \infty \\ 2 & \infty & 7 & \infty & 7 & \infty \end{bmatrix}$$

A. 7.

B. 8.

C. 14.

D. 15.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **D**

□

Câu 32. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề, biểu diễn G dưới dạng danh sách cạnh gồm các cạnh theo thứ tự là:

- A. Đỉnh 1 có mặt trong Ke(2),Ke(3),Ke(4) và Ke(6).
- B. Đỉnh 2 có mặt trong Ke(1),Ke(3),Ke(4) và Ke(6).
- C. Đỉnh 3 có mặt trong Ke(1),Ke(2),Ke(4) và Ke(6).
- D. Đỉnh 4 có mặt trong Ke(1),Ke(2),Ke(3) và Ke(6).
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 36. Đồ thị có hướng $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng ma trận kề dưới đây, tổng tất cả bán bậc vào của đồ thị bằng bao nhiêu ?

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. 16.
- B. 17.
- C. 32.
- D. 34.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 37. Cho đồ thị có hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dưới dạng sách cạnh với trọng số. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận trọng số A thì:

Đỉnh	Đỉnh kề	Trọng số
1	2	5
1	3	10
2	1	5
2	3	9
3	1	5
3	2	4
4	1	4
4	3	5

- A. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 2 là $(4,0,1,2)$.
- B. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có cột 2 là $(4,0,1,2)$.
- C. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 3 là $(0,1,0,5)$.
- D. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 4 là $(4,0,5,0)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 38. Trong các mô tả về tính chất của ma trận kề đối với đồ thị có hướng, những mô tả nào là chính xác ?

1. Tổng các phần tử của ma trận bằng số cạnh
2. Tổng các phần tử của hàng u bằng tổng các phần tử của cột u
3. Tổng các phần tử của hàng u là bán đỉnh bậc ra của đỉnh u

4. Tổng các phần tử của cột u là bán đỉnh bậc ra của đỉnh u

A. 1,3.

B. 1,2,4.

C. 1,3,4.

D. 2,3.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 39. Cho đồ thị có hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dưới dạng sách cạnh với trọng số. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận trọng số A thì:

Đỉnh	Đỉnh kề	Trọng số
1	2	6
1	3	3
2	1	4
2	3	9
3	1	6
3	2	7
4	1	4
4	3	5

A. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 2 là (4,0,1,2).

B. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có cột 2 là (4,0,1,2).

C. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 3 là (0,1,0,5).

D. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 4 là (4,0,5,0).

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 40. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề, chọn phương án đúng:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. Đỉnh 1 có mặt trong Ke(2), Ke(3) và Ke(4).

B. Đỉnh 2 có mặt trong Ke(1), Ke(4) và Ke(5).

C. Đỉnh 3 có mặt trong Ke(1), Ke(4) và Ke(5).

D. Đỉnh 4 có mặt trong Ke(1), Ke(2) và Ke(3).

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 41. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận liên thuộc. Đồ thị này có bao nhiêu cạnh ?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **C**

□

Câu 42. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề, biểu diễn G dưới dạng danh sách cạnh theo thứ tự là:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. (1,2),(1,4),(2,3),(2,4) và (3,1).

B. (1,2),(1,4),(1,3),(2,3) và (4,2).

C. (1,2),(1,4),(2,3),(1,3) và (4,2).

D. (1,2),(1,4),(2,3),(3,1) và (4,2).

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **A**

□

Câu 43. Trong các mô tả dưới, đâu là tính chất danh sách cạnh của đồ thị vô hướng ?

A. Đỉnh cuối lớn hơn đỉnh đầu mỗi cạnh.

B. Đỉnh cuối không nhất thiết phải lớn hơn đỉnh đầu mỗi cạnh.

C. Đỉnh cuối nhỏ hơn đỉnh đầu mỗi cạnh.

D. Đỉnh cuối không nhất thiết phải nhỏ hơn đỉnh đầu mỗi cạnh.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **A**

□

Câu 44. Cho đơn đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận kề A thì:

Đỉnh	Danh sách kề
1	2, 3, 5
2	1, 4, 5
3	1
4	1, 2, 5
5	1, 2, 4

- A. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 2 là $(1,0,0,1,1)$.
 B. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 2 là $(1,0,0,0,1)$.
 C. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 4 là $(1,0,0,0,1)$.
 D. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 5 là $(0,1,1,1,0)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án A

Câu 51. Cho đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dưới dạng sách cạnh với trọng số. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận trọng số A thì:

Đỉnh	Đỉnh kề	Trọng số
1	2	10
1	3	8
1	4	8
2	3	3
2	4	2
3	4	5

- A. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 2 là $(4,0,1,2)$.
- B. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có cột 2 là $(4,0,1,2)$.
- C. Ma trận A gồm 4 hàng, 6 cột và có hàng 4 là $(8,0,2,5)$.
- D. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 4 là $(8,2,5,0)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 52. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị nửa Euler nhưng không phải là Euler:

- A. G liên thông yếu và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra chênh lệch nhau 1.
- B. G liên thông mạnh và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra chênh lệch nhau 1.
- C. G liên thông yếu và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra khác nhau.
- D. G liên thông yếu và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra là lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 53. Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị Euler:

- A. Mọi thành phần liên thông của G là đồ thị Euler.
- B. G liên thông và mọi đỉnh của nó đều có bậc chẵn.
- C. G không chứa đỉnh bậc lẻ.
- D. G liên thông và có $m = n$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 54. Cho đồ thị $G = (V, E)$. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. Đường đi đơn của G đi qua mỗi đỉnh của nó không quá 1 lần gọi là đường đi Euler.
- B. Đường đi đơn trong G chứa tất cả các cạnh của nó gọi là đường đi Euler.
- C. Đường đi đơn của G thường gọi là đường đi Euler.

D. Đường đi đơn trong G đi qua các cạnh của nó gọi là đường đi Euler.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 55. Cho đồ thị $G = (V, E)$. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Đường đi đơn của G đi qua mỗi đỉnh của nó không quá 1 lần gọi là đường đi Euler.

B. Đường đi đơn trong G đi qua các cạnh của nó gọi là đường đi Euler.

C. Đường đi đơn trong G chứa tất cả các cạnh của nó gọi là đường đi Euler.

D. Đường đi đơn của G thường gọi là đường đi Euler.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 56. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị nửa Euler nhưng không phải là Euler:

A. G liên thông mạnh và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra chênh lệch nhau 1.

B. G liên thông yếu và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra chênh lệch nhau 1.

C. G liên thông yếu và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra là lẻ.

D. G liên thông yếu và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra khác nhau.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 57. Cho đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Hãy chọn phương án đúng:

A. Chu trình trong G đi qua mỗi cạnh của nó không quá 1 lần gọi là chu trình Hamilton.

B. Chu trình trong G đi qua mỗi đỉnh của nó không quá 1 lần gọi là chu trình Hamilton.

C. Chu trình bắt đầu tại đỉnh v đi qua tất cả các đỉnh còn lại của G , mỗi đỉnh 1 lần rồi quay trở về v gọi là chu trình Hamilton.

D. Chu trình trong G gồm n cạnh gọi là chu trình Hamilton.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 58. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị nửa Hamilton:

A. Tồn tại một thành phần liên thông mạnh của G là đồ thị Hamilton.

B. G liên thông yếu và có $m = n-1$ cạnh.

C. G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có các bán bậc lẻ.

D. Không có điều kiện cần và đủ để xác định sự tồn tại của đường đi Hamilton.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 59. Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị Euler:

- A. G không chứa đỉnh bậc lẻ.
- B. G liên thông và có $m = n$ cạnh.
- C. G liên thông và mọi đỉnh của nó đều có bậc chẵn.
- D. Mọi thành phần liên thông của G là đồ thị Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 60. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị Euler:

- A. G liên thông mạnh và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra là chẵn.
- B. G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra là chẵn.
- C. G liên thông mạnh và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra bằng nhau.
- D. G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra bằng nhau.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 61. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị Euler:

- A. G liên thông mạnh và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra là chẵn.
- B. G liên thông mạnh và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra bằng nhau.
- C. G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra bằng nhau.
- D. G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra là chẵn.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 62. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề. Hãy chọn phương án đúng:

0	0	1	0	0
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0

- A. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
- B. G là đồ thị Euler.

- C. G không phải là đồ thị Euler.
- D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.


Đáp án đúng: G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 63. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như sau. Hãy chọn phương án đúng:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	3
1	4
2	1
3	1
4	5
5	2



- A. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
- B. G là đồ thị Euler.
- C. G không phải là đồ thị Euler.
- D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: G là đồ thị Euler

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 64. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách kề như sau. Hãy chọn phương án đúng:

Đỉnh	Danh sách kề
1	5
2	1, <u>3</u>
4	2
<u>5</u>	2, 4

- A. G là đồ thị Euler.
- B. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
- C. G không phải là đồ thị Euler.
- D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 65. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. G là đồ thị Euler.
- B. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.

0	0	1	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	0	1
0	0	0	0	1
1	1	1	1	0

- C. G không phải là đồ thị Euler.
 D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 66. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như sau. Hãy chọn phương án đúng:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	3
1	4
2	3
2	5
3	4
3	5

- A. G là đồ thị Euler.
 B. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
 C. G không phải là đồ thị Euler.
 D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: G là đồ thị Euler

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 67. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách kề như sau. Hãy chọn phương án đúng:

Đỉnh	Danh sách kề
1	2, 4, 5
2	5
3	5
4	5

Handwritten notes for Câu 67:
 1 3
 2 5
 3 1
 4 1
 5 4

- A. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
 B. G là đồ thị Euler.
 C. G không phải là đồ thị Euler.
 D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 68. Cho đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh có ma trận kề như sau:

0	1	1	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0

1 2
3 4 5

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 5$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự trong H đầu tiên được liệt kê là:

A. $\{5, 1, 4, 2, 3, 5\}$.

B. $\{5, 3, 4, 2, 1, 5\}$.

C. $\{5, 3, 2, 1, 4, 5\}$.

D. $\{5, 3, 1, 4, 2, 5\}$.

E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng là: $\{5, 3, 2, 1, 4, 5\}$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 69. Cho đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh có danh sách cạnh như sau:

Đỉnh 1	Đỉnh 2
1	3
1	5
2	3
2	4
2	5
3	5
4	5

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự trong H đầu tiên được liệt kê là:

A. $\{4, 5, 1, 3, 2, 4\}$.

B. $\{4, 2, 3, 1, 5, 4\}$.

C. $\{4, 3, 5, 2, 1, 4\}$.

D. $\{4, 3, 5, 1, 2, 4\}$.

E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng là: $\{4, 2, 3, 1, 5, 4\}$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 70. Cho đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh có danh sách kề như sau:

Đỉnh	Danh sách kề
1	2, 3, 5
2	1, 3, 4
3	1, 2
4	2, 5
5	1, 4

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 5$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự trong H đầu tiên được liệt kê là:

A. $\{5, 1, 3, 2, 4, 5\}$.

B. $\{5, 2, 3, 4, 1, 5\}$.

C. $\{5, 3, 4, 2, 1, 5\}$.

D. $\{5, 4, 1, 3, 2, 5\}$.

E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.Đáp án đúng là: $\{5, 1, 3, 2, 4, 5\}$ Chọn đáp án **A**

□

Câu 71. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh có ma trận kề như sau:

0	1	1	1	1
1	0	1	0	0
1	0	0	1	0
0	0	1	0	1
1	1	0	0	0

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự khi thực hiện thuật toán trong H đầu tiên được liệt kê là:

A. $\{2, 1, 3, 4, 5, 2\}$.B. $\{2, 1, 4, 5, 3, 2\}$.C. $\{2, 5, 3, 4, 1, 2\}$.D. $\{2, 5, 4, 1, 3, 2\}$.

E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.Đáp án đúng là: $\{2, 1, 3, 4, 5, 2\}$ Chọn đáp án **A**

□

Câu 72. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh có danh sách cạnh như sau:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	3
1	4
1	5
2	5
3	4
3	5
4	1
4	2
4	3
4	5
5	1
5	2
5	3
5	4

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự khi thực hiện thuật toán trong H đầu tiên được liệt kê là:

A. $\{4, 2, 1, 5, 3, 4\}$.B. $\{4, 5, 1, 2, 3, 4\}$.C. $\{4, 1, 2, 5, 3, 4\}$.D. $\{4, 5, 2, 3, 1, 4\}$.

E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.Đáp án đúng là: $\{4, 1, 2, 5, 3, 4\}$ Chọn đáp án **C**

□

Câu 73. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh có danh sách kề như sau:

Đỉnh	Danh sách kề
1	3
2	4
3	1, 2
4	5
5	1, 4

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự khi thực hiện thuật toán trong H đầu tiên được liệt kê là:

- A. $\{3, 4, 5, 1, 2, 3\}$. B. $\{3, 4, 1, 2, 5, 3\}$. C. $\{3, 2, 4, 5, 1, 3\}$.
D. $\{3, 2, 5, 4, 1, 3\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng là: $\{3, 2, 4, 5, 1, 3\}$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 74. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	0	0	0
1	0	1	0	0

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G . Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{1, 1, 5, 4, 3, 1, 2\}$. B. $\{3, 5, 4, 1, 1, 2, 1\}$. C. $\{1, 5, 4, 3, 1, 1, 2\}$.
D. $\{1, 2, 4, 1, 3, 5, 1\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{1, 2, 4, 1, 3, 5, 1\}$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 75. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	4
1	5
2	3
2	4
3	5

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G . Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{1, 5, 3, 2, 1, 4\}$. B. $\{1, 5, 1, 3, 2, 4\}$. C. $\{1, 4, 2, 3, 5, 1\}$.
D. $\{1, 5, 1, 2, 4, 3\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{1, 4, 2, 3, 5, 1\}$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 76. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

Đỉnh	Danh sách kề
1	3, 4
2	4, 5
3	1, 5
4	1, 2
5	2, 3

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G . Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{1, 3, 5, 2, 4, 1\}$. B. $\{1, 2, 5, 4, 3, 1\}$. C. $\{1, 2, 3, 1, 5, 4\}$.
D. $\{1, 4, 3, 1, 2, 5\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{1, 3, 5, 2, 4, 1\}$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 77. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	1	0
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G . Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 5, 3, 4, 5, 4, 1\}$.
B. $\{3, 4, 3, 3, 5, 2, 5, 1, 4, 2, 1, 4, 1\}$.
C. $\{1, 4, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 3, 1, 4, 1, 2\}$.
D. $\{1, 5, 3, 5, 2, 1, 1, 4, 4, 3, 4, 3, 2\}$.
E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 5, 3, 4, 5, 4, 1\}$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 78. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	3
1	4
1	5
2	3
3	1
3	2
4	1
4	5
5	1
5	4

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{1, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 4, 5, 1\}$.
- B. $\{3, 1, 5, 2, 1, 1, 4, 1, 3, 5, 4\}$.
- C. $\{1, 3, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 1, 2, 4\}$.
- D. $\{4, 3, 5, 1, 4, 1, 1, 1, 5, 3, 2\}$.
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{1, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 4, 5, 1\}$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 79. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

Đỉnh	Danh sách kề
1	2, 3, 4
2	1, 3, 5
3	2, 4, 5
4	1, 3, 5
5	1, 2, 4

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 5, 2, 5, 4, 5, 1\}$.
- B. $\{1, 2, 5, 5, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 4, 4\}$.
- C. $\{1, 4, 3, 5, 1, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 5, 2, 2\}$.
- D. $\{4, 3, 2, 3, 3, 5, 4, 1, 5, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 2\}$.
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 5, 2, 5, 4, 5, 1\}$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 80. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

0	1	1	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E của G bắt đầu tại đỉnh bậc lẻ với số thứ tự nhỏ nhất. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự khi thực hiện thuật toán là:

- A. $\{2, 1, 3, 2, 5, 1, 4, 5\}$.
- B. $\{5, 4, 2, 1, 3, 2, 5, 1\}$.
- C. $\{2, 4, 1, 1, 5, 5, 2, 3\}$.
- D. $\{3, 4, 1, 5, 5, 2, 1, 2\}$.
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{2, 1, 3, 2, 5, 1, 4, 5\}$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 81. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	3
1	4
2	4
3	5
4	5

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E của G bắt đầu tại đỉnh bậc lẻ với số thứ tự nhỏ nhất. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự khi thực hiện thuật toán là:

- A. {4, 4, 1, 3, 1, 2, 5}. B. {4, 4, 1, 1, 3, 2, 5}. C. {1, 2, 4, 1, 3, 5, 4}.
D. {2, 1, 3, 4, 4, 5, 1}. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: {1, 2, 4, 1, 3, 5, 4}

Chọn đáp án **C**

□

Câu 82. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

Đỉnh	Danh sách kề
2	3, 4
3	4
4	5

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E của G bắt đầu tại đỉnh bậc lẻ với số thứ tự nhỏ nhất. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự khi thực hiện thuật toán là:

- A. {4, 1, 1, 2, 3, 5, 5}. B. {1, 5, 1, 5, 2, 3, 4}. C. {1, 4, 5, 1, 2, 3, 5}.
D. {1, 2, 5, 1, 4, 5, 3}. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: {1, 2, 5, 1, 4, 5, 3}

Chọn đáp án **D**

□

Câu 83. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	0	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	0

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E bắt đầu tại đỉnh có bậc ra lớn hơn bậc vào. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. {2, 4, 1, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 3, 5, 1, 1}.
B. {3, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 5, 4, 1, 5, 2}.
C. {3, 2, 4, 3, 1, 2, 5, 1, 1, 5, 2, 3, 5}.
D. {3, 5, 3, 2, 5, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 1}.
E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: {3, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 5, 4, 1, 5, 2}

Chọn đáp án **B**

□

Câu 84. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn bởi danh sách cạnh sau:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	4
1	5
2	1
2	5
3	4
3	5
4	1
4	2
4	3
5	1
5	4

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E bắt đầu tại đỉnh có bậc ra lớn hơn bậc vào. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{5, 1, 4, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 1\}$.
- B. $\{4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 5, 4, 1, 5\}$.
- C. $\{4, 4, 5, 5, 1, 4, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2\}$.
- D. $\{3, 4, 1, 2, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 4, 3, 5\}$.
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{3, 4, 1, 2, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 4, 3, 5\}$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 85. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

Đỉnh	Danh sách kề
1	3, 5
2	3, 4
3	1, 4
4	1, 5
5	2, 3

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E bắt đầu tại đỉnh có bậc ra lớn hơn bậc vào. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{4, 5, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 4, 5, 3\}$.
- B. $\{3, 2, 4, 4, 5, 5, 3, 1, 2, 1, 3\}$.
- C. $\{2, 3, 1, 3, 4, 1, 5, 2, 4, 5, 3\}$.
- D. $\{3, 1, 3, 4, 2, 5, 3, 2, 5, 1, 4\}$.
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: $\{2, 3, 1, 3, 4, 1, 5, 2, 4, 5, 3\}$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 86. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Dfs(s){ VS[s] = 1; For v ∈ Ke(s) if (VS[v] = 0) { T = T ∪ {(s, v)}; Dfs(v); } } </pre>	<pre> Tree_Dfs(s){ For v ∈ V VS[v] = 0; T = ∅; Dfs(s); For v ∈ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
--	---

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T không chứa chu trình.
- B. T là cây khung của G vì T liên thông, có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- D. T là cây khung của G vì T có n cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 87. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Bfs(s){ Queue = ∅; Queue ← s; VS[s] = 1; While (Queue ≠ ∅) { u ← Queue; For v ∈ Ke(u) if (VS[v] = 0) { Queue ← v; VS[v] = 1; T = T ∪ {(u, v)}; } } } </pre>	<pre> Tree_Bfs(s){ For v ∈ V VS[v] = 0; T = ∅; Bfs(s); For v ∈ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
---	---

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T chứa ít cạnh nhất của G .
- B. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- D. T là cây khung của G vì T có $n - 1$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 88. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	3	7	3	4	8
1	4	5	2	4	8
1	2	6	1	3	3

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = \{(1,3), (1,4), (2,4)\}$ với $WT = 16$.
 B. $T = \{(1,3), (2,3), (1,2)\}$ với $WT = 16$.
 C. $T = \{(2,3), (1,4), (1,2)\}$ với $WT = 18$.
 D. $T = \{(1,3), (1,4), (1,2)\}$ với $WT = 14$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 89. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2	3	1
4	5	2	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T không liên thông.
 B. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
 C. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải cạnh cầu.
 D. T không phải là cây vì có cạnh $(2,3)$ không phải cạnh cầu.
 E. Các phương án khác đều đúng.

Lời giải.

Chọn đáp án **E**

□

Câu 90. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	0	0
1	1	0	0

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = \{(1,3), (2,4), (1,2)\}$.
 B. $T = \{(1,3), (1,2), (2,4)\}$.

- C. $T = \{(2,4), (1,3), (1,2)\}$.
 D. $T = \{(1,2), (2,4), (1,3)\}$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 91. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị liên thông và có số cạnh $m = n$.
 B. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bán bậc ra là lẻ.
 C. T là đồ thị vô hướng liên thông và có $m = n-1$ cạnh.
 D. T là đồ thị vô hướng liên thông yếu và tất cả các đỉnh đều có bán bậc vào là chẵn.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 92. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	9	3	5
9	0	-2	5
3	-2	0	8
5	5	8	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = \{(2,3), (1,3), (2,4)\}$ và $WT = 6$.
 B. $T = \{(2,3), (1,4), (1,2)\}$ và $WT = 12$.
 C. $T = \{(2,3), (1,3), (1,4)\}$ và $WT = 6$.
 D. $T = \{(2,3), (1,4), (3,4)\}$ và $WT = 11$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 93. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
5	2	2	1
5	4	1	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
 B. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
 C. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
 D. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 94. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	3	9	1	4	3
1	3	3	2	4	10
3	4	8	1	2	5

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

A. $T = \{(2,4), (2,3), (1,2)\}$ với $WT = 24$.

B. $T = \{(2,4), (2,3), (1,3)\}$ với $WT = 22$.

C. $T = \{(2,4), (1,3), (1,2)\}$ với $WT = 18$.

D. $T = \{(2,4), (2,3), (1,4)\}$ với $WT = 22$.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 95. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 5\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 4\}$	$\text{Ke}(3) = \{5\}$	$\text{Ke}(4) = \{2\}$	$\text{Ke}(5) = \{1, 3\}$
---------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

A. $T = \{(3,1), (1,2), (1,4), (1,5)\}$.

B. $T = \{(3,5), (5,1), (1,2), (2,4)\}$.

C. $T = \{(3,1), (3,5), (5,2), (5,4)\}$.

D. $T = \{(3,1), (1,2), (2,4), (4,5)\}$.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 96. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{3\}$	$\text{Ke}(2) = \{3, 4\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 2, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{2\}$	$\text{Ke}(5) = \{3\}$
------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.

B. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.

C. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.

D. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **C**

□

Câu 97. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1
0	0	1	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
- B. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
- C. T không phải là cây vì có cạnh (1,2) không phải là cạnh cầu.
- D. T là cây vì T liên thông.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **C**

□

Câu 98. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{2, 3, 4, 5\}$	$\text{Ke}(2) = \{1, 5\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{1\}$	$\text{Ke}(5) = \{1, 2, 3\}$
---------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------------

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = \{(3,1), (3,5), (1,2), (1,4)\}$.
- B. $T = \{(3,1), (1,2), (1,4), (1,5)\}$.
- C. $T = \{(3,1), (1,2), (2,4), (4,5)\}$.
- D. $T = \{(3,1), (3,5), (5,2), (5,4)\}$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **A**

□

Câu 99. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T và WT của G như sau:

(1) (2) $T = \emptyset$; $WT = 0$; $k = 0$; (3) For $(e_i \in E)$ { if $(T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) { $T = T \cup \{e_i\}$; $WT = WT + \text{trọng số của } e_i$; }	$k++$; if $(k = n - 1)$ Return $(T \text{ và } WT)$; } (4) Return(< G không có cây khung>);
---	---

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 100. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	3	8	5
3	0	4	4
8	4	0	3
5	4	3	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(1,3), (3,2), (1,4)\}$ và $WT = 17$.
- B. $T = \{(1,3), (3,2), (1,4)\}$ và $WT = 17$.
- C. $T = \{(4,1), (3,2), (3,4)\}$ và $WT = 12$.
- D. $T = \{(4,1), (1,3), (3,2)\}$ và $WT = 17$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 101. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	6	4	5
6	0	1	2
4	1	0	9
5	2	9	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = \{(2,3), (1,3), (1,4)\}$ và $WT = 10$.
- B. $T = \{(2,3), (2,4), (1,4)\}$ và $WT = 8$.
- C. $T = \{(2,3), (2,4), (1,3)\}$ và $WT = 7$.
- D. $T = \{(2,3), (2,4), (1,4)\}$ và $WT = 8$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 102. Cho đơn đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. G có cây khung khi và chỉ khi G không chứa chu trình.

- B. G có cây khung khi và chỉ khi G tất cả m cạnh đều là các cạnh cầu.
 C. G có cây khung khi và chỉ khi G là đồ thị liên thông.
 D. G có cây khung khi và chỉ khi G có $m = n-1$ cạnh.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 103. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
2	4	2	5
3	4	3	5

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = \{(3,1), (3,2), (3,5), (2,4)\}$.
 B. $T = \{(3,1), (1,2), (2,4), (2,5)\}$.
 C. $T = \{(3,2), (2,1), (2,4), (2,5)\}$.
 D. $T = \{(3,1), (1,2), (2,4), (3,5)\}$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 104. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = \{(2,4), (1,3), (2,1)\}$.
 B. $T = \{(1,3), (2,1), (2,4)\}$.
 C. $T = \{(2,1), (2,4), (1,3)\}$.
 D. $T = \{(2,1), (1,3), (2,4)\}$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 105. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bán bậc vào là chẵn.

- B. T không chứa chu trình và nếu bổ sung thêm 1 cạnh mới vào T sẽ nhận được đúng 1 chu trình.
- C. Hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi không quá 1 đường đi đơn.
- D. T là đồ thị không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc ra là lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 106. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{3\}$	$\text{Ke}(2) = \{3\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 2, 4\}$	$\text{Ke}(4) = \{3, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{4\}$
------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có cạnh $(1, 4)$ là cạnh cầu.
- B. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
- C. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- D. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 107. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT của G như sau:

(1) (2) $T = \emptyset$; $WT = 0$; $k = 0$; (3) For $(e_i \in E)$ { if $(T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) { $T = T \cup \{e_i\}$; $WT = WT + \text{trọng số của } e_i$; }	$k++$; if $(k = n - 1)$ Return $(T \text{ và } WT)$; } } (4) Return(< G không có cây khung>);
---	--

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 108. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	6	1	1
6	0	4	6
1	4	0	6
1	6	6	0

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(2,4), (1,2), (2,3)\}$ và $WT = 16$.
- B. $T = \{(3,4), (1,2), (2,3)\}$ và $WT = 16$.
- C. $T = \{(3,4), (2,4), (1,3)\}$ và $WT = 13$.
- D. $T = \{(3,4), (2,4), (1,2)\}$ và $WT = 18$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 109. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
3	1	1	2
4	5	2	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải cạnh cầu.
- B. T không phải là cây vì có cạnh $(2,3)$ không phải cạnh cầu.
- C. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- D. T không phải là cây vì T không liên thông.
- E. Các phương án khác đều đúng.

Lời giải.

Chọn đáp án **E**

□

Câu 110. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Điều kiện cần và đủ để G có cây khung nhỏ nhất là:

- A. G chỉ chứa các trọng số không âm.
- B. G là đồ thị liên thông.
- C. G không chứa chu trình âm.
- D. G chỉ chứa không quá 2 đỉnh bậc lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 111. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	5	1	4	4
3	4	7	2	3	6
1	2	4	2	4	4

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(1,4),(3,4),(3,2)\}$ với $WT = 17$.
 B. $T = \{(1,3),(3,4),(3,2)\}$ với $WT = 18$.
 C. $T = \{(1,3),(3,4),(1,2)\}$ với $WT = 16$.
 D. $T = \{(1,2),(3,4),(3,2)\}$ với $WT = 17$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 112. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	4	1	2	6
3	4	-7	2	4	10
1	3	7	2	3	8

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(1,3),(4,1),(1,2)\}$ với $WT = 17$.
 B. $T = \{(4,3),(4,1),(2,4)\}$ với $WT = 7$.
 C. $T = \{(4,3),(4,1),(1,2)\}$ với $WT = 3$.
 D. Không sử dụng được thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 113. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
 B. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
 C. T là cây vì T liên thông.
 D. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải là cạnh cầu.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 114. Sắp xếp theo thứ tự để thu được đoạn giả mã của thuật toán DFS:

Begin 1. if (chuaxet[v]) then 2. for each $v \in ke(u)$ do 3. EndFor; 4. chuaxet[u] := FALSE;	5. $\langle$ Thăm đỉnh u $\rangle$; // Duyệt đỉnh u 6. DFS(v); 7. EndIf; End.
--	--

- A. $7 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 6$.
B. $2 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$.
C. $5 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 3$.
D. $3 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$.
E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 115. Đoạn giả mã của thuật toán Depth First Search được mô tả dưới đây.

Begin 1. $\langle$ Thăm đỉnh u $\rangle$; // Duyệt đỉnh u 2. chuaxet[u] := TRUE; 3. for each $v \in ke(u)$ do 4. if (chuaxet[u]) then	5. DFS(v); 6. EndFor; 7. EndIf; End.
---	--

Cần sửa lại dòng mã nào để thu được giả mã chính xác?

- A. 2, 3, 4, 5. B. 2, 4, 6, 7. C. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
D. 6, 7. E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 116. Trường hợp đồ thị được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh có n đỉnh m cạnh,, độ phức tạp của thuật toán Depth First Search có giá trị là bao nhiêu?

- A. $O(n.m)$. B. $O(\max(n, m))$. C. $O(n^2)$.
D. $O(n^2m)$. E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 117. Sắp xếp theo thứ tự để thu được đoạn giả mã của thuật toán BFS:

Begin (Khởi tạo) Queue = $\emptyset$; Push(Queue, u); chuaxet[u] = FALSE; (Lặp) 1. if (chuaxet[t]) then 2. Push(Queue, t); chuaxet[t] := FALSE; 3. s = Pop(Queue);	4. for each $t \in Ke(s)$ do 5. EndIf; 6. while (Queue $\neq \emptyset$) do 7. EndFor; 8. EndWhile; (Trả kết quả) Return($\langle$ Tập đỉnh được duyệt $\rangle$); End.
--	--

- A. $5 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 4$.
B. $6 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8$.
C. $2 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 8$.
D. $8 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 6$.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 118. Đoạn giả mã của thuật toán Breadth First Search được mô tả dưới đây.

Begin (Khởi tạo): 1. Queue = $\emptyset$; 2. Push(Queue, u); 3. chuaxet[u] = True; (Lặp): 4. while (Queue = $\emptyset$) do 5. s = Pop(Queue); 6. for each t $\in$ Ke(s) do	7. if (chuaxet[s]) then 8. Push(Queue, t); chuaxet[t] := True; EndIf; EndIf; EndFor; EndWhile; (Trả kết quả): Return(<Tập đỉnh được duyệt>);
---	---

Cần sửa lại dòng mã nào để thu được giả mã chính xác?

A. 2, 3, 6, 7.

B. 1, 4, 5, 6.

C. 1, 3, 5, 7.

D. 3, 7.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 119. Trường hợp đồ thị được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh có n đỉnh m cạnh, độ phức tạp của thuật toán Breadth First Search có giá trị là bao nhiêu?

A. $O(n.m)$.

B. $O(\max(n, m))$.

C. $O(n^2)$.

D. $O(n^2m)$.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 120. Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 4 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh; như bên dưới. Đầu là thứ tự duyệt các đỉnh của thuật toán DFS ?

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	3
2	4
3	4

A. {4, 1, 2, 3}.

B. {4, 3, 2, 1}.

C. {3, 1, 4, 2}.

D. {1, 3, 4, 2}.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 121. Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh biểu diễn dưới dạng danh sách kề như bên dưới. Sử dụng thuật toán BFS để tìm kiếm đường đi từ đỉnh 4 đến đỉnh 5?

Ke(1) = {2, 4}
Ke(2) = {1, 3, 5}
Ke(3) = {2, 4, 5}
Ke(4) = {1, 3}
Ke(5) = {2, 3}

A. {4, 1, 3, 2, 5}.

B. {4, 3, 2, 5}.

C. {4, 2, 5}.

D. {4, 3, 5}.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **D**

□

Câu 122. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 8 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh; như dưới. Số thành phần liên thông của đồ thị là bao nhiêu?

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	5
1	7
2	3
2	5
2	6
2	7
2	8
3	4
3	5
3	6
3	7
4	5
4	7
4	8
5	6
5	7
6	7
6	8

A. 1.

B. 6.

C. 7.

D. 2.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **A**

□

Câu 123. Sắp xếp theo thứ tự để thu được đoạn giả mã mô tả thuật toán duyệt các cạnh cầu của đồ thị:

Duyệt_Cau $G = \langle V, E \rangle$ ReInt(); // $\forall u \in V$ chuaxet[u] = TRUE; for each $e \in E$ do: 1.if (BFS(1) $\neq V$) then	2.<e là cầu>; 3.ReInt() 4. $E = E \setminus \{e\}$; 5.endif; 8. $E = E \cup \{e\}$; endfor
---	---

A. $3 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 4$.B. $1 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$.C. $4 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3$.D. $3 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4$.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **C**

□

Câu 124. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 7 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh; như dưới. Cạnh nào dưới đây là cạnh cầu?

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	3
1	4
1	6
2	4
2	6
2	7
3	4
3	6
3	7
4	5
4	7
6	7

A. Cạnh (3, 4).

B. Cạnh (6, 7).

C. Cạnh (2, 7).

D. Cạnh (4, 5).

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 125. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh; như dưới. Đồ thị có bao nhiêu cạnh cầu?

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	4
2	3
2	4
3	4
4	5

A. 1.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 126. Sắp xếp theo thứ tự để thu được đoạn giả mã mô tả thuật toán duyệt các đỉnh trụ của đồ thị:

```

Duyệt_Trụ  $G = \langle V, E \rangle$ 
    ReInt(); //  $\forall u \in V$ : chuaxet[u] = True;
    for each  $v \in V$  do:
        1. if (BFS(u)  $\neq V \setminus \{v\}$ ) then // Duyệt đỉnh  $u \neq v$ ;
        2. chuaxet[v] = False;
        3. <v là trụ>;
        4. ReInt()
        5. endif;
    endfor

```

- A. $2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 3$. B. $4 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. C. $4 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 2$.
 D. $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4$. E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 127. Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình dưới. Đỉnh nào dưới đây là đỉnh trụ của đồ thị?

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. Đỉnh 4. B. Đỉnh 5. C. Đỉnh 3.
 D. Đỉnh 1. E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 128. Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình dưới. Đồ thị này có bao nhiêu đỉnh trụ?

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. 4. B. 3. C. 7.
 D. 1. E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 129. Cho đơn đồ thị $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh; như dưới

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	4
2	3
3	4

Đồ thị có thể chia làm mấy thành phần liên thông mạnh?

- A. 5. B. 2. C. 4.
 D. 1. E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 130. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ và hai đỉnh s, t thuộc G . Độ dài đường đi từ s đến t trên đồ thị G là:

- A. Tổng các trọng số của các cạnh nằm trên đường đi từ s đến t .
- B. Tích các trọng số của các cạnh nằm trên đường đi từ s đến t .
- C. Số lượng các đỉnh nằm trên đường đi từ s đến t .
- D. Tổng trọng số của các đỉnh kết nối trực tiếp với s và t .
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 131. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ và hai đỉnh s, t thuộc G . Đường đi ngắn nhất từ s đến t trên đồ thị G là:

- A. Đường đi từ s đến t có tất cả các cạnh có trọng số bằng nhau.
- B. Trọng số nhỏ nhất trong các trọng số của các cạnh nằm trên đường đi từ s đến t .
- C. Đường đi với tổng trọng số của các cạnh trên đường đi từ s đến t có giá trị nhỏ nhất.
- D. Đường đi từ s đến t có số lượng cạnh và đỉnh tối đa.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 132. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ và hai đỉnh s, t thuộc G . Thuật toán Dijkstra được sử dụng tìm đường đi ngắn nhất từ s đến t trong trường hợp:

- A. G chỉ chứa các trọng số không âm.
- B. G chứa các trọng số cả âm và dương.
- C. G là đồ thị liên thông.
- D. G là đồ thị có hướng.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 133. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và hai đỉnh s, t thuộc G . Sử dụng thuật toán Bellman-Ford tìm đường đi ngắn nhất từ s đến t trong trường hợp:

- A. G là đồ thị liên thông mạnh.
- B. G là đồ thị có hướng không chứa chu trình âm.
- C. G là đồ thị có hướng.
- D. G có chu trình dương.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 134. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Sử dụng thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của G trong trường hợp:

- A. G là đồ thị có hướng, không chứa chu trình âm.
- B. G là đồ thị có hướng.

- C. G là đồ thị liên thông yếu.
- D. G là đồ thị vô hướng.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 135. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Cần tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của G . Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Nên sử dụng thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh trên đồ thị trong trường hợp G do thuật toán này phù hợp nhất.
- B. Nên sử dụng thuật toán A^* (A-star) thay vì Bellman-Ford hay Dijkstra vì A^* có thể tìm được đường đi ngắn nhất hiệu quả hơn trên đồ thị có trọng số dương và giúp tối ưu thời gian tính toán.
- C. Nên sử dụng thuật toán Bellman-Ford cho từng cặp đỉnh vì thuật toán này có thể phát hiện chu trình âm, nhưng lại không phù hợp với đồ thị có trọng số dương do độ phức tạp tính toán cao hơn so với Dijkstra.
- D. Nên sử dụng thuật toán Prim để tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh trong đồ thị vì thuật toán này hiệu quả cho đồ thị có trọng số âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 136. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Sau khi thực hiện thuật toán, Floyd, G chứa chu trình âm nếu

- A. Có hai đỉnh u và v sao cho độ dài đường đi ngắn nhất từ u đến v có giá trị âm.
- B. Có đỉnh u sao cho độ dài đường đi ngắn nhất từ u đến chính nó có giá trị âm.
- C. Mọi cặp đỉnh u, v của G đều có độ dài đường đi ngắn nhất từ u đến v với giá trị âm.
- D. Có hai đỉnh u và v sao cho đường đi ngắn nhất từ u đến v có $n-1$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 137. A. Thuật toán DFS. B. Thuật toán Dijkstra. C. Thuật toán Floyd.
D. Thuật toán A^* (A-star). E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 138. Thuật toán nào không phải là thuật toán được áp dụng để giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị?

- A. Dijkstra. B. DFS. C. Bellman-Ford.
- D. Floyd. E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 139. Trong các mô tả dưới đây, mô tả nào là sai?

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh xuất phát (đỉnh s) đến đỉnh cuối (đỉnh t) trên đồ thị

BƯỚC KHỞI TẠO: s là đỉnh xuất phát
 for $v \in V$ do {
 $d[v] = A[s, v];$
 }
BƯỚC LẶP:
 While($V \neq \emptyset$) {
 <Chọn u là đỉnh có $d[u]$ nhỏ nhất>;
 < Cố định nhãn của đỉnh u >; $V = V \setminus \{u\};$
 for $v \in V$ do {
 if ($d[v] > d[u] + A[u, v]$) {
 $d[v] = d[u] + A[u, v];$
 $truo[c[v]] = u;$
 }
 }
 }
BƯỚC TRẢ LẠI KẾT QUẢ: Return($d(s, t)$);

1. Với s cố định và t thay đổi, đối với đồ thị có trọng số âm, bài toán không thể giải quyết bằng thuật toán Dijkstra
2. Với s cố định và t thay đổi, đối với đồ thị có chu trình âm, bài toán không thể giải quyết bằng thuật toán Bellman-Ford
3. Với s cố định và t thay đổi, đối với đồ thị có chu trình âm, bài toán luôn có lời giải
4. Với s thay đổi và t thay đổi, đối với đồ thị có chu trình âm, bài toán giải được bằng thuật toán Floyd
5. Với s thay đổi và t thay đổi, bài toán được phát biểu dưới dạng tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị

A. 1, 3, 4.

B. 2, 4, 5.

C. 2, 3, 4.

D. 3, 4, 5.

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **D**

□

Câu 140. Xét một cách mô tả thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đơn đồ thị có trọng số G biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[] []$:

- (1) Khởi tạo:
 - (1.1) for $v \in G$ do {
 - (1.2) $d[v] = a[s][v]; \quad e[v] = s; \quad vs[v] = 0; \}$
- (2) Bắt đầu tìm kiếm từ s : $d[s] = 0; e[s] = 0; vs[s] = 1;$
- (3) Tìm đỉnh u sao cho $d[u] = \min\{d[v] \mid vs[v] = 0\}$:
 - (3.1) Nếu không tìm được u thì chuyển bước (7);
 - (3.2) Nếu tìm được u thì chuyển bước (5).
- (4) Cập nhật $vs[u] = 1;$
- (5) for $v \in G$ do
 - (5.1) if $(vs[v] = 0) \& (d[v] > d[u] + a[u][v])$ {
 - (5.2) $e[v] = u; \quad d[v] = d[u] + a[u][v]; \}$
- (6) Quay lại (3);
- (7) Đưa ra $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G, v \neq s$.

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Bước (7) bị sai. B. Bước (3.2) bị sai. C. Bước (6) bị sai.
 D. Bước (5.2) bị sai. E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 141. Cần bổ sung nội dung thực hiện của bước (5) trong mô tả thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đơn đồ thị có trọng số G biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[]$ với các trọng số không âm:

(1) Khởi tạo:

(1.1) **for** $v \in G$ **do** {

(1.2) $d[v] = a[s][v]; \quad e[v] = s; \quad vs[v] = 0; \}$

(2) Bắt đầu tìm kiếm từ s : $d[s] = 0; e[s] = 0; vs[s] = 1;$

(3) Tìm đỉnh u sao cho $d[u] = \min\{d[v] \mid vs[v] = 0\}$:

(3.1) Nếu không tìm được u thì chuyển bước (7);

(3.2) Nếu tìm được u thì chuyển bước (4).

(4) Cập nhật $vs[u] = 1;$

(5) **for** $v \in G$ **do**

—

(6) Quay lại (3);

(7) Đưa ra $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G, v \neq s$.

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. **if** $(vs[v] = 0) \& (d[v] < d[u] + a[u][v])$ {
 $e[v] = u; \quad d[v] = d[u] + a[u][v]; \}$.

B. **if** $(vs[v] = 0) \& (d[v] > d[u] + a[u][v])$ {
 $e[v] = u; \quad d[v] = d[u] + a[u][v]; \}$.

C. **if** $(vs[v] = 0) \& (d[u] > d[v] + a[u][v])$ {
 $e[v] = u; \quad d[u] = d[v] + a[u][v]; \}$.

D. **if** $(vs[v] = 0) \& (d[v] > d[u] - a[u][v])$ {
 $e[v] = u; \quad d[v] = d[u] + a[u][v]; \}$.

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 142. Mô tả thuật toán Bellman-Ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đồ thị có trọng số G (biểu diễn bằng ma trận trọng số $a[] []$):

(1) Khởi tạo:

(1.1) **for** $v \in G$ **do** {

(1.2) $d[u] = a[s][v]; \ e[u] = s; \ }$

(2) Bắt đầu tìm kiếm từ s :

(2.1) $d[s] = 0; \ e[s] = 0;$

(2.2) $ok = 0;$

(3) Thực hiện $n - 1$ lần lặp:

(3.1) $ok = 1;$

(3.2) **for** $v \in G$ **do**

(3.3) **for** $u \in G$ **do**

(3.4) **if** $(d[v] > d[u] + a[u][v]) \ \{$

$\quad e[v] = u;$

$\quad d[v] = d[u] + a[u][v];$

$\quad ok = 0; \ }$

(4) Nếu $(ok = 1)$ thì đưa $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G, v \neq s$;

(5) Nếu $(ok = 0)$ thì đưa ra thông báo G chứa chu trình âm.

A. Bước (3.1) bị sai.

B. Bước (5) bị sai.

C. Bước (4) bị sai.

D. Bước (1.2) bị sai.

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 143. Cần bổ sung nội dung thực hiện của bước 1) trong mô tả thuật toán Bellman-Ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đơn đồ thị có trọng số G gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[] []$:

(1) Khởi tạo:

—

(2) Bắt đầu tìm kiếm từ s :

(2.1) $d[s] = 0$; $e[s] = 0$;

(2.2) $ok = 0$;

(3) Thực hiện $n - 1$ lần lặp:

(3.1) $ok = 1$;

(3.2) for $v \in G$ do

(3.3) for $u \in G$ do

(3.4) if $(d[v] > d[u] + a[u][v])$ {

$e[v] = u$;

$d[v] = d[u] + a[u][v]$;

$ok = 0$; }

(4) Nếu $(ok = 1)$ thì đưa $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G, v \neq s$;

(5) Nếu $(ok = 0)$ thì đưa ra thông báo G chứa chu trình âm.

A. for $v \in G$ do {
 $d[v] = a[s][u]$; $e[v] = s$; }

B. for $v \in G$ do {
 $d[s] = a[s][v]$; $e[s] = v$; }

C. for $v \in G$ do {
 $d[u] = a[s][v]$; $e[u] = s$; }

D. for $v \in G$ do {
 $d[v] = a[s][v]$; $e[v] = s$; }

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 144. Xét một cách mô tả thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của đơn đồ thị có trọng số G gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[][]$:

(1) Khởi tạo:

$$(1.1) \quad d[i][j] = a[i][j];$$

$$(1.2) \quad e[i][j] = i;$$

(2) Thực hiện 3 vòng lặp lồng nhau:

(2.1) for $k \in G$ do

(2.2) for $i \in G$ do

(2.3) for $j \in G$ do

(2.4) if $(d[i][j] > d[i][k] + d[k][j])$ {
 $e[i][j] = k; d[i][j] = d[i][k] + d[k][j];$
 }

(3) Xuất kết quả:

(3.1) Nếu có đỉnh u mà $d[u][u] > 0$ thì xuất thông báo G chứa chu trình dương;

(3.2) Ngược lại xuất $d[i][j]$ và $e[i][j]$.

A. Bước (1.1) bị sai.

B. Bước (3.1) bị sai.

C. Bước (2.4) bị sai.

D. Bước (3.2) bị sai.

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 145. Cần bổ sung nội dung thực hiện của bước (3) trong mô tả thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của đơn đồ thị có trọng số G biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[][]$:

(1) Khởi tạo:

$$(1.1) \quad d[i][j] = a[i][j];$$

$$(1.2) \quad e[i][j] = i;$$

(2) Thực hiện 3 vòng lặp lồng nhau:

(2.1) for $k \in G$ do

$$(2.2) \quad \text{for } i \in G \text{ do}$$
$$(2.3) \quad \text{for } j \in G \text{ do}$$
$$(2.4) \quad \text{if } (d[i][j] > d[i][k] + d[k][j]) \{ \\ e[i][j] = k; d[i][j] = d[i][k] + d[k][j]; \\ \}$$

(3) Xuất kết quả:

●

- A.** Nếu có định u mà $d[u][u] < 0$ thì xuất thông báo G chứa chu trình âm;
Ngược lại xuất ra thông báo G không chứa chu trình âm. .
- B.** Nếu có định u mà $d[u][u] < 0$ in ra thông báo đã tìm được đường đi;
Ngược lại xuất $d[i][j]$ và $e[i][j]$. .
- C.** Nếu có định u mà $d[u][u] < 0$ thì xuất thông báo G chứa chu trình âm;
Ngược lại xuất $d[i][j]$ và $e[i][j]$. .
- D.** Nếu có định u mà $d[u][u] < 0$ thì xuất thông báo G chứa chu trình âm;
Ngược lại xuất $d[j][i]$ và $e[i][j]$. .
- E.** Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

☐

Câu 146. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
4	1	6	2	1	6
2	3	2	4	2	4
1	4	8	1	3	3

Sử dụng thuật toán dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 3$ đến các đỉnh còn lại của G . Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 3 đến đỉnh 2 là : $3 \rightarrow 2$ với độ dài $d[2] = 11$.
- B. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 3 đến đỉnh 2 là : $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ với độ dài $d[2] = 4$.
- C. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 3 đến đỉnh 2 là : $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ với độ dài $d[2] = 11$.

D. Không có đường đi giữa 3 và 2.

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 147. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	6	4	3	6
3	1	2	3	2	-2
1	4	8	3	4	4

Sử dụng thuật toán bellman-ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 4$ đến các đỉnh còn lại của G . Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 4 đến đỉnh 3 là : $4 \rightarrow 3$ với độ dài $d[3] = 1$.

B. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 4 đến đỉnh 1 là : $4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ với độ dài $d[1] = 14$.

C. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 4 đến đỉnh 1 là : $4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ với độ dài $d[1] = 8$.

D. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 4 đến đỉnh 1 là : $4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ với độ dài $d[1] = 4$.

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 148. Cho đơn đồ thị có trọng số G gồm 4 đỉnh với các trọng số không âm. Kí hiệu $d[i][j]$ là độ dài đường đi ngắn nhất từ i đến j và $e[i][j]$ là đỉnh trước j trên đường đi ngắn nhất từ i đến j . Sử dụng thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của G nhận được kết quả sau:

$d[3][2] = 3$	$d[2][4] = 2$	$d[3][4] = 5$	$d[4][2] = 4$
$e[3][2] = 1$	$e[3][2] = 3$	$e[3][2] = 1$	$e[3][2] = 1$

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 4 là : $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ với độ dài $d[2][4] = 8$.

B. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 3 đến đỉnh 2 là : $3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ với độ dài $d[3][2] = 13$.

C. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 4 đến đỉnh 1 là : $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ với độ dài $d[4][1] = 5$.

D. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 4 đến đỉnh 3 là : $4 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ với độ dài $d[4][3] = 4$.

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 149. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận

trọng số:

0	6	6	4
6	0	3	6
6	3	0	7
4	6	7	0

Sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 4$ đến các đỉnh còn lại của G . Đỉnh t có đường đi ngắn nhất từ s đến t có giá trị lớn nhất là:

A. $t = 2$.

B. $t = 4$.

C. $t = 3$.

D. $t = 1$.

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 150. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	3	7	6
3	0	8	∞
7	8	0	3
6	∞	3	0

Sử dụng thuật toán Bellman-ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 3$ đến các đỉnh còn lại của G . Đỉnh t có đường đi ngắn nhất từ s đến t có giá trị lớn nhất là:

A. $t = 1$.

B. $t = 2$.

C. $t = 3$.

D. $t = 4$.

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 151. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số $G = \langle V, E \rangle$ với các trọng số không âm. G không là mạng nếu:

A. G có duy nhất một đỉnh không có cạnh đi vào.

B. G có duy nhất một đỉnh không có cạnh đi ra.

C. G có ít nhất một đỉnh không có cạnh đi ra.

D. G có một đỉnh không có cạnh đi vào và một đỉnh không có cạnh đi ra.

E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: E. Tất cả phương án đều sai

Chọn đáp án **E**

□

Câu 152. Cho mạng $G = (V, E)$ với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Xét hàm thực $f(u, v) : E \rightarrow \mathbb{R}$ có một số tính chất sau:

(1) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) \leq c(u, v)$.

(2) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) > 0$.

(3) Với mọi đỉnh $v \in V$ khác s và t , tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh cuối là v bằng tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh đầu là v .

(4) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) < c(u, v)$.

(5) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) \geq 0$.

Hàm $f(u, v)$ là một luồng trên G khi và chỉ khi thỏa mãn các điều kiện:

A. (3),(4) và (5).

B. (1),(3) và (5).

C. (1),(4) và (5).

D. (1),(3) và (4).

E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: B. (1),(3) và (5)

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 153. Cho luồng f trên mạng G với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Giá trị của luồng f bằng:

A. Tổng giá trị luồng trên các cung trên đường đi ít cung nhất từ s đến t .

B. Tổng giá trị luồng trên các cung đi vào t .

C. Tổng giá trị khả năng thông qua các cung của G .

D. Tổng giá trị luồng trên các cung của G .

E. Các phương án khác đều sai..

Lời giải.

Đáp án đúng: B. Tổng giá trị luồng trên các cung đi vào t

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 154. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số $G = (V, E)$ có 6 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	0	8	1	7	10
0	0	7	2	8	0
0	0	0	0	0	0
0	4	4	0	0	5
0	4	9	9	0	3
0	1	0	2	9	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. G là một mạng với đỉnh phát $s = 1$ và đỉnh thu $t = 3$.

B. G là một mạng với đỉnh phát $s = 3$ và đỉnh thu $t = 5$.

C. G là một mạng với đỉnh phát $s = 5$ và đỉnh thu $t = 2$.

D. G không phải là một mạng.

E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: A. G là một mạng với đỉnh phát $s = 1$ và đỉnh thu $t = 3$

Chọn đáp án **(A)**

□

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	1	4	5	8
1	5	4	5	3	2
2	5	2	5	4	6
2	3	8	6	4	9
4	3	1	6	1	5

Câu 155. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. G là một mạng với đỉnh thu $s = 4$ và đỉnh phát $t = 6$.
- B. G là một mạng với đỉnh thu $s = 3$ và đỉnh phát $t = 6$.
- C. G là một mạng với đỉnh thu $s = 1$ và đỉnh phát $t = 4$.
- D. G là một mạng với đỉnh thu $s = 3$ và đỉnh phát $t = 1$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: B. G là một mạng với đỉnh thu $s = 3$ và đỉnh phát $t = 6$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 156. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	9	4	6	7
1	6	8	5	6	8
2	1	3	5	3	7
2	6	5	6	1	4
4	2	2	6	3	1

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. G là một mạng với đỉnh thu $s = 3$ và đỉnh phát $t = 5$.
- B. G là một mạng với đỉnh thu $s = 2$ và đỉnh phát $t = 5$.
- C. G không phải là một mạng.
- D. G là một mạng với đỉnh thu $s = 4$ và đỉnh phát $t = 2$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: A. G là một mạng với đỉnh thu $s = 3$ và đỉnh phát $t = 5$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 157. Cho mạng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	7	7	0	0	0
0	0	0	9	11	0
0	0	0	6	6	0
0	0	0	0	0	7
0	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Luồng f trên G với $f(1,2) = 7, f(1,3) = 7, f(2,5) = 11, f(3,4) = 6, f(4,6) = 7, f(5,6) = 6$.
- B. Luồng f trên G với $f(1,2) = 11, f(1,3) = 11, f(2,5) = 11, f(3,4) = 11, f(4,6) = 11, f(5,6) = 11$.
- C. Luồng f trên G với $f(1,2) = 7, f(1,3) = 7, f(2,5) = 7, f(3,4) = 6, f(4,6) = 7, f(5,6) = 6$.
- D. Luồng f trên G với $f(1,2) = 6, f(1,3) = 6, f(2,5) = 6, f(3,4) = 6, f(4,6) = 6, f(5,6) = 6$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: D. Luồng f trên G với $f(1,2) = 6, f(1,3) = 6, f(2,5) = 6, f(3,4) = 6, f(4,6) = 6, f(5,6) = 6$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 158. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	3	2	4	10
1	3	10	2	6	6
1	4	9	3	5	7
1	5	4	4	5	9
2	3	6	5	6	8

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Luồng f trên G với $f(1,2) = 2, f(1,3) = 6, f(1,5) = 6, f(2,6) = 5, f(3,5) = 5, f(5,6) = 7$.
- B. Luồng f trên G với $f(1,2) = 6, f(1,3) = 5, f(1,5) = 3, f(2,6) = 6, f(3,5) = 5, f(5,6) = 8$.
- C. Luồng f trên G với $f(1,2) = 5, f(1,3) = 3, f(1,5) = 6, f(2,6) = 4, f(3,5) = 6, f(5,6) = 11$.
- D. Luồng f trên G với $f(1,2) = 5, f(1,3) = 3, f(1,5) = 5, f(2,6) = 4, f(3,5) = 3, f(5,6) = 11$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: E. Tất cả phương án đều sai

Chọn đáp án **(E)**

□

Câu 159. Luồng f trên mạng G với đỉnh phát s , đỉnh thu t là luồng cực đại khi và chỉ khi:

- A. Giá trị của luồng f bằng độ dài đường đi có ít cạnh nhất từ đỉnh s đến đỉnh t .
- B. Giá trị của luồng f bằng khả năng thông qua một lát cắt nào đó của G .
- C. Với mọi cung (u, v) của G đều có $f(u, v) = c(u, v)$.
- D. Tìm được đường tăng (u, v) của G sao cho $f(u, v) = c(u, v)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: B. Giá trị của luồng f bằng khả năng thông qua một lát cắt nào đó của G

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 160. Cho mạng $G = (V, E)$ với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Một lát cắt của G là:

- A. Cặp tập (X, X^*) , trong đó X là các đỉnh, $X^* = V \setminus X$ với $s \in X$ và $t \in X^*$.
- B. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = V$ và $X^* = \emptyset$.
- C. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = \{s, t\}$ và $X^* = V \setminus X$.
- D. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $s \notin X$ hoặc $t \notin X^*$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: A. Cặp tập (X, X^*) , trong đó X là các đỉnh, $X^* = V \setminus X$ với $s \in X$ và $t \in X^*$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 161. Cho mạng $G = (V, E)$ và lát cắt (X, X^*) . Khả năng thông qua của (X, X^*) là

- A. Tổng của các khả năng $c(v, u)$ với $v \in X^*$ và $u \in X$.
- B. Số lượng cạnh đi từ X^* sang X .
- C. Tổng của các khả năng thông qua $c(u, v)$ với $u \in X$ và $v \in X^*$.
- D. Tổng của các khả năng thông qua $c(u, t)$, với $u \in X$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: C. Tổng của các khả năng thông qua $c(u, v)$ với $u \in X$ và $v \in X^*$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 162. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Đồ thị tăng luồng $G_f = (V, E_f)$ được xác định như sau:

- (1) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = 0$, thì $(v, w) \in E_f$ với trọng số $c(v, w)$.
 - (2) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $c(v, w) - f(v, w)$.
 - (3) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(v, w) \in E_f$ với trọng số $c(v, w) - f(v, w)$.
 - (4) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $f(v, w)$.
 - (5) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = c(v, w)$, thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $c(v, w)$.
- Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:
- A. (2), (3), (4) và (5).
 - B. (1), (2), (3) và (4).
 - C. (1), (2), (3) và (5).
 - D. (1), (2), (4) và (5).
 - E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: E. Các phương án khác đều sai

Chọn đáp án **(E)**

□

Câu 163. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Cung thuận trong đồ thị tăng luồng $G_t = (V, E_t)$ là cung:

- A. (v, u) thuộc G_f nếu $c(u, v) = 0$.
- B. (u, v) đồng thời là cung của G và G_f .
- C. (u, v) là cung thuận nếu $f(u, v) > 0$.
- D. (s, v) đồng thời là cung của G và G_f .
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: B. (u, v) đồng thời là cung của G và G_f

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 164. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Cung nghịch trong đồ thị tăng luồng $G_t = (V, E_t)$ là cung:

- A. (u, v) là cung nghịch nếu $f(u, v) = c(u, v)$.
- B. (u, v) là cung nghịch nếu $c(u, v) = 0$.
- C. (u, v) nằm trên đường đi ngắn nhất từ s đến t trong G_f nhưng không thuộc G .
- D. (u, v) là cung của G_f nhưng không phải là cung của G .
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: D. (u, v) là cung của G_f nhưng không phải là cung của G

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 165. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Đường tăng luồng là:

- A. Đường đi từ s đến t trên G .
- B. Đường đi ngắn nhất từ s đến t trên G .
- C. Đường đi từ s đến t trên G_f .
- D. Đường đi ngắn nhất từ s đến t trên G_f .
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: C. Đường đi từ s đến t trên G_f

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 166. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Giá trị tăng luồng d là:

- A. Trọng số trung bình của các cung trên đường đi từ s đến t trong G_f .
- B. Giá trị nhỏ nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi từ s đến t trên G_f .
- C. Tổng các trọng số của các cung trên đường đi từ s đến t trong G_f .
- D. Giá trị nhỏ nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi ngắn nhất từ s đến t .
- E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: B. Giá trị nhỏ nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi từ s đến t trên G_f

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 167. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Xét đường tăng luồng P với giá trị tăng luồng d . Xét các thao tác tăng luồng f thành luồng f' như sau:

(1) Nếu $(u, v) \in P$ là cung thuận thì $f'(u, v) = f(u, v) - d$.

(2) Nếu $(u, v) \notin P$ thì $f'(u, v) = f(u, v)$.

(3) Nếu $(u, v) \in P$ là cung nghịch thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.

(4) Nếu $(u, v) \in P$ thì $f'(u, v) = f(u, v)$.

(5) Nếu $(u, v) \in P$ là cung thuận thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.

Các thao tác trên luồng đúng là:

- A. (1),(2) và (5). B. (3),(4) và (5). C. (2),(3) và (5).
D. (1),(3) và (5). E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: C. (2),(3) và (5)

Chọn đáp án **C**

□

Câu 168. Xét thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng $G = (V, E)$ sau đây:

Thuật toán *Max_Flow* {
 (1) for $u \in V$ do
 for $v \in V$ do $f(u, v) = 0$;
 (2) Stop = 0;
 (3) while (Stop = 0) do {
 (4) <Xác định đồ thị tăng luồng G_f >;
 (5) if (Tìm được đường tăng luồng P bằng Bfs(s)) {
 (6) }
 (7) } else Stop = 1;
 (8) Return ($f, val(f)$);
}

Các thao tác trong bước(6) là:

- A. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên G >; <Tăng luồng f theo G >;.
 B. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên P >; <Tăng luồng f theo G >;.
 C. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên G >; <Tăng luồng f theo P >;.
 D. <Tìm δ là trọng số lớn nhất trên P >; <Tăng luồng f theo P >;.
 E. Các phương án khác đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: E. Các phương án khác đều sai

Chọn đáp án **E**

□

Câu 169. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

0	0	10	0	0
0	0	10	0	2
0	0	0	3	8
0	0	0	0	2
0	0	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 4$.
 B. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{2, 3\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 7$.
 C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 3$.
 D. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 6$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 3$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 170. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	10	2	6	8
1	3	8	3	4	10
1	4	9	3	5	7
2	5	7	3	6	10

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{2, 3\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 3$.
 B. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{2, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 4$.
 C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{4, 6\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 0$.
 D. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 4\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 2$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{4, 6\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 0$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 171. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	0	0	7	0
0	0	5	9	4
0	0	0	9	0
0	0	0	0	10
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 10$.
 B. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 9$.
 C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 7$.
 D. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 8$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 7$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 172. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	10	2	3	8
1	3	10	3	5	5
1	4	2	4	5	10

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 8$.
- B. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 10$.
- C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 7$.
- D. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 11$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $\text{val}(f) = 7$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 173. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	0	8	0	0
0	0	8	2	6
0	0	0	0	2
0	0	0	0	9
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,3\} = 2$, $f\{3,5\} = 2$. Đồ thị tăng luồng G_f bao gồm các cạnh cùng trọng số tương ứng là:

- A. $c(1,3) = 6$, $c(2,3) = 8$, $c(2,4) = 2$, $c(2,5) = 6$, $c(3,1) = 2$, $c(4,5) = 9$, $c(5,3) = 2$.
- B. $c(1,3) = 7$, $c(3,1) = 2$, $c(3,2) = 8$, $c(3,5) = 2$, $c(4,2) = 2$, $c(4,5) = 9$, $c(5,2) = 6$, $c(5,3) = 2$.
- C. $c(1,3) = 6$, $c(2,5) = 6$, $c(3,1) = 5$, $c(3,2) = 8$, $c(4,2) = 2$, $c(4,5) = 9$, $c(5,3) = 3$.
- D. $c(1,3) = 6$, $c(2,4) = 2$, $c(2,5) = 6$, $c(3,1) = 2$, $c(3,2) = 8$, $c(5,3) = 5$, $c(5,4) = 9$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: A. $c(1,3) = 6$, $c(2,3) = 8$, $c(2,4) = 2$, $c(2,5) = 6$, $c(3,1) = 2$, $c(4,5) = 9$, $c(5,3) = 2$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 174. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,3\} = 6$, $f\{3,5\} = 6$. Đồ thị tăng luồng G_f bao gồm các cạnh cùng trọng số tương ứng là:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	7	2	3	9
1	3	6	3	5	7
1	4	9	4	5	7

- A. $c(1, 2) = 7, c(1, 4) = 9, c(2, 3) = 9, c(3, 1) = 6, c(3, 5) = 1, c(4, 5) = 7, c(5, 3) = 6$.
- B. $c(1, 2) = 7, c(1, 4) = 9, c(2, 3) = 9, c(3, 1) = 9, c(3, 5) = 3, c(5, 3) = 9, c(5, 4) = 7$.
- C. $c(1, 3) = 3, c(2, 1) = 7, c(2, 3) = 9, c(3, 1) = 9, c(3, 5) = 4, c(4, 1) = 9, c(5, 3) = 7, c(5, 4) = 7$.
- D. $c(1, 4) = 9, c(2, 1) = 7, c(3, 1) = 9, c(3, 2) = 9, c(3, 5) = 2, c(4, 5) = 7, c(5, 3) = 7$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: A. $c(1, 2) = 7, c(1, 4) = 9, c(2, 3) = 9, c(3, 1) = 6, c(3, 5) = 1, c(4, 5) = 7, c(5, 3) = 6$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 175. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

0	9	5	0	0
0	0	8	0	9
0	0	0	0	7
0	0	0	0	2
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. $P = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 9$.
- B. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
- C. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
- D. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 6$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: A. $P = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 9$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 176. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 5$.
- B. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 2$.
- C. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 3$.

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	9	2	4	8
1	4	2	2	5	5
2	3	9	4	5	5

D. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 4$.

E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: B. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 2$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 177. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	9	8	5	0
0	0	7	0	0
0	0	0	9	3
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,3\} = 3$, $f\{3,5\} = 3$

A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 3$.

B. Hàm f không phải là luồng trong G .

C. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 5$.

D. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 7$.

E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 3$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 178. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	6	2	5	3
2	3	7	3	4	3
2	4	2	3	5	3

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,2\} = 6$, $f\{2,3\} = 3$, $f\{2,5\} = 3$, $f\{3,5\} = 3$

A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 6$.

B. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 7$.

C. Hàm f không phải là luồng trong G .

D. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 8$.

E. Tất cả phương án đều sai.

Lời giải.

Đáp án đúng: A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 6$

Chọn đáp án 

□