
a
Iso-contours of λ_u (solid) and d (dashed)
λ_u (s^{-1})
d
0.030
0.026
0.022
0.018
0.014
3
4
5
6
7
8
median angle = 25°
cross-inhibition J_{12} (nA)
self-excitation J_{11} (nA)


b
RT vs. λ_u (no collapse)
σ=0.015
σ=0.020
σ=0.025
mean correct RT (ms), $c' = 6.4$ %
unstable eigenvalue λ_u (s^{-1})
J_{11} (nA)


c
RT vs. J_{12}, coloured by J_{11}
mean correct RT (ms), $c' = 6.4$ %
cross-inhibition J_{12} (nA)
J_{11} (nA)


d
RT vs. J_{11}, coloured by J_{12}
mean correct RT (ms), $c' = 6.4$ %
self-excitation J_{11} (nA)
J_{12} (nA)


e
Out-of-sample: log RT$_{correct}$
grouped CV R^2 (bars); in-sample R^2 (ticks)
σ
J_{12}
J_{11}
λ_u
λ_u, d
J_{11},J_{12}
quad(J_{11},J_{12})
quad(λ_u, d)


f
Out-of-sample: accuracy
grouped CV R^2 (bars); in-sample R^2 (ticks)
σ
J_{12}
J_{11}
λ_u
λ_u, d
J_{11},J_{12}
quad(J_{11},J_{12})
quad(λ_u, d)