中心方体 Tauberian 常数的高阶渐近与共享方体多线性精确约化

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的 Tauberian 常数。令 $a=2^n t=v^n$、$v=2t^{1/n}$、$L_n(t)=[1-a/(1+v)^n]^{-1}$，$K_n=\binom{n}{2}n^2/27$。对每个固定整数 $n\ge 2$，证明

$$C_n(1-t)=L_n(t)+K_n a v^6-(n+26/9)K_n a v^7 + \widehat{J}_n a v^8+O_n(a v^9),$$

$$\widehat{J}_n=\frac{(n-1)n^3(2609+1971n+81n^2)}{26244}+\frac{16}{27}\mathbf{1}_{\{n=2\}}.$$

上界覆盖全部有限正测度可测输入及全部半径，下界由每个充分小参数的真实有限输入实现。首先用全部源点的原见证、投影分布和面容量建立粗八阶上包，再由竞争输入的定量稳定性提取正常角的实际二次反馈。整源共同高度使正常模型与其补集共用一次缺源成本，局部定向覆盖给出二维内部小尺度源的准确费用。固定正常整管、正份额吸收与九层消项给出九阶余项；二维两尺度微孔构造补足匹配下界，其中 $\widehat{J}_2=17638/6561$。对于共享同一中心方体、以公共交集归一化的多线性模型，证明精确线性约化、临界发散以及关于全部多线性重数一致的八阶渐近。

1 引言

几何极大算子的 Tauberian 常数衡量一个集合在高平均值条件下产生的水平集增量。本文只考虑中心轴平行立方体

$$Q(x,r)=x+[-r,r]^n,\qquad |Q(x,r)|=(2r)^n,\qquad r>0,$$

其中 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度，m,n 为正整数，水平参数属于 $(0,1)$。线性和共享方体的多线性极大算子分别为

$$M_{c,n}f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y,$$

$$M_{c,n}^{(m)}(f_1,\dots,f_m)(x)=\sup_{r>0}\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f_i(y)|\,\mathrm{d}y.$$

多线性定义中各因子使用同一个半径。对可测集记严格水平集

$$\mathcal{H}_n(\alpha;E)=\{M_{c,n}\mathbf{1}_E>\alpha\},\qquad \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)=\{M_{c,n}^{(m)}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})>\lambda\}.$$

定义

$$C_n(\alpha)=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|\mathcal{H}_n(\alpha;E)|}{|E|},\qquad C_n^{(m)}(\lambda)=\sup_{\substack{E_1,\dots,E_m\ \text{可测}\\ 0<|F|<\infty,\ F=\cap_i E_i}}\frac{|\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)|}{|F|}. \tag{1}$$

单个 E_i 可以有无限测度；该输入类是临界结论的一部分。

Solyanik 估计研究水平参数趋于 1 时 Tauberian 常数的衰减速度。Hagelstein–Parissis [2, Theorem 1] 转述的 Solyanik 定理给出同一中心方体对象的 $C_n(\alpha)-1\asymp_n \alpha^{-1}-1$。对测度族一致的中心弱型常数，Aldaz [1, Theorems 1.2, 2.10 and Corollary 3.5] 将其与 Besicovitch 交叠联系起来，并给出方体情形的常数 2^n。该常数具有不同的测度量词，不能直接认作 Lebesgue Tauberian 渐近系数。

截至 2026 年 11 月的相关预印本中，Mukherjee [5] 讨论非中心欧氏球的锐覆盖与 Solyanik 指数；Huang [3, 4] 分别讨论离散和遍历球极大算子、单侧遍历流。这些结果的几何或动力系统假设与本文不同，不能直接给出中心方体的高阶系数。

本文先用有限半径见证的贪心选择证明显式线性上界，以有限截断的周期孔给出匹配的一阶基线。高阶困难是：代表中心处的平均值不能替代全部水平集点的实际见证，少量异常方体也可能影响所需精度。我们先保留全部源点的面对容量，以局部 dyadic 计数回收小半径源，用有效端点的面缝和内部空隙回收取得一般输入的粗余项与临界正预算。原半盒的完整相交图随后给出加权多数根的全尺度窗口清单，其极限是允许错列和 T 接缝的单位方体铺砌。横截面分片与积分可见性计费控制角接触数，不要求全局晶格标签。最后回到同一源点的原指定见证，将它捕获的各个真实目标质量相加，在有效端盒内积分缺源层，得到准确的角部代价。任意大交长由小份额盈余支付，六阶同源局部价确定首个角部系数。为继续计算下一项，实际根传输和自适应探针给出全部正角的软容量；全源轮廓与管外缺量支付保留准确的目标缺角反馈。粗八阶上包进一步给出竞争输入的定量稳定性。正常角的实际双帽积分保留三近面反馈，整源共同高度支付正常窗以外的全部目标，并只使用一次缺源成本。二维小尺度源由覆盖全部可测源点的定向贪心给出准确费用。保留实际质量分母并结合两尺度微孔下界，确定八阶系数；再由完整源宽的形状收益、固定正常整管与九层消项，将其后余项控制到九阶。

定理 1.1 (真实八阶展开及幂余项)**.** 令

$$U_n(t)=1+\frac{2^n t}{1-t},\qquad L_n(t)=\left[1-\left(\frac{2t^{1/n}}{1+2t^{1/n}}\right)^n\right]^{-1}.$$

对 $n\ge 1$、$0<t<2^{-n}$，有

$$L_n(t)\le C_n(1-t)\le U_n(t), \tag{2}$$

其中右侧上界对 $0<t<1$ 成立。记

$$K_n=\binom{n}{2}\frac{n^2}{27},\qquad \widehat{J}_n=\frac{(n-1)n^3(2609+1971n+81n^2)}{26244}+\frac{16}{27}\mathbf{1}_{\{n=2\}}.$$

对每个固定整数 $n\ge 2$，进一步有

$$\begin{aligned}C_n(1-t)=L_n(t)&+2^{n+6}K_n t^{1+6/n}-2^{n+7}\left(n+\frac{26}{9}\right)K_n t^{1+7/n}\\&+2^{n+8}\widehat{J}_n t^{1+8/n}+O_n(t^{1+9/n}),\qquad t\downarrow 0.\end{aligned} \tag{3}$$

令

$$b_{n,j}=2^{n+j}\Bigg[\sum_{k=1}^{1+\lfloor j/n\rfloor}(-1)^{j-(k-1)n}\binom{n+j-1}{j-(k-1)n}\\ +\mathbf{1}_{\{j=6\}}K_n-\mathbf{1}_{\{j=7\}}\left(n+\frac{26}{9}\right)K_n+\mathbf{1}_{\{j=8\}}\widehat{J}_n\Bigg],\qquad 0\le j\le 8.$$

则全部维数的展开统一写为

$$C_n(1-t)=1+\sum_{j=0}^{8}b_{n,j}t^{1+j/n}+O_n(t^{1+9/n}). \tag{4}$$

通式包含低维的幂次碰撞；三维 $b_{3,5}=0$。特别地，

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{C_n(1-t)-1-2^nt}{t^{1+1/n}}=-n2^{n+1}.$$

置 $a=2^nt=v^n$、$v=2t^{1/n}$，并记

$$P_{7,n}(t)=L_n(t)+K_nav^6-\left(n+\frac{26}{9}\right)K_nav^7.$$

等价地，

$$\frac{C_n(1-t)-P_{7,n}(t)}{av^8}=\widehat{J}_n+O_n(v). \tag{5}$$

常数和小量按固定维数理解。在二维，

$$C_2(1-t)=L_2(t)+\frac{4}{27}av^6-\frac{176}{243}av^7+\frac{17638}{6561}av^8+O(av^9),\quad a=4t,\ v=2\sqrt{t}. \tag{6}$$

匹配下界使用有限测度输入和严格见证，适用于每个充分小的实参数。二维的额外内部小尺度费用也由两尺度微孔构造达到。

公共交集归一化的多线性对象还具有精确的参数约化。令

$$s_m(\lambda)=m(1-\lambda^{1/m}),\qquad \Phi_m(\lambda)=1-s_m(\lambda),\qquad \lambda_m^{*}=\left(1-\frac{1}{m}\right)^m\ (m\ge 2),$$

并置 $\lambda_1^{*}=0$。

定理 1.2 (精确约化与临界发散)**.** 对 $m,n\ge 1$，若 $\lambda_m^{*}<\lambda<1$，则

$$C_n^{(m)}(\lambda)=C_n\big(\Phi_m(\lambda)\big). \tag{7}$$

若 $m\ge 2$ 且 $0<\lambda\le\lambda_m^{*}$，则 $C_n^{(m)}(\lambda)=\infty$。

精确约化的反向构造在有限个见证方体中同时等分补集，并在移动中心后保留严格余量。结合 (3)，得到关于多线性重数一致的高阶展开。以下常数均允许依赖固定维数；不主张维数一致性。第 2 节准备同时等分、有限见证选择和参数控制；第 3 节证明精确约化、一般维数的锐上界与匹配有限构造；第 4 节给出共享方体模型下关于全部重数一致的推论。

2 预备知识

2.1 严格水平余量与同时等分

对固定半径，立方体平移满足

$$\frac{|Q(x,r)\triangle Q(z,r)|}{|Q(x,r)|}\le\frac{n\,\|x-z\|_\infty}{r}\qquad\big(\|x-z\|_\infty<2r\big).\tag{8}$$

事实上，两方体交集包含边长 $2r-\|x-z\|_\infty$ 的立方体，再用中值定理即可。因各输入的示性函数有界，固定半径的平均值关于中心连续，故本文的 Lebesgue 严格水平集都是开集。

引理 2.1 (乘积的总缺陷)**.** 若 $0\le a_i\le 1$ 且 $\prod_{i=1}^m a_i>\lambda$，则

$$\sum_{i=1}^m(1-a_i)<s_m(\lambda).$$

并且 $s_m(\lambda)<1$ 等价于 $\lambda>\lambda_m^*$。

证明. 由算术–几何平均不等式，$m^{-1}\sum_i a_i\ge(\prod_i a_i)^{1/m}>\lambda^{1/m}$。移项得到第一式；第二式直接解不等式即得。 □

引理 2.2 (有限族上的同时等分)**.** 设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 可测、$|A|<\infty$，$Q_1,\dots,Q_N$ 是有限个方体。对每个整数 $m\ge1$，存在可测分割 $A=\dot{\bigcup}_{i=1}^m A_i$，使

$$|A_i\cap Q_j|=\frac{|A\cap Q_j|}{m}\qquad(1\le i\le m,\ 1\le j\le N).$$

证明. 由各 Q_j 的归属关系把 A 分成至多 2^N 个 Boolean 原子。每个正测度原子 P 都可等分为 m 个可测部分：函数 $G_P(t)=|P\cap\{x_1\le t\}|$ 连续，且在两端趋于 $0,|P|$，故依次选择 $G_P(t)=k|P|/m$ 的切点即可。零测度原子任意分配。令 A_i 为所有原子的第 i 部分之并。每个 $Q_j\cap A$ 都是若干完整原子的并，逐项相加即得结论。 □

2.2 有限半径见证与交叠

下文的距离均为 ℓ_∞ 距离。有限方体族 $\{Q(x_i,r_i)\}$ 称为 Besicovitch 族，若 $\|x_i-x_j\|_\infty>\max(r_i,r_j)$ 对不同指标成立。

引理 2.3. *Besicovitch* 方体族的交叠重数不超过 2^n。

证明. 固定共同交点并平移为原点。按中心各坐标的正负号分为 2^n 类，零归入非负侧。同类两个中心若 $r_i\ge r_j$，则 $|x_{i,k}-x_{j,k}|\le\max(|x_{i,k}|,|x_{j,k}|)\le r_i$ 对所有坐标成立，与中心分离矛盾。 □

引理 2.4 (有限见证选择)**.** 设 $0<|E|<\infty$、$0<t<1$，且 $K\subset\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$ 紧。存在取有限多个正值的 *Borel* 见证半径函数 $r(x)$，以及有限 *Besicovitch* 族 $Q_i=Q(x_i,r_i)$、$x_i\in K$、$r_i=r(x_i)$，使 $K\subset\bigcup_i Q_i$。若

$$P_i=(K\cap Q_i)\setminus\bigcup_{j\ne i}Q_j,$$

则每个 $x\in P_i$ 都满足 $r(x)\le r_i$。

证明. 各点选一个严格见证。由固定半径平均值的连续性，该半径在中心的某开邻域内仍有效。紧性给出有限子覆盖及有限正半径列表。给每点指定列表中实际可用的最大半径；各可用条件为开条件，故所得函数为 Borel 函数。按半径降序处理各层，逐次选尚未被此前方体覆盖的中心，直至该层穷尽。任意选中两中心的距离大于其半径的最大值；又最小允许半径为正、K 有界，故总共只能选择有限次，最终覆盖 K。若 $x \in P_i$ 的指定半径大于 r_i，则其所在层处理完毕时，已有某个 $j \neq i$ 的方体覆盖它，与私有性矛盾。 □

命题 2.5 (外部水平集上界)**.** 对 $0 < |E| < \infty$、$0 < t < 1$，有

$$|\mathcal{H}_n(1-t;E) \setminus E| \le \frac{2^n t}{1-t}|E|, \qquad C_n(1-t) \le U_n(t). \tag{9}$$

证明. 对差集内任意紧集 K 用引理 2.4，再用引理 2.3，得

$$|K| \le \sum_i |Q_i \setminus E| < \frac{t}{1-t}\sum_i |Q_i \cap E| \le \frac{2^n t}{1-t}|E|.$$

内正则性给出第一式。Lebesgue 密度定理给出 $|E \setminus \mathcal{H}_n(1-t;E)| = 0$，从而得到第二式。 □

2.3　统一参数与有限阶系数传递

精确约化 (7) 将多线性问题化为一个标量参数代换。下面给出共同参数区间及有限递推，使这一代换的余项对所有重数一致。本小节的展开阶数 r 始终固定，与多线性重数 m 无关。

对辅助参数 $q \in [0,1]$ 定义

$$\sigma_q(z) = \begin{cases} [1-(1-z)^q]/q, & q > 0, \\ -\log(1-z), & q = 0, \end{cases} \qquad A_q(z) = \sigma_q(z)/z, \quad A_q(0) = 1.$$

实际重数对应 $q = 1/m$；$q = 0$ 只用于统一估计。

引理 2.6 (共同参数区间与截断)**.** 对 $q \in [0,1]$、$0 < \varepsilon \le 1/2$，有

$$\varepsilon \le \sigma_q(\varepsilon) \le -\log(1-\varepsilon) \le 2\varepsilon, \qquad \sigma_q(\varepsilon) \le \log 2 < 1. \tag{10}$$

写

$$A_q(z) = \sum_{k \ge 0} c_k(q) z^k, \qquad c_0(q) = 1, \qquad c_k(q) = \frac{k-q}{k+1} c_{k-1}(q).$$

对固定整数 $N \ge 1$，令

$$S_{N,q}(\varepsilon) = \varepsilon \sum_{k=0}^{N-1} c_k(q) \varepsilon^k.$$

则

$$0 \le \sigma_q(\varepsilon) - S_{N,q}(\varepsilon) \le \frac{2^{N+1}}{N+1}\varepsilon^{N+1}, \qquad \varepsilon \le S_{N,q}(\varepsilon) \le \sigma_q(\varepsilon). \tag{11}$$

证明. 积分式

$$\sigma_q(z) = \int_0^z (1-u)^{q-1}\,\mathrm{d}u, \qquad A_q(z) = \int_0^1 (1-uz)^{q-1}\,\mathrm{d}u$$

给共同区间及

$$c_k(q)=\frac{\prod_{\ell=1}^{k}(\ell-q)}{(k+1)!},\qquad 0\le c_k(q)\le\frac{1}{k+1}.$$

第 $N+1$ 阶导数为

$$\sigma_q^{(N+1)}(z)=\prod_{\ell=1}^{N}(\ell-q)(1-z)^{q-N-1}.$$

在 $0\le z\le 1/2$ 上介于零与 $N!2^{N+1}$ 之间，Taylor 定理即给 (11)。 □

对固定实数 p，记

$$a_{p,k}(q)=[z^k]A_q(z)^p,\qquad a_{p,0}(q)=1.$$

引理 2.7 (参数幂的有限递推)**.** 对 $k\ge 1$，有

$$ka_{p,k}(q)=\sum_{i=1}^{k}((p+1)i-k)c_i(q)a_{p,k-i}(q). \tag{12}$$

对固定 p,K，关于全部 $q\in[0,1]$ 一致有

$$A_q(\varepsilon)^p=\sum_{k=0}^{K}a_{p,k}(q)\varepsilon^k+O_{p,K}(\varepsilon^{K+1}).$$

证明. 由 $A_q(A_q^p)'=pA_q'A_q^p$ 比较 z^{k-1} 系数，得递推。在固定 $|z|\le\rho<1/2$ 内，

$$|A_q(z)-1|\le\rho/(1-\rho)<1.$$

因此 A_q 有归一化解析对数，A_q^p 在更小共同闭圆盘上一致有界。Cauchy 估计给所述余项；递推每步只用更小下标。 □

定理 2.8 (固定有限阶的条件性传递)**.** 固定 $n\ge 2$ 及整数 $r\ge 0$。若真实单线性常数满足

$$C_n(1-t)=1+\sum_{j=0}^{r}b_{n,j}t^{1+j/n}+o_{n,r}(t^{1+r/n}),$$

则关于全部整数 $m\ge 1$ 一致有

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon)=1+\sum_{J=0}^{r}B_{n,J}(m)\varepsilon^{1+J/n}+o_{n,r}(\varepsilon^{1+r/n}),$$

其中

$$B_{n,J}(m)=\sum_{k=0}^{\lfloor J/n\rfloor}b_{n,J-nk}\,a_{\,1+(J-nk)/n,k}(1/m). \tag{13}$$

取 $N=\lfloor r/n\rfloor+1$，还可一致地写成

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon)=1+\sum_{j=0}^{r}b_{n,j}S_{N,1/m}(\varepsilon)^{1+j/n}+o_{n,r}(\varepsilon^{1+r/n}).$$

该定理以所列单线性有限阶展开为前提。

证明. 精确约化给 $s=\sigma_{1/m}(\varepsilon)$ 及 $C_n^{(m)}(1-\varepsilon)=C_n(1-s)$。若标量余项为 $R(t)$，则

$$\omega(u)=\sup_{0<t\le u}|R(t)|/t^{1+r/n}\longrightarrow 0.$$

由共同区间，

$$\sup_{m}|R(\sigma_{1/m}(\varepsilon))|\le 2^{1+r/n}\omega(2\varepsilon)\varepsilon^{1+r/n}.$$

第 j 项为 $b_{n,j}\varepsilon^{1+j/n}A_{1/m}(\varepsilon)^{1+j/n}$。参数幂的第 k 项恰落在 $J=j+nk$，给出全部碰撞 (13)。截在 $k=\lfloor (r-j)/n\rfloor$ 后的首个指数严格大于 $1+r/n$，有限求和和引理 2.7 给共同 little-o。

用 $S_{N,q}$ 替换 σ_q 时，两者都在 $[\varepsilon,2\varepsilon]$。均值定理使第 p 次幂之差为 $O_{p,N}(\varepsilon^{p+N})$，有限项的总差至多为 $O_{n,r}(\varepsilon^{N+1})$。因 $N+1=\lfloor r/n\rfloor+2>1+r/n$，所需余项保持。常数和阈值依固定 n,r 及所给有限系数，不依 m。 □

引理 2.9 (周期基线的系数)**.** 本引理将 $L_n=[1-v^n/(1+v)^n]^{-1}$ 视为复变量 v 的函数。在 $|v|<1/2$ 内，

$$L_n(v)=1+\sum_{j\ge 0}\ell_{n,j}v^{n+j},\qquad \ell_{n,0}=1,\qquad \ell_{n,j}=-\sum_{k=1}^{\min(j,n-1)}\binom{n}{k}\ell_{n,j-k}.$$

并有有限和

$$\ell_{n,j}=\sum_{k=1}^{1+\lfloor j/n\rfloor}(-1)^{j-(k-1)n}\binom{n+j-1}{j-(k-1)n}.$$

证明. 由 $L_n=1+v^n/D_n(v)$，$D_n(v)=(1+v)^n-v^n=\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}v^k$，比较 $D_n\sum_j\ell_{n,j}v^j=1$ 的系数得递推。当 $\rho=|v|<1/2$ 时，几何 / 二项式双级数的绝对值总和至多

$$\sum_{k\ge 1}\rho^{nk}\sum_{h\ge 0}\binom{nk+h-1}{h}\rho^h=\sum_{k\ge 1}\left(\frac{\rho}{1-\rho}\right)^{nk}<\infty.$$

按次数合并须 $h=j-(k-1)n\ge 0$，即得有限和。此递推只计算明确定义的 L_n；真实修正系数仍由主证明的上下界确定。 □

3　主要证明

3.1　精确约化和临界分岔

定理 *1.2* 的证明. 先设 $\lambda>\lambda_m^*$，并置 $s=s_m(\lambda)\in(0,1)$。若 $x\in\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)$，存在共享见证方体 $Q=Q(x,r)$，使 $a_i=|E_i\cap Q|/|Q|$ 的乘积大于 λ。引理 2.1 给出

$$\frac{|Q\setminus F|}{|Q|}\le\sum_i\frac{|Q\setminus E_i|}{|Q|}<s,\qquad F=\bigcap_i E_i.$$

故

$$\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)\subset\mathcal{H}_n(1-s;F),\tag{14}$$

从而 $C_n^{(m)}(\lambda)\le C_n(1-s)$。

反向不等式在 $m=1$ 时显然成立。设 $m\ge 2$，固定 $0<|F|<\infty$ 及非空紧集 $K\subset \mathcal{H}_n(1-s;F)$。对每个 $x\in K$ 选取见证方体 $Q(x,r_x)$，记其缺陷比例为 $d_x<s$。由 (8)，存在开邻域 $U_x\ni x$，使对所有 $z\in U_x$，

$$\frac{|Q(z,r_x)\triangle Q(x,r_x)|}{|Q(x,r_x)|}<\frac{s-d_x}{2m}.$$

取有限子覆盖 $K\subset\bigcup_{j=1}^{N}U_j$，并记相应方体、缺陷为 Q_j,d_j。令 $D=\bigcup_j Q_j$，在 $D\setminus F$ 上使用引理 2.2，得到分割 $D\setminus F=\dot{\bigcup}_i A_i^D$，满足 $|A_i^D\cap Q_j|=d_j|Q_j|/m$。将其扩充为 F^c 的分割：

$$A_1=A_1^D\cup(F^c\setminus D),\qquad A_i=A_i^D\ (i\ge 2),\qquad E_i=\mathbb{R}^n\setminus A_i.$$

于是 $\bigcap_i E_i=F$。若 $z\in K\cap U_j$，置 $\widetilde{Q}=Q(z,r_j)$，则

$$\frac{|A_i\cap\widetilde{Q}|}{|\widetilde{Q}|}\le\frac{|A_i\cap Q_j|+|\widetilde{Q}\setminus Q_j|}{|Q_j|}<\frac{d_j}{m}+\frac{s-d_j}{2m}<\frac{s}{m}.$$

各因子的平均值因此严格大于 $1-s/m$，乘积严格大于 $(1-s/m)^m=\lambda$。因此

$$K\subset\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m).$$

对开集 $\mathcal{H}_n(1-s;F)$ 用 Lebesgue 内正则性取紧集，再对 F 取上确界，得到 $C_n(1-s)\le C_n^{(m)}(\lambda)$，证明了 (7)。

再设 $m\ge 2$、$\lambda\le\lambda_m^{*}$。取周期条带分割

$$A_i^0=\{x\in\mathbb{R}^n:\{x_1\}\in[(i-1)/m,i/m)\},\qquad 1\le i\le m,$$

以及任意有界可测集 F，其中 $0<|F|<\infty$。令 $A_i=A_i^0\setminus F$、$E_i=\mathbb{R}^n\setminus A_i$，则公共交集恰为 F。对任意 x，选择足够大的整数 N，使 $F\subset Q(x,N/2)$。整数长度区间上每个条带恰占比例 $1/m$，故

$$\frac{|E_i\cap Q(x,N/2)|}{|Q(x,N/2)|}=1-\frac{1}{m}+\frac{|A_i^0\cap F|}{|Q(x,N/2)|}.$$

所有因子不小于 $1-1/m>0$，并因 $\sum_i|A_i^0\cap F|=|F|>0$ 至少一个严格较大。因此乘积严格大于 $\lambda_m^{*}\ge\lambda$。整个 $\mathbb{R}^n$ 都属于多线性水平集，所求常数为无穷。 □

3.2 周期孔下界

命题 3.1 (周期孔下界)**.** 令 $\rho_\alpha=\min\{(1-\alpha)^{1/n},1/2\}$。对 $0<\alpha<1$，有

$$C_n(\alpha)\ge\left[1-\left(\frac{2\rho_\alpha}{1+2\rho_\alpha}\right)^n\right]^{-1}.$$

证明. 固定 $0<\rho<\rho_\alpha$、整数 $N\ge 2$，置

$$\delta=\frac{\rho}{N(1+2\rho)},\qquad r=\frac{1}{N(1+2\rho)},\qquad P_k=\frac{k}{N}+[-\delta,\delta]^n\quad(k\in\{1,\dots,N-1\}^n),$$

并定义 $E_{N,\rho}=[0,1]^n\setminus\bigcup_k P_k$。若 $x\in P_k$，则 $2\delta<r$，故 $P_k\subset Q(x,r)$。又 $r+2\delta=1/N$，所以 $Q(x,r)$ 与其他孔至多在边界接触；$r+\delta<1/N$ 保证 $Q(x,r)\subset[0,1]^n$。因此

$$\frac{|E_{N,\rho}\cap Q(x,r)|}{|Q(x,r)|}=1-\rho^n>\alpha.$$

而 $E_{N,\rho}$ 除有限个方体边界外都是内点，也属于严格水平集。故该水平集包含 $[0,1]^n$ 的几乎所有点，且

$$C_n(\alpha) \geq \frac{1}{|E_{N,\rho}|} = \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n \left(\frac{2\rho}{1+2\rho}\right)^n\right]^{-1}.$$

先令 $N \to \infty$，再令 $\rho \uparrow \rho_\alpha$，得到结论。 □

3.3 有限见证族与局部空隙

以下固定整数 $n \geq 2$，并记

$$H = 2^n, \qquad a = Ht = v^n, \qquad v = 2t^{1/n}, \qquad A_v = (1+v)^n.$$

下面的小半径回收与精确环境记账将给出统一余项，记

$$\omega_n(v) = v^6. \tag{15}$$

所有距离均取 ℓ_∞ 距离，所有隐含常数均允许依赖固定维数。取有限正测度输入 E 和紧集 $K \subset \mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$，记 $M = |K|$。引理 2.4 给出一个取有限个值的 Borel 严格见证半径 $r(x)$，以及覆盖 K 的有限族 $Q_i = Q(x_i, r_i)$，满足

$$\|x_i - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j) \quad (i \neq j), \qquad |Q_i \setminus E| < a r_i^n. \tag{16}$$

降序贪心还保留如下捕获性质：每个 $x \in K$ 都被某个半径 $r_j \geq r(x)$ 的选中 Q_j 覆盖。事实上，处理 $r(x)$ 所在层结束时该点已经被覆盖，而后来各层半径只会减小。定义

$$P_i = (K \cap Q_i) \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j, \qquad m_i = |P_i|.$$

对私有点，捕获指标只能是 i，所以

$$r(x) \leq r_i \qquad (x \in P_i). \tag{17}$$

再记

$$B_i = Q(x_i, r_i/2), \quad B = \bigcup_i B_i, \quad S = \sum_i r_i^n, \quad A_i^0 = Q(x_i, 3r_i/4), \quad e_i^0 = |A_i^0 \setminus B|/r_i^n.$$

原半盒 B_i 两两不交；否则中心距离不超过 $(r_i + r_j)/2 \leq \max(r_i, r_j)$，违背 (16)。因此 $|B| = S$。另外

$$M/a \leq S, \qquad 0 \leq m_i \leq a r_i^n, \qquad \sum_i m_i \geq 2M - aS, \tag{18}$$

$$\left|\bigcup_i Q_i\right| \leq |E| + aS, \qquad (1-a)S \leq |E|. \tag{19}$$

第一行最后一式由覆盖重数得到：私有部分重数为一，其余 K 点重数至少为二，故 $\sum_i |K \cap Q_i| \geq 2M - \sum_i m_i$，而左端不超过 aS。第二行使用 $B \subset \bigcup_i Q_i$ 及严格见证。

引理 3.2 (小空隙的局部定位)**.** 存在只依赖 n 的 $\epsilon > 0$，使 $e_i^0 < \epsilon$ 时：

1. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$ 后，每个 $y \in [-5/8, 5/8]^n$ 距某个 B_j 不超过 $h = 1/(1024 \cdot 9^n)$，且所有这样相遇的增厚盒均满足 $r_j \geq 1 - 1/256$。

2. 每个几何私有点 $x \in Q_i \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j$ 满足

$$\|x - x_i\|_\infty \leq c e_i^0 r_i, \qquad c = 4^n. \tag{20}$$

3. 每个 $x \in Q_i$ 都属于某个深盒 $Q(x_j, 9r_j/10)$。

证明. 令 $\eta_0 = 1/64$、$N = 9^n$、$h = \eta_0/(16N)$、$\epsilon = (2h)^n$，并归一化 $x_i = 0, r_i = 1$。若 $j \neq i$ 且 $B_j \cap A_i^0 \neq \varnothing$，则

$$\max(1, r_j) < \|x_j\|_\infty \leq 3/4 + r_j/2,$$

故 $1/2 < r_j < 3/2$。所有这些半盒连同 B_i 均在 $[-9/4, 9/4]^n$ 内，每个体积至少为 2^{-n}，所以至多有 N 个。记 $T = [-5/8, 5/8]^n$。若某个 $y \in T$ 到 B 的距离大于 h，则 $Q(y, h) \subset A_i^0 \setminus B$，与 $e_i^0 < (2h)^n$ 矛盾。因此增厚盒 $B_j + [-h, h]^n$ 覆盖 T。凡增厚后与 T 相遇的盒，其原盒仍与 A_i^0 相交。这些增厚盒与 T 的交集构成连通集 T 的有限闭覆盖，其相交图连通并含指标 i。若两顶点相邻，则

$$\max(r_j, r_k) < \|x_j - x_k\|_\infty \leq (r_j + r_k)/2 + 2h, \qquad |r_j - r_k| < 4h.$$

沿至多 $N - 1$ 条边得到 $r_j \geq 1 - 4Nh = 1 - 1/256$，证明第一项。

先证私有点满足 $\|x\|_\infty < \eta_0$。否则反射置换后可令 $x_1 = \|x\|_\infty \in [\eta_0, 1]$。取 $q = 1/2 + \eta_0/2$，令 $y_1 = q$，其余坐标由 x_k 截断到 $[-q, q]$ 得到。于是

$$y \in T, \quad \operatorname{dist}_\infty(y, B_i) = \eta_0/2 > h, \quad \|x - y\|_\infty \leq 1/2 - \eta_0/2.$$

第一项给出 $j \neq i$，使 $\operatorname{dist}_\infty(y, B_j) \leq h$ 且 $r_j \geq 1 - \eta_0/4$。故

$$\operatorname{dist}_\infty(x, B_j) \leq 1/2 - \eta_0/2 + h < 1/2 - \eta_0/8 \leq r_j/2,$$

使 $x \in Q_j$，矛盾。现令 $d = \|x\|_\infty > 0$，仍设 $x_1 = d$。开柱

$$1/2 < y_1 < 1/2 + d/4, \qquad |y_k| < 1/8 \quad (k > 1)$$

位于 $A_i^0 \setminus B_i$。若其中一点属于 B_j，则分离性给出

$$r_j/2 > 1 - \|y\|_\infty \geq 1/2 - d/4 \geq \|x - y\|_\infty,$$

因为法向距离至多 $1/2 - 3d/4$，切向距离小于 $d + 1/8$，且 $d < 1/64$。这又使 $x \in Q_j$，矛盾。整柱都在 $A_i^0 \setminus B$ 内，其体积为 $4^{-n} d$，故 $d \leq 4^n e_i^0$。当 $d = 0$ 时结论平凡，第二项得证。

最后将任意 $x \in Q_i$ 的坐标截断到 T 得到 y，移动量至多 $3/8$。第一项给出的同一个 B_j 满足

$$\|x - x_j\|_\infty \leq 3/8 + h + r_j/2 < 9r_j/10,$$

其中 $3/8 + h < (2/5)(1 - \eta_0/4)$。这证明第三项。 □

引理 3.3 (相邻大尺度的线性控制)**.** 固定 $D, L > 0$。若 $e_i^0, e_j^0 \le Dv$、$r_j \ge r_i$，并存在 $x \in Q_j$ 满足 $\|x - x_i\|_\infty \le Lvr_i$，则当 v 充分小时，

$$r_j - r_i \le C_n e_j^0 r_j. \tag{21}$$

起效阈值允许依赖 n, D, L。

证明. 当 $i = j$ 时直接成立。否则归一化 $r_j = 1, x_j = 0$。由前一引理对 $x \in Q_j$ 的深覆盖，存在同一个指标 k，使 $\|x - x_k\|_\infty < 0.9r_k$ 且 $r_k \ge 1 - 1/256 > 0.99$。小 v 时 $\|x_i - x_k\|_\infty < 0.9r_k + Lvr_i < r_k$，故分离性迫使 $k = i$。所以 $r_i > 0.99$，且 $\|x_i\|_\infty \le 1 + Lv$。当 $Lv < 1/16$ 时，$B_i \cap A_j^0$ 每个坐标的交长至少为 $3/4 + 0.99/2 - (1 + 1/16) > 1/8$；包含投影的情形也满足该下界。因此可取边长 $1/8$ 的闭方盒 $U_i \subset B_i \cap A_j^0$、$U_j \subset B_j$。

对任意 $p \in U_i, q \in U_j$，在线段 $z_\theta = (1 - \theta)p + \theta q$ 上有

$$\operatorname{dist}_\infty(B_h, B_l) \ge |r_h - r_l|/2$$

对不同原半盒成立。线段与每个半盒的逆像为闭区间或点；依次列出这些互不相交的区间，对间隙长度求和，线段在 B 外的路程至少为 $|1 - r_i|/2$。线段都在凸盒 A_j^0 内，总长度至多 $3/2$，故

$$\int_0^1 \mathbf{1}_{A_j^0 \setminus B}(z_\theta)\, \mathrm{d}\theta \ge |1 - r_i|/3.$$

现令 p, q 在两小盒上独立均匀分布。对 $\theta \le 1/2$ 条件于 q，z_θ 的密度至多为 16^n；对 $\theta \ge 1/2$ 则条件于 p。Tonelli 定理给 $|1 - r_i| \le 3 \cdot 16^n |A_j^0 \setminus B| = 3 \cdot 16^n e_j^0$。恢复尺度即得结论。 □

3.4 实际见证的面容量与角部交叠

接下来使用的源簇和深目标可以不同，深目标之间也可以重叠。必须保留的不交条件是：每个源簇与其他指标的深目标不交。下面将这一版本完整证明，以便随后在标记区域的边界上改变源簇。

引理 3.4 (强面容量与单源角部工具)**.** 固定 $A \ge 1$。对有限指标集 $\mathcal{L}$，设可测目标 $G_i \subset K_0 \cap Q_i$ 覆盖有限测度集 $K_0 \subset E^c$，其中 $M_0 = |K_0| > 0$。另有可测源簇 $F_i \subset G_i$，记 $g_i = |G_i|$、$\mu_i = |F_i|$，满足

$$(1 - Av)ar_i^n \le \mu_i \le g_i \le ar_i^n, \qquad F_i \subset Q(x_i, Avr_i), \qquad F_i \cap G_j = \varnothing\ (i \ne j), \tag{22}$$

$$G_i \subset Q(x, r(x)), \qquad R_i := (g_i/a)^{1/n} < r(x) \le (1 + Av)r_i \quad (x \in F_i), \tag{23}$$

且这些 $Q(x, r(x))$ 是关于原输入 E 的严格见证。先固定 A 及下文所需的有限个深度常数，再选只依赖这些常数和维数的 $\lambda_0 > 0$。当 v 充分小时，可用斜率

$$\lambda_i = \lambda_0 (vr_i)^{n-1} \tag{24}$$

构造体积不小于整个源质量的中点投影盒 W_i 及长方体 $X_i = x_i + W_i + [-R_i/2, R_i/2]^n \subset Q_i$。它们满足下面证明中的 (28)、(37) 和单源角部界 (35)。若某指标的源簇还满足 $F_i \subset P_i$，则同一构造有

$$|X_i \setminus B_i| \le C_2(n) e_i^\beta r_i^n, \qquad C_2(n) = 2n4^n 3^{n-1}, \tag{25}$$

只要 $e_i^0 < \epsilon$、$e_i^0 \le e_i^\beta$ 且 $4^n e_i^\beta \le 1$，其中 ϵ 是引理 3.2 的阈值。最后这个常数与 A 及扩大窗口参数 β 无关。

证明. 先逐坐标调整源簇端点。写 $F_i - x_i$ 在第 l 坐标的原始投影端点为 ℓ_{il}^0, h_{il}^0，并令

$$F_{il}(s) = |\{x \in F_i : x_l - x_{i,l} \le s\}|.$$

该分布函数连续，且在原始两端分别为零和 μ_i。取 ℓ'_{il} 为 $F_{il}(s) - \lambda_i s$ 在原始闭区间上的极小点。由极小性，

$$F_{il}(\ell'_{il}) \le \lambda_i(\ell'_{il} - \ell_{il}^0), \qquad F_{il}(\ell'_{il} + d) \ge \lambda_i d \quad (0 \le d \le h_{il}^0 - \ell'_{il}). \tag{26}$$

右端 h'_{il} 以反射后的分布函数作同样构造。当 $\ell'_{il} + d > h_{il}^0$，第二式在所有所需的 $0 \le d \le K v r_i$ 范围内仍成立。这里先固定一个足够大的 $K = K(n, A)$，支配实际半径增量及所需端外深度，再要求 $\lambda_0 K \le 1/4$。此时左端已等于 $\mu_i \ge (v r_i)^n/2$，而 $\lambda_i d \le (v r_i)^n/4$。

记所有方向的端点移动总量为

$$\Delta_i = \sum_l [(\ell'_{il} - \ell_{il}^0) + (h_{il}^0 - h'_{il})] = O_{n,A}(v r_i).$$

从源簇中概念性地去掉各方向原端到有效端的尾部，质量损失至多为 $\lambda_i \Delta_i$。具体地，$\Delta_i \le 4nAvr_i$，故只要 $\lambda_0 \le 1/(32nA)$，就有 $\lambda_i \Delta_i \le \mu_i/4$。因此有效投影盒 $W_i' = \prod_l [\ell'_{il}, h'_{il}]$ 容纳至少 $3\mu_i/4$ 的质量。各边至多为 $2Avr_i$，故每一边至少为 $c_w v r_i$，其中可取 $c_w = 1/[4(2A)^{n-1}]$。特别是每个左有效端严格小于右有效端。原始投影盒 $W_i^0 = \prod_l [\ell_{il}^0, h_{il}^0]$ 也有相同的边长下界。

实际使用原端和有效端的中点：

$$L_{il} = (\ell_{il}^0 + \ell'_{il})/2, \quad H_{il} = (h_{il}^0 + h'_{il})/2, \quad W_i = \prod_l [L_{il}, H_{il}].$$

W_i 比 W_i' 增加的总边长为 $\Delta_i/2$。展开体积乘积，得到

$$|W_i| - \mu_i \ge [\tfrac{1}{2} c_w^{n-1} - \lambda_0](v r_i)^{n-1} \Delta_i \ge c'_{n,A}(v r_i)^{n-1} \Delta_i \ge 0. \tag{27}$$

这里另要求 $\lambda_0 \le c_w^{n-1}/4$，所以正系数严格保留。这些固定上界同时选择一个正的 λ_0，随后才令 v 足够小。设 $\varepsilon_i = |W_i|/\mu_i - 1 \ge 0$，则 $\varepsilon_i \le C_{n,A}$。又因原盒比中点盒的体积增加量至多为 $C_{n,A}(v r_i)^{n-1}\Delta_i$，由 (27) 得

$$|(x_i + W_i^0) \setminus F_i| \le C_{n,A} \varepsilon_i \mu_i. \tag{28}$$

因此后面保留的是整个源质量 μ_i，没有再删固定分位质量。定义

$$X_i = x_i + W_i + [-R_i/2, R_i/2]^n. \tag{29}$$

其各端点在原源投影范围内，故 $X_i \subset Q(x_i, (1/2 + Av) r_i) \subset Q_i$。

若两个 X_i, X_j 相交，令 $s = r_i + r_j$，则中心分离给出

$$\max(r_i, r_j) < \|x_i - x_j\|_\infty \le (1/2 + Av)s, \qquad r_j/r_i = 1 + O_{n,A}(v).$$

不交半盒的体积计数还给每个长方体的相交邻居数为 $O_n(1)$。取 $A_1 = 5(1+A)$，称 $|x_{i,l}-x_{j,l}| \ge (1/2 - A_1 v)s$ 的坐标为临界坐标。至少一个坐标临界；每个临界投影的交长为 $O_{n,A}(vr_i)$。为明确所需余量，由相交条件有 $\min(r_i, r_j) \ge (1/2 - Av)s$，而 $R_i \ge (1 - Av)r_i$。所以小 v 时

$$\min(R_i, R_j) \ge (1 - Av)(1/2 - Av)s \ge (1/2 - 2Av)s.$$

在非临界坐标上，对任意 $x \in F_i, z \in F_j$，

$$|x_l - z_l| < [1/2 - (A_1 - A)v]s < \min(R_i, R_j).$$

在临界坐标上，按中心次序反射后有 $z_l - x_l \ge [1/2 - (A_1 + A)v]s > 0$，所以两簇全部点按相同次序排列。临界投影交长至多为 $(A + A_1)vs$，也明确给出前述交长上界。

先设只有一个临界轴 q，反射使 i 在 j 左侧，并记中心差为 $d_0 = x_{j,q} - x_{i,q} > 0$。我们证明两个有方向的端距界

$$d_0 + \ell'_{jq} - h^0_{iq} \ge R_i, \qquad d_0 + \ell^0_{jq} - h'_{iq} \ge R_j. \tag{30}$$

若第一式失败，可取源点 $x \in F_i$ 的法向坐标趋近原始端 $x_{i,q} + h^0_{iq}$，使 $d_* = x_{j,q} + \ell'_{jq} - x_q < R_i$。令 $r = r(x)$，并取 $0 < \rho < \min(R_i - d_*, vr_i)$。所有目标源点中满足

$$z_q \le x_{j,q} + \ell'_{jq} + (r - R_i) + \rho$$

的点均在 $Q(x, r)$ 中：法向使用同序及 $d_* + \rho < R_i$，切向使用非临界余量。由 (26) 及其端外延伸，这部分质量至少为 $\lambda_j[(r - R_i) + \rho]$。它与 G_i 不交，因为 $F_j \cap G_i = \varnothing$。相邻半径比及斜率的选取保证，小 v 时

$$\lambda_j \ge na(1 + Av)^{n-1} r_i^{n-1}, \qquad a(r^n - R_i^n) \le na(1 + Av)^{n-1} r_i^{n-1}(r - R_i).$$

目标尾质量严格超过真实见证在 G_i 之外的剩余容量，矛盾。第二式从 F_j 的原始左端取源点，以 F_i 的有效右端反射重复上述容量比较。对两个端距界取平均，恰得到中点端之间的距离至少为 $(R_i + R_j)/2$。所以只有一个临界方向的两个 X 没有正体积交叠。

现在设有 $q \ge 2$ 个临界坐标，对应的正交长为 $L_1, \dots, L_q \le C_{n,A} vr_i$；若某个交长为零，则该对的交体积为零，无需继续估计。可设 $R_i \ge R_j$，并在每个临界坐标分别反射，使同一个源簇 i 都位于目标簇 j 的左侧。原始源投影盒也保持这个次序，因为临界中心差可比于 r_i，而各源位移仅为 $O_{n,A}(vr_i)$。相同理由使扩大投影的左右端点都按中心次序排列，不发生包含投影。因此每个临界轴的中点面对端距恰为 $(R_i + R_j)/2 - L_l$，原始面对端距 g^0_l 只会更小，故

$$g^0_l \le (R_i + R_j)/2 - L_l \le R_i - L_l. \tag{31}$$

取固定 $0 < \theta \le 1/4$，只依赖 n, A，并足够小使 θL_l 不超过源原始该边长的一半。在源原始盒中沿全部 q 个面对极端同时向内取厚度 θL_l，其他坐标完整保留，得到一个源角条。令

$$\ell_l = L_l/(vr_i), \qquad B_{ij} = \prod_{l=1}^{q} \ell_l.$$

各原始边长可比于 vr_i，所以该角条体积至少为 $c_{n,A}B_{ij}\mu_i$。若 $B_{ij}\le C_{n,A}\varepsilon_i$，下面所需的角部估计已经成立。否则由 (28)，角条与 F_i 有正测交。选取其中一个源点 x，始终使用它的同一个原指定见证，记

$$r(x)=R_i+\sigma,\qquad \sigma>0,\qquad z=\sigma/(vr_i). \tag{32}$$

实际半径上界及 $R_i\ge(1-Av)r_i$ 给 $0<z\le C_{n,A}$。

由 (31)，该源点到目标原始面对端的距离至多为 $R_i-(1-\theta)L_l$。记原始目标边长为 $w^0_{j,l}=h^0_{jl}-\ell^0_{jl}$。在目标原始盒中，第 l 个临界方向从面对端向内取厚度

$$t_l=\min\{\sigma+(1-\theta)L_l,\ w^0_{j,l}\}, \tag{33}$$

其余坐标完整保留，所成的同一个目标角条全部位于 $Q(x,r(x))$ 内。在临界轴，每个目标点满足 $0<y_l-x_l\le R_i-(1-\theta)L_l+t_l\le R_i+\sigma$；在非临界轴，前述切向估计只用到了原始坐标投影范围，因而对整个原始目标投影盒都成立，故距离小于 $\min(R_i,R_j)$。这里全部方向使用同一个源点和同一个实际增量。

截断深度有统一的下界。原始目标边长满足 $w^0_{j,l}\ge c_{n,A}vr_i$，而 $\sigma+L_l\le C_{n,A}vr_i$，因此存在固定 $\gamma_{n,A}>0$，使所有临界方向同时有

$$t_l\ge\gamma_{n,A}(\sigma+L_l).$$

例如取 $3/4$ 与上述下、上界常数之比的较小值即可。由此目标角条的体积至少为 $c_{n,A}\mu_j\prod_l(z+\ell_l)$。扣除 (28) 的缺失量，进入同一源见证的目标源质量至少为

$$\mu_j\left[c_{n,A}\prod_{l=1}^{q}(z+\ell_l)-C_{n,A}\varepsilon_j\right].$$

这部分与 G_i 不交，真实剩余容量却至多为

$$a[(R_i+\sigma)^n-R_i^n]\le C_{n,A}ar_i^{n-1}\sigma\le C_{n,A}\mu_j vz.$$

所以严格见证给出耦合不等式

$$\prod_{l=1}^{q}(z+\ell_l)\le C_{n,A}(vz+\varepsilon_j). \tag{34}$$

乘积的非负展开包含 z^q+B_{ij}。又对所有 $z\ge0$，

$$Cvz-z^q\le\max_{u\ge0}(Cvu-u^q)=(q-1)(Cv/q)^{q/(q-1)},$$

其中最大点为 $(Cv/q)^{1/(q-1)}$。于是包括源角条缺失的前一分支，

$$|X_i\cap X_j|\le C_{n,A}v^q[\varepsilon_i+\varepsilon_j+v^{q/(q-1)}]r_i^n. \tag{35}$$

常数可对所有 $2\le q\le n$ 统一。由于

$$q+\frac{q}{q-1}-4=\frac{(q-2)^2}{q-1}\ge0,$$

全部多临界对都满足

$$|X_i \cap X_j| \le C_{n,A}[v^2(\varepsilon_i+\varepsilon_j)+v^4]r_i^n. \tag{36}$$

最后结算体积。展开 $\prod_l (R_i + H_{il} - L_{il})$ 并逐阶用算术–几何平均，得到

$$|X_i| \ge (R_i + |W_i|^{1/n})^n \ge (R_i + \mu_i^{1/n})^n + c_{n,A} v \varepsilon_i r_i^n.$$

第二步用 $\varepsilon_i = O_{n,A}(1)$、$\mu_i^{1/n} \asymp v r_i$ 和中值定理。再把 μ_i 增至 g_i，其导数至多为 $C_{n,A} v/a$，故

$$|X_i| \ge A_v g_i/a - C_{n,A}\frac{v}{a}(g_i - \mu_i) + c_{n,A} v \varepsilon_i r_i^n. \tag{37}$$

单源角部界只用源 / 目标条件、原始边长可比及 (28)，所以在这里的强斜率下同样成立。后面将用它处理外边界对；其余角部还会使用全部源点及未使用的面缝。

若 $F_i \subset P_i$ 且 $e_i^0 < \epsilon$，局部定位使其全部原始投影端落在 $[-ce_i^\beta r_i, ce_i^\beta r_i]$ 内。中点端仍在原端范围内，且 $R_i \le r_i$，所以 $X_i \subset Q(x_i, (1/2 + ce_i^\beta) r_i)$。当 $ce_i^\beta \le 1$ 时，

$$|X_i \setminus B_i| \le [(1+2ce_i^\beta)^n - 1] r_i^n \le 2nc 3^{n-1} e_i^\beta r_i^n.$$

这就是 (25)，其系数仅依赖 n。 □

3.5 真正面邻居与全部源点的半径约束

引理 3.5 (每个轴向的面邻居)**.** 存在纯维数阈值 $\epsilon_n > 0$，使 $e_i^0 < \epsilon_n$ 时，每个轴向及符号都有另一个原半盒 B_p。反射、归一化为 $x_i = 0, r_i = 1$，且该方向为正 q 轴后，它满足

$$x_{p,q} = (1 + r_p)/2 + b_{ip}, \qquad 0 < b_{ip} \le 8^{n-1} e_i^0, \qquad |r_p - 1| \le 2 b_{ip}. \tag{38}$$

切向投影的交集含一个边长 $1/8$ 的面块 T_{ip}，它到双方切向边界的距离至少为 $1/16$。此外 $Q_i \cap Q_p \ne \varnothing$。

证明. 在引理 3.2 中取 $y = (5/8)e_q$。同一个增厚覆盖盒满足 $\mathrm{dist}_\infty(y, B_p) \le h$ 及 $|r_p - 1| < 1/256$；后一个双向界由该引理证明中的连通路径半径差求和得到。因 y 距 B_i 为 $1/8 > h$，有 $p \ne i$。切向中心坐标满足 $|x_{p,l}| \le r_p/2 + h$，不能实现中心分离，法向中心又不可能为负，故

$$x_{p,q} > \max(1, r_p), \qquad 1/2 < x_{p,q} - r_p/2 \le 5/8 + h.$$

每个切向投影的交长至少为 $1/2 - h$，可选上述面块与固定裕量。记 $b = x_{p,q} - r_p/2 - 1/2$，考虑面块上法向位于 $(1/2, 1/2 + b)$ 的开窄缝。它包含于 A_i^0。若某个另外的 B_k 包含其中一点 z，则 $1/2 < r_k < 3/2$，并在每个切向坐标有

$$|x_{k,l}| \le 1/2 - 1/16 + r_k/2 < \max(1, r_k).$$

法向负号也不能实现中心分离，所以 $x_{k,q} > \max(1, r_k)$，其半盒左端大于 $1/2$。由于 z 在 B_p 各切向投影内部，B_k, B_p 的切向投影都有正交长。半盒不交迫使 B_k 的右法向端不超过 B_p 左端 $1/2 + b \le 5/8 + h$，但前者大于 $1/2 + r_k > 1$，矛盾。

整条窄缝因此属于 $A_i^0 \setminus B$，体积为 $b 8^{1-n}$，故 $b \le 8^{n-1} e_i^0$。中心分离另给 $b > |r_p - 1|/2$，证明 (38)。法向中心约为一，切向中心至多约为 $1/2$，且 r_p 约为一，所以两个原 Q 相交。恢复尺度即可。 □

若 $e_i^0 \le Dv$，则面邻居满足 $r_p/r_i = 1 + O_{n,D}(v)$，法向中心差为 $r_i + O_{n,D}(vr_i)$，切向中心差至多为 $(1/2 + 1/128)r_i$。因此对满足 (22)–(23) 的这两个指标，该面方向真正单临界，切向还有固定的 r_i 量级裕量，不要求两个 X 预先相交。应用时先将 A 固定得足够大，以包含规则常数 D 及全部有限深度的定位常数，再选择强斜率 λ_0。

引理 3.6 (全部源点的面对容量)**.** 对上述同一层的面邻居源、目标，在正 q 方向记

$$g_{i\to p} = x_{p,q} + \ell'_{p,q} - (x_{i,q} + h^0_{i,q}) - R_i, \quad g_{p\to i} = x_{p,q} + \ell^0_{p,q} - (x_{i,q} + h'_{i,q}) - R_p, \tag{39}$$

$$\Gamma_{ip} = \tfrac{1}{2}(g_{i\to p} + g_{p\to i}). \tag{40}$$

两个有向余量均非负；Γ_{ip} 恰为 X_i, X_p 的中点面对端之间的间距。对每个 $x \in F_i$，有

$$(1 - C_{n,A}v)[r(x) - R_i] \le g_{i\to p} + x_{i,q} + h^0_{i,q} - x_q. \tag{41}$$

特别是 $g_{i\to p} \le 2\Gamma_{ip}$。负方向用坐标反射定义。

证明. 令 $\sigma = r(x) - R_i > 0$、$\delta_q = x_{i,q} + h^0_{i,q} - x_q \ge 0$，源点到目标有效左端的距离为 $d = R_i + g_{i\to p} + \delta_q$。若 $r(x) \le d$，所需上界直接成立。否则，目标源簇在有效端右侧深度 $r(x) - d$ 的尾质量至少为 $\lambda_p[r(x) - d]$，并全部进入同一个源见证。切向使用面邻居的固定裕量；法向使用全部源点的同序。尾部深度是 $O_{n,A}(vr_i)$，在选定的端外 CDF 延伸范围内。它与 G_i 不交，而实际剩余容量至多为 $C_{n,A}ar_i^{n-1}\sigma$。又 $\lambda_p \ge c_{n,A}(vr_i)^{n-1}$，两者斜率比为 $C_{n,A}v$，所以

$$\sigma - g_{i\to p} - \delta_q \le C_{n,A}v\sigma.$$

这证明 (41)。若 $g_{i\to p} < 0$，取源坐标趋近原始右端，使 δ_q 足够小，上式左侧严格为正而右侧所需界为负，矛盾。反向同理。两个有向端距取平均正是中点面对端距，故 (40) 非负，并控制每个有向余量。 □

3.6　扩大窗口与完整见证图的有限层增长

现在引入 $0 < \eta < 1/40$、$\beta = 1 - \eta$，其值稍后才按维数固定。定义

$$A_i^\beta = Q(x_i, \beta r_i), \quad e_i^\beta = |A_i^\beta \setminus B|/r_i^n, \quad s_i = 1 - \frac{m_i}{ar_i^n}, \quad d_i = e_i^\beta + s_i.$$

由于 $\beta > 3/4$，有 $e_i^0 \le e_i^\beta$。族 (A_i^β) 仍满足 Besicovitch 分离，重数至多为 H。在近首项分支

$$M > a[1 - (n+1)v]|E| \tag{42}$$

上，(19) 给 $S/|E| = 1 + O_n(v)$。因此

$$\begin{aligned} &\sum_i e_i^\beta r_i^n \le H\left(\left|\bigcup_i Q_i\right| - S\right) \le H(|E| + aS - S) = O_n(vS), \\ &\sum_i s_i r_i^n = S - \frac{1}{a}\sum_i m_i \le 2(S - M/a) = O_n(vS), \qquad \sum_i d_i r_i^n \le C_n vS. \end{aligned} \tag{43}$$

这里的常数不依赖 η。

固定一个稍后选取的常数 $D \ge 1$。初始异常集为 $J_0 = \{i : d_i > Dv\}$，其余指标称为规则。定义完整见证图 $\mathcal{G}$：当 $Q_i \cap Q_j \neq \varnothing$ 时连边。这个图不要求有界度，也不要求任意两个异常邻盒尺度可比。

引理 3.7 (完整见证图的有限层增长)**.** 对于固定 n, D, η，小 v 时每个规则指标满足：对任意 $x \in Q_i$，存在 $y \in B_p$，使

$$\|x - y\|_\infty \le 3\eta r_i, \qquad |r_p - r_i| \le \eta r_i. \tag{44}$$

两个相邻规则指标有

$$|r_i - r_j| \le 7\eta(r_i + r_j), \qquad \max(r_i/r_j, r_j/r_i) \le e^{20\eta}. \tag{45}$$

若仅 j 规则而 i 任意，仍有单向界 $r_j \le 3r_i$。给定整数 $K_0 \ge 1$，若 $20\eta(K_0+1) \le 1/4$，则对 $J_k = \{i : \mathrm{dist}_{\mathcal{G}}(i, J_0) \le k\}$，有

$$S(J_k) := \sum_{i \in J_k} r_i^n \le C_1(n)(k+1)^n S(J_0), \quad 0 \le k \le K_0 + 1, \qquad C_1(n) = 20^n. \tag{46}$$

证明. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$。若 $j \neq i$ 且 B_j 与 A_i^β 相遇，则 $\max(1, r_j) < 1 - \eta + r_j/2$，所以 $2\eta < r_j < 2$。这些原半盒连同自身都在固定有界盒中，每个体积至少为 $(2\eta)^n$，数目至多为某个 $N_{n,\eta} < \infty$。取 $h < \min\{\eta/2, \eta/(8N_{n,\eta})\}$，并令 $T = Q(0, 1-2\eta)$。当 $Dv < (2h)^n$ 时，每个 T 点距 B 不超过 h，否则其 h 盒在 $A_i^\beta \setminus B$ 内。与 T 相遇的增厚盒的原盒仍与 A_i^β 相交；它们在 T 上形成有限连通闭覆盖，含自身指标。每条增厚相交边的半径差小于 $4h$，沿至多 $N_{n,\eta} - 1$ 条边，所有相关半径与一相差小于 η。把任意 $x \in Q_i$ 截断到 T 移动至多 2η，再移动至相应半盒至多 h，得到 (44)。

对两个规则盒的公共点 x，分别用该覆盖找到 $y \in B_p, z \in B_q$。若 $p = q$，其半径差为零；否则分离性给 $\mathrm{dist}_\infty(B_p, B_q) \ge |r_p - r_q|/2$。因此

$$|r_p - r_q| \le 6\eta(r_i + r_j), \qquad |r_i - r_j| \le 7\eta(r_i + r_j).$$

半径比至多为 $(1+7\eta)/(1-7\eta) \le e^{20\eta}$，后一式可由 $\log[(1+7\eta)/(1-7\eta)]$ 在 $(0, 1/40)$ 上的导数小于二十得到。若只有 j 规则，仍在公共点用 j 的覆盖。若所获半盒 $p = i$，则 $r_i \ge (1-\eta)r_j$。否则

$$r_p < \|x_i - x_p\|_\infty \le r_i + 3\eta r_j + r_p/2, \qquad r_p \ge (1-\eta)r_j,$$

故 $r_j < 2r_i/(1-7\eta) < 3r_i$。

取通往 J_k 中某点的最短路，并以其中最近的异常顶点为根。第一步之后的顶点全规则，否则会有更近的异常根。由单向混合边界及 (45)，沿路半径至多为 $3e^{20\eta(K_0+1)} r_{\mathrm{root}} < 4r_{\mathrm{root}}$。每步中心距离至多为 $8r_{\mathrm{root}}$，故终点原半盒包含于 $Q(x_{\mathrm{root}}, 10(k+1)r_{\mathrm{root}})$。对每个异常根用半盒不交性计数，再对根求和，允许不同根重复计数，就得到 (46)。这只涉及有限的 K_0+1 层。 □

3.7 小半径所用的局部格子计数

引理 3.8 (局部 dyadic 计数)**.** 设轴平行盒 $\mathcal{R}$ 的各边长介于 cL 与 CL，其中 $0<c\le C$、$L>0$。固定 $A>0$，设可测集 $T\subset\mathcal{R}\setminus E$、$\mathcal{S}\subset T$，且每个 $x\in\mathcal{S}$ 都有一个原严格见证 $Q(x,r)$，满足 $r\le AL$。当 $a=2^n t$ 充分小时，

$$|\mathcal{S}|\le C_{n,c,C,A}\,a\,|\mathcal{R}\setminus T|. \tag{47}$$

证明. 将 $\mathcal{R}$ 的各边同时二分，得到一个固定、可数的 dyadic 盒网格。设原盒的最大边长为 $\ell_{\max}$。若 $r\le\ell_{\max}$，取最小 $k\ge 0$ 使 $2^{-k}\ell_{\max}\le r$，并选第 k 层含 x 的格子 P。它的各边至多为 r，故 $P\subset\mathcal{R}\cap Q(x,r)$；各边又至少为 $cr/(2C)$。若 $r>\ell_{\max}$，直接取 $P=\mathcal{R}$，由 $r\le AL$ 有 $|P|\ge(c/A)^n r^n$。因此两种情形均有

$$P\subset\mathcal{R}\cap Q(x,r),\qquad |P|\ge\beta r^n,\quad \beta=\min\{(c/(2C))^n,(c/A)^n\}>0.$$

所有格子边界的并为零测集，可以统一排除。令 $D=\mathcal{R}\setminus T$，由严格见证及 $T\subset E^c$，上述格子满足

$$|P\setminus D|=|P\cap T|\le|Q(x,r)\setminus E|<ar^n\le(a/\beta)|P|.$$

取 $\eta=a/\beta<1/2$。所有 D 占比严格大于 $1-\eta$ 的格子中，按包含关系取最大者。每格到根盒只有有限个祖格，故最大格子覆盖全部高密度格；它们两两不交至边界。记其并为 H，则

$$|H\setminus D|\le\eta|H|\le\frac{\eta}{1-\eta}|D|.$$

而 $\mathcal{S}\subset H\setminus D$ 至零测集，得到所需估计。$|D|=0$ 时同样给出 $|\mathcal{S}|=0$。全部常数与源点、半径及输入无关。 □

3.8 未删除源、小半径与环境额外缺陷

令 $I\supset J_0$ 为任一标记集，记

$$K'=K\setminus\bigcup_{i\in I}Q_i,\quad M'=|K'|,\quad M_I=M-M',\qquad \partial I=\{j\notin I:\exists i\in I,\,Q_i\cap Q_j\neq\varnothing\}.$$

对任意指标集 U 写 $S(U)=\sum_{i\in U}r_i^n$、$P(U)=\sum_{i\in U}d_i r_i^n$。所有外部指标满足 $d_j\le Dv$，原私有 P_j 全部保留在 K'，故

$$(1-Dv)aS(I^c)\le M'\le aS(I^c). \tag{48}$$

若 I^c 为空，取下面外部并集及 M' 为零，不定义空源的 CDF。

记外部深处指标为 $\mathcal{T}=I^c\setminus\partial I$。下面固定任一种满足引理 3.4 条件的外部源、目标选择，目标覆盖 K'。除有效源 F_i 外，记录删除前的源 T_i，满足

$$T_i\subset G_i\subset K'\cap Q_i,\qquad T_i\cap G_j=\varnothing\ (i\neq j),\qquad T_i\subset Q(x_i,Avr_i). \tag{49}$$

每个 T_i 点仍使用原指定严格见证 $r(x)$。给定固定 $0<\tau_i\le A$，记

$$\mathcal{S}_i=\{x\in T_i:r(x)<\tau_i v r_i\},\quad F_i=T_i\setminus\mathcal{S}_i,\quad m_i^0=|T_i|,\quad \delta_i=|\mathcal{S}_i|,\quad \mu_i=m_i^0-\delta_i. \tag{50}$$

未删除源两两不交，且 $m_i^0 \geq (1-Av)ar_i^n$；有效源满足前面的完整大见证条件。第一深度取 $T_i = P_i$，其余深度在边界取 P_i，在深处取相应中心邻域，具体构造在后面给出。参数 A 统一支配固定的 D 和全部所需定位常数；先选定它及有限深度，再选强斜率 λ_0，最后令 v 足够小。对每个 $i \in \mathcal{T}$ 及每个轴向、符号，取引理 3.5 给出的面邻居 p。它必在外部，因为 Q_i 不与任何标记方体相交。

引理 3.9 (未使用的 CDF 面缝)**.** 在原共享面块 T_{ip} 上，于 X_i, X_p 的两个面对端之间作开条 Z_{ip}。则

$$Z_{ip} \subset A_i^0 \subset Q_i, \qquad |Z_{ip}| = 8^{1-n}\Gamma_{ip} r_i^{n-1}, \qquad Z_{ip} \cap \bigcup_{j \notin I} X_j = \varnothing, \tag{51}$$

$$\left| \bigcup_{i \in \mathcal{T}, q, \pm} Z_{ip} \right| \geq c_n' \mathcal{F}, \qquad \mathcal{F} = \sum_{i \in \mathcal{T}, q, \pm} \Gamma_{ip} r_i^{n-1}, \tag{52}$$

其中 $c_n' > 0$ 纯粹依赖维数。所有这些条也不碰任何标记 Q_j。

证明. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$，面方向为正 q 轴。CDF 端点相对原半盒端的移动为 $O_{n,A}(v)$，而 (38) 给原面缝及半径差 $O_{n,D}(v)$。故对 $z \in Z_{ip}$，

$$z_q = 1/2 + O_{n,A,D}(v), \qquad |z_l| \leq 1/2 - 1/16 \quad (l \neq q).$$

它不属于 X_i, X_p，因为法向严格位于两面对端之间。若 $z \in X_k$，其中 $k \neq i, p$ 为外部指标，由 $X_k \subset Q(x_k, (1/2 + Av)r_k)$ 及中心分离，

$$\max(1, r_k) < 1/2 + C_{n,A,D} v + (1/2 + Av) r_k.$$

分别按 $r_k \leq 1$ 和 $r_k \geq 1$ 整理，得到 $r_k = 1 + O_{n,A,D}(v)$。切向中心距至多为 $1 - 1/16 + O_{n,A,D}(v)$，不足以实现分离；负法向也不可能。因此 $x_{k,q} > \max(1, r_k)$，原 B_k 左法向端大于 $1/2$。

由 CDF 端点相对原半盒的移动界，原 B_k 的每个切向投影距 z_l 至多为 $O_{n,A}(v)$。面块到 B_p 切向边界的固定裕量使 B_k, B_p 在所有切向有正交长，故法向必须分离。若 B_k 在 B_p 左侧，其右端不超过 $1/2 + O(v)$，但它从大于 $1/2$ 的左端开始、边长约为一，矛盾。若 B_k 在 B_p 右侧，其左端至少为 $3/2 + O(v)$，而 X_k 只能从该端移动 $O(v)$，不可能包含法向约为 $1/2$ 的 z。这排除了所有外部 X_k。

条的法向约为 $1/2$，切向在原半盒内，故 $Z_{ip} \subset A_i^0$。每个源指标最多有 $2n$ 条，A_i^0 的重数至多为 H，所以全体条的重数至多为 $2nH$。体积公式即给 (52)，例如可取 $c_n' = 1/(2nH8^{n-1})$。最后 $i \in \mathcal{T}$ 的整个 Q_i 都不碰标记方体，故其条也不碰标记区域。 □

引理 3.10 (小半径源质量的回收)**.** 对外部深处指标，

$$\frac{v}{a}\delta_i \leq C_{n,A} \left[v^2 \varepsilon_i r_i^n + v \sum_{q,\pm} \Gamma_{ip} r_i^{n-1} \right]. \tag{53}$$

边界指标则满足

$$\frac{v}{a} \sum_{i \in \partial I} \delta_i \leq C_{n,A} v^n P(\partial I) \leq C_{n,A} v P(\partial I). \tag{54}$$

证明. 固定 $i \in \mathcal{T}$。每个负面方向的入向邻居记为 p，令 $\gamma_{il}^{-} = g_{p\to i}$；正面方向同样令 $\gamma_{il}^{+} = g_{p\to i}$，按反射后的方向解释。构造扩展盒

$$\mathcal{R}_i = x_i + \prod_l [\min\{\ell_{il}^0, \ell'_{il} - \gamma_{il}^{-}\}, \max\{h_{il}^0, h'_{il} + \gamma_{il}^{+}\}].$$

它包含有效源原始投影盒，每条边仍可比于 vr_i；各侧扩张至多为相应 γ，且 $\gamma_{il}^{\pm} \le 2\Gamma_{ip}$。

先估计盒外部分。以左面为例，在入向邻居 p 的有效源中取坐标趋近原始面对端的点，距端深度为 $d \downarrow 0$。由 (41)，该点的实际半径增量至多为 $2(\gamma_{il}^{-} + d)$。其见证至少伸到目标截面

$$x_{i,l} + \ell'_{il} - \gamma_{il}^{-} - d,$$

因为实际半径大于 R_p。全部 T_i 点在法向与该源同序，切向有面邻居的固定裕量，且 $T_i \cap G_p = \varnothing$。所以该截面外侧的全部小源质量都可与 G_p 相加，真实剩余容量至多为 $C_n a r_i^{n-1}(\gamma_{il}^{-} + d)$。令 $d \downarrow 0$，半空间质量的连续性给

$$|\mathcal{S}_i \cap \{x_l - x_{i,l} \le \ell'_{il} - \gamma_{il}^{-}\}| \le C_n a r_i^{n-1} \gamma_{il}^{-}. \tag{55}$$

这里用的是同一个原指定源见证；不要求端点取到或严格余量统一为正。右面反射同理。每个盒外小源点至少违反一个上述截面，故其总量至多为 $C_n a r_i^{n-1} \sum_{l,\pm} \gamma_{il}^{\pm}$。

再令 $D_i = \mathcal{R}_i \setminus T_i$。对 $x \in \mathcal{S}_i \cap \mathcal{R}_i$，其原指定半径满足 $r(x) < \tau_i v r_i \le A v r_i$。在引理 3.8 中取 $L = v r_i$、$T = T_i \cap \mathcal{R}_i$ 及 $\mathcal{S} = \mathcal{S}_i \cap \mathcal{R}_i$，固定全部盒长常数后令 v 足够小，得到

$$|\mathcal{S}_i \cap \mathcal{R}_i| \le C_{n,A} a |D_i| \le C_{n,A} v |D_i|,$$

其中最后一步用 $a = v^n \le v$。零测 D_i 亦由同一估计处理。又 $T_i \supset F_i$，由 (28) 及盒的扩张体积，

$$|D_i| \le C_{n,A} \varepsilon_i \mu_i + C_{n,A} (v r_i)^{n-1} \sum_{l,\pm} \gamma_{il}^{\pm}.$$

与盒外估计合并，再用 $\mu_i \asymp a r_i^n$、$a = v^n$ 和 $\gamma \le 2\Gamma$，即得 (53)。

边界只用粗局部估计：每个小源见证包含于 $Q(x_i, 3Avr_i)$。

同一见证对局部输入 $E \cap Q(x_i, 3Avr_i)$ 仍成立。该输入为零测时小源为空；否则原外部水平集估计给 $\delta_i \le C_{n,A} a v^n r_i^n$。原私有定位和规则性给

$$\tfrac{1}{2} v^n r_i^n \le m_i \le (2c e_i^0 r_i)^n, \qquad d_i \ge e_i^0 \ge c''_n v, \tag{56}$$

其中 $c''_n > 0$ 纯粹依赖维数。求和得到 (54)。 □

引理 3.11 (共同可见的环境额外缺陷)**.** 定义按源指标附着的集合

$$Y_i = X_i \cup \bigcup_{q,\pm} Z_{ip} \quad (i \in \mathcal{T}), \qquad Y_i = X_i \quad (i \in \partial I), \qquad U^{+} = \bigcup_i Y_i,$$

并令 $u_i = |(Y_i \setminus E) \setminus G_i|$。则

$$Y_i \subset Q(x, R_i) \quad \text{对每个} x \in F_i, \qquad \sum_{i\in\mathcal{T}} u_i \le C_{n,A} a \mathcal{F}, \qquad \sum_{i\in\partial I} u_i \le C_{n,A} a P(\partial I), \tag{57}$$

$$|U^{+} \setminus E| \le M' + \mathcal{D} + \sum_i u_i, \qquad \mathcal{D} = \sum_i g_i - M'. \tag{58}$$

证明. 对每个有效源 x，其到 X_i 任一点的距离至多为 $R_i/2 + 2Avr_i < R_i$。附着面条全部在 $Q(x_i, (1/2 + C_{n,A}v)r_i)$ 内，而 $R_i \ge (1 - Av)r_i$，故统一小 v 时它们也在每个 $Q(x, R_i)$ 内。所以每个原实际见证都同时包含 G_i 和 $(Y_i \setminus E) \setminus G_i$，二者不交，于是

$$u_i < a[r(x)^n - R_i^n] \le C_n a r_i^{n-1}[r(x) - R_i].$$

在深处沿任一面方向取有效源坐标趋近原始面对端。由 (41)，实际增量上界趋于至多 $2g_{i\to p}$，故固定的 u_i 满足 $u_i \le C_n a r_i^{n-1} g_{i\to p} \le C_n a r_i^{n-1}\Gamma_{ip}$。逼近序列由有效源点组成，端点不必取到，极限仅把严格预算变成非严格上界。边界任一有效源给 $u_i \le C_{n,A} a v r_i^n$，再用 $d_i \ge c_n'' v$ 求和。最后按各 Y_i 的补集部分相加，

$$|U^+ \setminus E| \le \sum_i (|G_i \cap Y_i| + u_i) \le \sum_i g_i + \sum_i u_i,$$

得到 (58)；这里允许目标或附着集合重复计数。 □

引理 3.12 (角部补偿与校正后的单层体积)**.** 对上述一层外部源、目标，增广并集 U^+ 包含于 $\bigcup_{i\notin I} Q_i$，且满足

$$\begin{aligned} |U^+| - \mathcal{D} - \sum_i u_i \ge A_v M'/a + \mathcal{D}/(2a) - C_{n,A}(v/a)\mathfrak{d}^0 \\ - C_{n,A} v^6 S - C_{n,A} v P(\partial I), \\ \mathcal{D} = \sum_{i\notin I} g_i - M', \qquad \mathfrak{d}^0 = M' - \sum_{i\notin I} m_i^0. \end{aligned} \tag{59}$$

两个缺失量都非负，且 $\mathfrak{d}^0$ 不包括已删除的小源。

证明. 先考虑两个都在外部深处的正体积相交对。设有 $q \ge 2$ 个临界轴，其交长为 L_l。可取 $R_i \ge R_j$，并按各轴分别反射，使源 i 在目标 j 左侧。记

$$\ell_l = L_l/(vr_i), \qquad B_{ij} = \prod_{l=1}^{q} \ell_l, \qquad \zeta_q = \frac{q}{2q-1}.$$

原始面对端距至多为 $R_i - L_l$。取固定小 $\theta > 0$，使 θL_l 小于源原始该边长的一半。对原始源盒中满足所有临界深度 $0 \le \delta_l \le \theta L_l$ 的任意源点，其同一个实际见证至少包含目标原始角条各厚

$$t_l = \min\{(1-\theta)L_l, w_{j,l}^0\} \ge \gamma_{n,A} L_l \tag{60}$$

的部分，其他方向完整保留。最后一个统一下界来自 $L_l \le C_{n,A} v r_i$ 及 $w_{j,l}^0 \ge c_{n,A} v r_i$，可取 $\gamma_{n,A} = \min\{1-\theta, c_{n,A}/C_{n,A}\} > 0$。在临界轴，面对距离加源深度和目标截断深度不超过 $R_i \le r(x)$；非临界轴使用整个原始投影盒的切向余量。因此这是同一个源点的同一个见证所捕获的整块目标角条，没有假设交长小于目标原始宽度。

由 (28)，该角条中的目标源质量至少为 $\mu_j(c_{n,A}B_{ij} - C_{n,A}\varepsilon_j)$。若 $B_{ij} \le C_{n,A}\varepsilon_j$，所需收费已由目标盒盈余控制。否则每个属于 F_i 的上述源点都被实际剩余容量迫使满足

$$\sigma_i(x) := r(x) - R_i \ge c_{n,A} B_{ij} r_i. \tag{61}$$

这里用容量上界 $C_{n,A}ar_i^{n-1}\sigma_i(x)$ 及 $\mu_j \asymp ar_i^n$。

选 $\ell_a = \min_l \ell_l$，并取源 i 沿这个面对方向的真正面邻居 p。先固定足够小的 $c'_{n,A} > 0$。若 $g_{i\to p} > c'_{n,A}B_{ij}r_i$，则 $B_{ij} \le C_{n,A}\Gamma_{ip}/r_i$。否则取足够小的固定 $c''_{n,A} > 0$，由 (41)，整个原始源矩形

$$0 \le \delta_a \le \min\{\theta L_a, c''_{n,A}B_{ij}r_i\}, \qquad 0 \le \delta_l \le \theta L_l \quad (l \ne a \text{ 为临界轴}) \tag{62}$$

中都不能有 F_i 点，非临界坐标完整保留。确实，面余量和该点的面深度所给的 $\sigma_i(x)$ 上界会严格小于 (61)。这是对矩形内每个潜在源点的排除。矩形体积至少为

$$c_{n,A}\mu_i B_{ij}\min\{1, B_{ij}/(v\ell_a)\} \ge c_{n,A}\mu_i B_{ij}\min\{1, B_{ij}^{(q-1)/q}/v\},$$

其中用了 $\ell_a \le B_{ij}^{1/q}$。再用 (28)，分别按最小值是否取一反解，得到包括前面各分支的

$$B_{ij} \le C_{n,A}\left[\varepsilon_i + \varepsilon_j + \Gamma_{ip}/r_i + (v\varepsilon_i)^{\zeta_q}\right]. \tag{63}$$

交体积至多为 $C_{n,A}v^qB_{ij}r_i^n$。有界相交邻居数使每个面缝只被计费有限次。(63) 的线性盈余项给 $Cv^q(\varepsilon_i+\varepsilon_j)r_i^n$，在小 v 时由 (37) 的正项吸收；面缝项给 $Cv^q\Gamma_{ip}r_i^{n-1}$，由 (52) 的正回收吸收。非线性项逐项用

$$Cv^{q+\zeta_q}\varepsilon^{\zeta_q} \le bv\varepsilon + C_{n,A,b}v^{q/(1-\zeta_q)}, \qquad \frac{q}{1-\zeta_q} - 6 = \frac{(q-2)(2q-3)}{q-1} \ge 0.$$

将固定 $b > 0$ 取为单格正盈余系数除以足够大的邻居次数，全部方向同时吸收；最坏剩余为 $q = 2$ 的 $C_{n,A}v^6r_i^n$。

涉及外边界 ∂I 的对只用单源界 (36)。其盈余部分仍吸收，余量总计为 $C_{n,A}v^4S(\partial I)$。由 (56)，

$$v^4S(\partial I) \le C_nv^3P(\partial I). \tag{64}$$

单临界对由双向面容量没有正体积交叠。

在上述吸收中，先将单格盈余与面缝正回收各预留四份。线性交损相对其预算分别有因子 v 或 v^2，Young 中的固定 b 也可任意取小，所以角部仅需其中一份，代价是改变六阶余项常数。对 $\bigcup X_i$ 用二项 Bonferroni 下界，再加入与其不交的面条并集，仍可保留固定正比例预算：

$$\begin{aligned} |U^+| \ge{}& A_v\sum_i g_i/a - C_{n,A}(v/a)\sum_i(g_i-\mu_i) \\ &+ c_{n,A}v\mathcal{E} + c'_n\mathcal{F} - C_{n,A}v^6S - C_{n,A}v^3P(\partial I), \\ \mathcal{E} ={}& \sum_{i\notin I}\varepsilon_i r_i^n. \end{aligned} \tag{65}$$

这里的两个正系数取预留后较小的固定版本。写 $\Delta = \sum_i \delta_i$，有 $\sum_i(g_i-\mu_i) = \mathcal{D} + \mathfrak{d}^0 + \Delta$。引理 3.10 将深处的删除成本控制为 $C_{n,A}(v^2\mathcal{E} + v\mathcal{F})$，边界成本为 $C_{n,A}vP(\partial I)$。它们用各自另一份预算吸收。再从左侧扣除 $\sum_i u_i$：引理 3.11 的深处成本为 $C_{n,A}a\mathcal{F}$，边界成本为 $C_{n,A}aP(\partial I)$，其中 $a = v^n \le v$；这一项使用另行预留的预算。所有吸收先固定系数，再统一令 v 小，故同一正量没有重复支付。

最后扣除物理重复量 $\mathcal{D}$。其净系数为

$$\frac{A_v - C_{n,A}v - a}{a}\mathcal{D} \ge \frac{\mathcal{D}}{2a}.$$

未删除源两两不交，目标覆盖 K'，所以 $\mathfrak{d}^0, \mathcal{D} \geq 0$。丢弃其余非负预算即得 (59)；外部为空时所有源量取零。 □

引理 3.13 (五深度的未删除源与重复覆盖)**.** 固定 n, D, η。小 v 时可构造五层目标 $G_{i,h}$、未删除源 $T_{i,h}$ 和有效源 $F_{i,h}$，均满足前面的源、目标及小半径条件。目标覆盖 K'，未删除源与所有其他指标的同层目标不交，且

$$T_{i,1} = P_i, \qquad T_{i,h} = \begin{cases} P_i, & i \in \partial I, \\ N_{i,h-1}, & i \in \mathcal{T} \end{cases} \quad (h = 2, 3, 4, 5). \tag{66}$$

它们满足 (69) 和 (70)。全部五层边界 *CDF* 盒仍满足 $|X_{i,h} \setminus B_i| \leq C_2(n) e_i^{\beta} r_i^n$，系数纯粹依赖维数。

证明. 以下设外部非空；由 (48)，$M' > 0$。先说明任意固定深度 $H_* > 0$ 的收缩盒覆盖 K'。每个 K' 点先在某个外部规则 Q_i 中，再由引理 3.2 落入某个 $0.9Q_j$。返回指标只能在外部，否则该点会属于某个标记 Q_j。因此小 v 时

$$K' \subset \bigcup_{j \notin I} Q(x_j, (1 - H_* v) r_j). \tag{67}$$

将全部原半径统一乘 $1 - H_* v$，仍是分离族。对外部指标，其新 $3/4$ 盒的空隙量为 $O_{n,D,H_*}(v)$：原 A_i^0 只遇有界个尺度可比的原半盒，每个缩小损失 $O_n(H_* v) r_i^n$，而新 $3/4$ 盒包含于原盒。故引理 3.2 的私有定位也适用于整个收缩族。特别地，一个 K' 点若只有一个外部收缩盒覆盖，则它也不在任何标记收缩盒中，于是距该唯一中心为 $O_{n,D,H_*}(v r_i)$。

第一深度。取 $C_0 > cD + 1$。未删除源取 $T_{i,1} = P_i$，它在 $Q(x_i, C_0 v r_i)$ 内。删除指定半径小于 $2C_0 v r_i$ 的点，记所得源为 $F_{i,1}$。删除质量至多为 $C_{n,D} v^n a r_i^n$，来自局部输入 $E \cap Q(x_i, 3C_0 v r_i)$ 的外部水平集估计；零测局部输入对应空小半径集。余下源点的真实见证含整个 P_i，故半径大于 $(1 - Dv) r_i$，且由私有性不超过 r_i。取 $H_1 > D + C_0 + 1$，以

$$G_{i,1} = K' \cap Q(x_i, (1 - H_1 v) r_i)$$

为目标。每个保留源点的见证包含该目标，源也在目标内，且与其他目标不交。

由收缩族的定位，只有一个 $G_{i,1}$ 覆盖的点距其中心不超过 $C_1 v r_i$，其中 $C_1 = C_1(n, D, H_1)$。取固定 $L_1 > \max(C_0, C_1) + 1$，令

$$N_{i,1} = K' \cap Q(x_i, L_1 v r_i), \qquad f_1 = M' - \sum_{i \notin I} |N_{i,1}|.$$

小 v 时这些中心邻域两两不交，并包含原 P_i，故 $f_1 \geq 0$。在这些邻域之外的全部 f_1 质量至少被两个第一深目标覆盖。因此

$$\mathcal{D}_1 := \sum_{i \notin I} |G_{i,1}| - M' \geq f_1. \tag{68}$$

其余四个深度。递归地，在已有 L_{h-1} 后取 $H_h > L_{h-1} + D + 1$，其中 $h = 2, 3, 4, 5$，并定义

$$G_{i,h} = K' \cap Q(x_i, (1 - H_h v) r_i).$$

暂以 $T_{i,h} = N_{i,h-1}$ 为未删除源，删除指定半径小于 $2L_{h-1}vr_i$ 的点。每格删除质量至多为 $C_{n,D}v^n a r_i^n$，来自局部输入 $E \cap Q(x_i, 3L_{h-1}vr_i)$ 的外部水平集估计，仍包括零测输入的空集情形。保留点的见证包含整个 $N_{i,h-1} \supset P_i$，所以半径大于 $(1-Dv)r_i$。捕获性质给某个外部原 Q_j 覆盖该点且 $r_j \geq r(x)$。若 $r_j > r_i$，由引理 3.3，$r_j - r_i \leq C_n e_j^0 r_j$，故 $r_j \leq (1 + C_{n,D}v)r_i$；若 $r_j \leq r_i$，上界直接成立。因此每个保留源点满足

$$(1 - Dv)r_i < r(x) \leq (1 + C_{n,D}v)r_i.$$

由 $H_h > L_{h-1} + D + 1$，该见证包含自身整个深目标。对 $x \in N_{i,h-1}$、$j \neq i$，中心分离给

$$\|x - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j) - L_{h-1}vr_i \geq (1 - L_{h-1}v)r_j,$$

故整个未删除源 $N_{i,h-1}$ 与所有其他同层目标不交。

在 $i \in \partial I$ 时，该层仍以同一阈值 $2L_{h-1}vr_i$ 删除小半径点，但未删除源改为 $T_{i,h} = P_i$，目标不变。由于 $P_i \subset N_{i,h-1}$，其保留见证仍包含整个 $N_{i,h-1}$ 及自身目标，半径还有更强的上界 $r(x) \leq r_i$。边界原私有源与所有其他目标不交，非边界源由上式控制，所以边界–非边界两个方向均满足面容量引理的量词。

在固定 H_h 后，再由该收缩族的唯一覆盖点定位选取 $L_h > L_{h-1} + 1$，并设

$$N_{i,h} = K' \cap Q(x_i, L_h v r_i), \qquad f_h = M' - \sum_{i \notin I} |N_{i,h}|.$$

全部五个深度的常数先固定，再统一令 v 足够小，便使每层中心邻域两两不交，且整个未删除源也在自身深目标内。所有目标覆盖 K'，唯一覆盖点均在相应中心邻域内，故

$$f_h \geq 0, \qquad \mathcal{D}_h := \sum_{i \notin I} |G_{i,h}| - M' \geq f_h \quad (h = 1, 2, 3, 4, 5). \tag{69}$$

有限五次递归没有循环依赖或增长层数的阈值。

记 $m_{i,h}^0 = |T_{i,h}|$、$\mu_{i,h} = |F_{i,h}|$，以及 $\mathfrak{d}_h^0 = M' - \sum_{i \notin I} m_{i,h}^0$。未删除源与所有其他目标不交且包含于自身目标，故它们两两不交，$\mathfrak{d}_h^0 \geq 0$。有效源的粗删除界只用于保证 $\mu_{i,h} \geq (1 - C_{n,D}v)a r_i^n$，不计入最终缺失量。先完成五层有限常数递归并统一 $A = A(n, D)$，再选择同一个强斜率 λ_0，最后统一取小 v，不改变原指定见证。由原私有质量下界及未删除源的定义，

$$0 \leq \mathfrak{d}_1^0 \leq A_0 v M', \qquad 0 \leq \mathfrak{d}_h^0 \leq f_{h-1} + aP(\partial I) \quad (h = 2, 3, 4, 5). \tag{70}$$

其中 A_0 固定；边界改源的附加量为

$$|N_{i,h-1}| - |P_i| \leq |K \cap Q_i| - m_i \leq a s_i r_i^n.$$

小半径删除质量已由引理 3.10 单独回收，所以这里没有全域的 $v^n M'$ 误差。全部五层边界有效源都在原私有簇内，CDF 端点仍在源原始投影范围内，故纯维数突出价格 (25) 同时成立。 □

3.9　精确环境记账与内部容量回收

引理 3.14 (以 $|E|+M$ 为左侧的回收)**.** 令

$$c_n=\frac{1}{2H},\qquad C_{*,0}=2C_2(n)+2,\qquad C_*=C_{*,0}+2.$$

对任意 $I\supset J_0$，固定全部参数后取足够小 v，有

$$|E|+M\ge A_vM/a+c_nP(I)-C_*P(\partial I)-2nvS(I)-C_{n,D,\eta}v^6S. \tag{71}$$

这里的正回收、两种边界价格及内部体积价格均在 D、有限深度和 λ_0 之前固定为纯维数常数。

证明. 先固定一个深度 h，写其增广并集为 U_h^+，重复目标量为 $\mathcal{D}_h$，局部额外缺陷为 $u_{i,h}$。将内部半盒和标记空隙

$$Z_I=\Big(\bigcup_{i\in I}A_i^{\beta}\Big)\setminus B,\qquad |Z_I|\ge H^{-1}\sum_{i\in I}e_i^{\beta}r_i^n$$

加入，记 $W_h=U_h^+\cup\bigcup_{i\in I}B_i\cup Z_I$。外部深处的增广面条与全部标记 Q 不交。其余内部交叠只能来自边界 $X_{j,h}\setminus B_j$，因为原半盒不交，且所有 $X_{j,h}\subset Q_j$。两次使用纯维数突出价格得到

$$|W_h|\ge|U_h^+|+S(I)+H^{-1}\sum_{i\in I}e_i^{\beta}r_i^n-2C_2(n)P(\partial I). \tag{72}$$

另一方面，(58) 以及标记原方体的缺陷预算给出同一个真实并集的上界

$$|W_h|\le|E|+M'+\mathcal{D}_h+\sum_i u_{i,h}+aS(I). \tag{73}$$

这里的 E 只计一次；补集部分允许重复计数。

令 $T_\times=K\cap(\bigcup_{i\in I}Q_i)\cap(\bigcup_{j\notin I}Q_j)$。在内部覆盖的 M_I 质量上，原私有点计一次；非私有且不在交界的点内部重数至少为二；交界点至少计一次。因此

$$aS(I)\ge\sum_{i\in I}|K\cap Q_i|\ge 2M_I-\sum_{i\in I}m_i-|T_\times|,$$

从而

$$S(I)-M_I/a\ge\tfrac12\sum_{i\in I}s_ir_i^n-|T_\times|/(2a). \tag{74}$$

每个交界点属于某个外边界 Q_j，且不在其原私有 P_j 中，故

$$|T_\times|\le\sum_{j\in\partial I}(|K\cap Q_j|-m_j)\le a\sum_{j\in\partial I}s_jr_j^n\le aP(\partial I). \tag{75}$$

还有 $M_I/a\le S(I)$。

把校正后的单层界 (59) 代入 (72)–(73)，并用 $M=M'+M_I$。内部余量恰为

$$(1-a)S(I)+M_I-A_vM_I/a=(1-a)(S(I)-M_I/a)-(A_v-1)M_I/a. \tag{76}$$

这是精确恒等式，没有把 aS 近似为 M。在 $a<1/2$、$A_v-1\le 2nv$ 时，(74)–(75) 以及 $H^{-1}\sum_I e_i^{\beta}r_i^n$ 共同提供至少 $c_nP(I)$ 的正回收，内部额外价格至多为 $2nvS(I)$。先固定所有

参数，再令单层边界的 $C_{n,A}v$ 系数不超过一，其与 $2C_2(n)$ 及共享质量的 $1/2$ 价格都包含于 $C_{*,0}$。于是每层有

$$\begin{aligned}|E|+M \ge A_v M/a + c_n P(I) - C_{*,0}P(\partial I) - 2nvS(I)\\ + \mathcal{D}_h/(2a) - C_{n,A}(v/a)\mathfrak{d}_h^0 - C_{n,A}v^6 S.\end{aligned} \tag{77}$$

现在所有深度共用同一个左侧。定义

$$Z = a\big[|E|+M-A_vM/a-c_nP(I)+C_{*,0}P(\partial I)+2nvS(I)\big], \qquad f_0 = A_0 v M'.$$

由 (69)、(70) 及 (77)，存在固定 $c_0>0, b_0<\infty$，使

$$Z \ge c_0 f_h - b_0 v f_{h-1} - R, \qquad R = C_{n,D}a\{v^6S + vP(\partial I)\}, \qquad 1\le h\le 5. \tag{78}$$

这里没有删除质量的全域误差；它已在同一个单层并集上回收。

令 $\tau = b_0 v/c_0$，依次乘 $\tau^4,\tau^3,\tau^2,\tau,1$ 并相加，得到

$$(1+\tau+\tau^2+\tau^3+\tau^4)Z \ge c_0 f_5 - b_0 v\tau^4 f_0 - (1+\tau+\tau^2+\tau^3+\tau^4)R. \tag{79}$$

中间 $f_1,\dots,f_4$ 项精确消去；$f_5\ge 0$，端点亏损为 $O_{n,D}(v^6M') \le O_{n,D}(av^6S)$。除以权重和及 a，得到 (71)，其中新增边界价格为 $C_{n,D}vP(\partial I)$。再统一取小 v 使其系数不超过一，放入 $C_* - C_{*,0} = 2$ 的独立预留部分。外部为空时全部源量取零，同样由内部计数成立，不需定义空 CDF。 □

3.10 加权选层、常数顺序与全部输入

命题 3.15 (六阶粗余项)**.** 对每个固定 $n\ge 2$，有 $0\le C_n(1-t)-L_n(t)\le C_n a v^6$，其中 $a = 2^n t = v^n$，常数及起效阈值只依赖固定维数。

证明. 先固定引理 3.14 中的纯维数常数 c_n, C_* 及 $C_1(n)=20^n$，令 $\alpha = c_n/(4C_*)$。选择只依赖 n 的整数 $K_0\ge 1$，使

$$(1+\alpha)^{K_0} > 1 + C_1(n)(K_0+1)^n. \tag{80}$$

这样的整数存在，因为固定正 α 的指数增长超过该多项式。随后选 $\eta = 1/[1000(K_0+1)]$，使 $20\eta(K_0+1)\le 1/4$，再选固定

$$D \ge \max\{1, 16nC_1(n)(K_0+1)^n/c_n\}.$$

在固定 D 后完成五深度源、目标和定位常数，统一 A，再取正的强 CDF 斜率常数 λ_0。最后才令 v 小于全部依赖 n, D, η, A, λ_0 的阈值，包括扩大窗口覆盖、全部源点的面对容量、面缝排他与角部禁区，以及外部边界价格的 $C_{n,D}v\le 1$。因此这些阈值和最终余项常数都只依赖固定维数。

取任意 E, K。先在 (42) 的分支中工作。若 $J_0=\varnothing$，在 (71) 中取 $I=\varnothing$ 即可。否则 $P(J_0) > DvS(J_0) > 0$。完整图的新层指标都规则，故由引理 3.7，

$$P(J_k) \le P(J_0) + DvS(J_k) \le [1 + C_1(n)(k+1)^n]P(J_0), \qquad 0\le k\le K_0.$$

如果每个 $k=0,\dots,K_0-1$ 都满足 $P(J_{k+1})>(1+\alpha)P(J_k)$，就与 (80) 矛盾。因此可取某层 $I=J_k$，使

$$P(\partial I)=P(J_{k+1})-P(J_k)\le \alpha P(I). \tag{81}$$

同时

$$2nvS(I)\le 2nC_1(n)(K_0+1)^n vS(J_0)\le \frac{c_n}{4}P(I).$$

边界项也至多为 $c_nP(I)/4$。在 (71) 中至少保留 $c_nP(I)/2$ 的正回收，将其丢弃便得到对两个异常分支统一成立的

$$|E|+M\ge A_vM/a-C_nv^6S. \tag{82}$$

在近首项分支中，$M/a\le S\le |E|/(1-a)$ 及 $M>a[1-(n+1)v]|E|$ 给 $S\asymp_n M/a$。从左侧直接移去实际的 M，得到

$$|E|\ge \frac{M}{a}[A_v-a-C_nv^6].$$

括号在小 v 时为正且远离零，取倒数得到

$$1+\frac{M}{|E|}\le \left[1-\frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1}+C_nav^6. \tag{83}$$

若不在近首项分支，则 $M/|E|\le a-(n+1)av$，而 $a/(A_v-a)=a-nav+O_n(av^2+a^2)\ge a-nav-C_nav^2$。小 v 时后者严格大于 $a-(n+1)av$，故也满足 (83)。

所有常数及起效阈值独立于 E,K 和有限选族。外部严格水平集可测且有限测度，故可用紧集内逼近。中间的 K' 只需可测；它是对原半径和原捕获性质的限制，没有重新选择半径。Lebesgue 密度定理给 $|E\setminus \mathcal{H}_n(1-t;E)|=0$。因此先对紧集 K 内逼近，再对全部有限正测度 E 取上确界，得到

$$C_n(1-t)\le \left[1-\frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1}+C_nav^6.$$

命题 3.1 的有限截断周期孔给相反方向的无误差下界。最终

$$0\le C_n(1-t)-\left[1-\frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1}\le C_nav^6,\qquad a=2^nt,\quad v=2t^{1/n}.$$

最后得到全部固定维数统一的

$$C_n(1-t)=L_n(t)+O_n(t^{1+6/n}),\qquad n\ge 2.$$

□

3.11　临界族的六层先验

粗余项估计把需要保留的角部交量限制在 v^6S 尺度。为确定其系数，下面保留整个源盒的体积盈余，对同向的全部目标先相加再积分，并用原半盒的局部铺砌极限计算余维二接触数。所得局部领先价将在后文的有限层共同估计中使用。

沿用前节的 $H=2^n$、$a=v^n$、$A_v=(1+v)^n$，并记

$$K_n=\binom{n}{2}\frac{n^2}{27}.$$

只须考虑任意满足下式的输入序列：

$$v\downarrow 0,\qquad V=|E|>0,\qquad K\subset\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E\ \text{紧},\qquad \frac{M}{V}\geq\frac{a}{A_v-a}-Bav^6,\quad M=|K|, \tag{84}$$

其中 $B<\infty$ 固定。以下小量均沿任意这样的序列成立；其收敛模量允许依赖序列。带下标 σ 的小量先固定 $0<\sigma<1/4$，再令 $v\to 0$。所有 O 常数只依赖所注明的固定参数，不依赖输入、指标数或半径尺度。

仍用引理 2.4 的原严格见证 $r(x)$ 和同一有限选族。标记集 I、外边界 ∂I、K'、M'、M_I 均按前节定义；写

$$P_I=P(I),\quad P_\partial=P(\partial I),\quad S_I=S(I).$$

将引理 3.13 的有限递归执行到六层。同层未删除源、有效源、目标记为 $T_{i,h},F_{i,h},G_{i,h}$，质量分别为 $m^0_{i,h},\mu_{i,h},g_{i,h}$，并设

$$\delta^{\mathrm{mass}}_{i,h}=m^0_{i,h}-\mu_{i,h},\quad \Delta^{\mathrm{mass}}_h=\sum_i\delta^{\mathrm{mass}}_{i,h},\quad \mathcal{D}_h=\sum_i g_{i,h}-M',\quad \mathfrak{d}^0_h=M'-\sum_i m^0_{i,h}.$$

所有这些和只取外部指标。恒有

$$\sum_i(g_{i,h}-\mu_{i,h})=\mathcal{D}_h+\mathfrak{d}^0_h+\Delta^{\mathrm{mass}}_h. \tag{85}$$

各层使用同一个 I,K' 和原指定见证。外部为空时全部源量取零，不定义空源的 CDF。

在第六层暂略去层下标。记 W^0_i,W'_i,W_i 为原始端盒、有效端盒和中点端盒，Δ^{end}_i 为有效端总移距，

$$\varepsilon_i=\frac{|W_i|}{\mu_i}-1,\qquad b_i=|W_i|^{1/n},\qquad \mathfrak{q}_i=\sum_{l=1}^{n}\left(\log\frac{w_{il}}{b_i}\right)^2,$$

其中 w_{il} 是 W_i 的第 l 边长。对每个深处指标，仍取引理 3.5 的各向面邻居，并写

$$\alpha_i=\max_{l,\pm}\frac{g_{i\to p(l,\pm)}}{r_i}.$$

还需要全部固定切向裕量的近面。固定 $0<\tau<1/100$，称有向对 $(i,p,l,+)$ 为稳健近面，若 i 深处、p 外部，

$$\frac{7}{8}r_i\leq r_p\leq\frac{9}{8}r_i,\qquad 0\leq b_{ip}:=x_{p,l}-x_{i,l}-\frac{r_i+r_p}{2}\leq\frac{1}{8}r_i,$$

且每个切向半盒投影交长至少为 τr_i。负面反射定义；其两向 CDF 余量及 Γ_{ip} 按 (39)–(40) 定义。令 $\mathscr{E}_\tau$ 为这些有向对，$\mathcal{F}_\tau=\sum_{\mathscr{E}_\tau}\Gamma_{ip}r_i^{n-1}$。

引理 3.16 (六层临界先验)**.** 在 (84) 下，可按前节同一图选层方法重新选择一个 I，使

$$C_*P_\partial\leq\frac{c_{\mathrm{rec}}}{4}P_I,\qquad 2nvS_I\leq\frac{c_{\mathrm{rec}}}{4}P_I,\quad c_{\mathrm{rec}}=\frac{1}{2H},\quad C_*=2C_2(n)+4. \tag{86}$$

同一第六层满足

$$P_I+\frac{\mathcal{D}_6}{a}+v\sum_i(\varepsilon_i+\mathfrak{q}_i)r_i^n+\mathcal{F}_6+c_{n,\tau}\mathcal{F}_{\tau,6}\leq C_{n,B}v^6S, \tag{87}$$

其中 $c_{n,\tau}>0$，对每个预先固定的 τ 分别成立。此外

$$\frac{\mathcal{D}_5}{a}+\frac{\mathfrak{d}_6^0}{a}+S_I+S(\partial I)=O_{n,B}(v^5S),\qquad \frac{\Delta_6^{\mathrm{mass}}}{a}=O_{n,B}(v^6S). \tag{88}$$

若 $\theta_i=(g_i-\mu_i)/(ar_i^n)$，则

$$\sum_i \theta_i r_i^n=O(v^5S),\qquad \frac{1}{S}\sum_i r_i^n \max_l\left|\frac{w_{il}-vR_i}{v^3r_i}\right|^2=O(v). \tag{89}$$

同一宽度结论适用于 W_i^0,W_i'。对稳健近面还有

$$\sum_{i\in\mathcal{T}}\alpha_i r_i^n+\sum_i \Delta_i^{\mathrm{end}} r_i^{n-1}=O(v^6S),\qquad \frac{1}{S}\sum_{(i,p)\in\mathscr{E}_\tau}\frac{|R_i-R_p|}{v^4r_i}r_i^n=O_{n,B,\tau}(v^2). \tag{90}$$

证明. 先说明六层使用同一源、目标族。沿引理 3.13 的递归，在已固定 L_{h-1} 后取 $H_h>L_{h-1}+D+1$，令

$$G_{i,h}=K'\cap Q(x_i,(1-H_hv)r_i),\qquad T_{i,h}=\begin{cases}P_i, & i\in\partial I,\\ N_{i,h-1}, & i\notin I\cup\partial I,\end{cases}\qquad N_{i,h}=K'\cap Q(x_i,L_hvr_i).$$

第一层仍取 $T_{i,1}=P_i$ 及原第一层的小半径阈值。在 $h\ge 2$ 删除原指定半径小于 $2L_{h-1}vr_i$ 的点后，(17)、引理 3.3 及收缩族的唯一覆盖点定位，分别给出完整大见证、源与其他同层目标不交，以及下一常数 L_h。这些证明只用此前已固定的常数，故可再执行一次至 $h=6$。统一为 A_6 后才选强 CDF 斜率，最后取小 v。同一六层于是有

$$\mathcal{D}_h\ge f_h\ge 0,\qquad \mathfrak{d}_1^0\le A_0vM',\qquad \mathfrak{d}_h^0\le f_{h-1}+aP_\partial\quad(2\le h\le 6),\qquad f_h=M'-\sum_i|N_{i,h}|. \tag{91}$$

边界改回私有源的差正由 aP_∂ 控制，小源删除量不在 $\mathfrak{d}_h^0$ 中。

中点盒还有两种可保留的正量。由 (27)，

$$\Delta_i^{\mathrm{end}}\le C_{n,A_6}\varepsilon_i vr_i. \tag{92}$$

令 $s_l=\log(w_{il}/b_i)$，则 $\sum_l s_l=0$，且各 s_l 一致有界。对 $\kappa_i=b_i/R_i\asymp v$，函数 $\sum_l\log(1+\kappa_ie^{s_l})$ 的对角 Hessian 为 $\kappa_ie^{s_l}/(1+\kappa_ie^{s_l})^2\ge c_{n,A_6}v$。沿线段积分 Taylor 公式，一阶项为零，故

$$|X_i|\ge A_vg_i/a-C_{n,A_6}(v/a)(g_i-\mu_i)+c_{n,A_6}v(\varepsilon_i+\mathfrak{q}_i)r_i^n. \tag{93}$$

稳健近面的数目由原半盒不交性一致有界。在切向交内取边长 $\tau r_i/2$、离双方切向边界至少 $\tau r_i/4$ 的面块。原半盒法向缝上的条位于 $A_i^0\setminus\bigcup B_j$：若另一个半盒穿条，分离性先使其半径可比于 r_i，切向不能实现分离，故它必须在两给定半盒之间沿法向分离；边长有固定下界的半盒不能塞入宽至多 $r_i/8$ 的缝。因此 $b_{ip}\le C_{n,\tau}e_i^0r_i=O_{n,D,\tau}(vr_i)$，且原分离给 $|r_i-r_p|<2b_{ip}$。固定 τ 后，所有源位移均小于该切向裕量。引理 3.6 的尾斜率证明由此对这些近面成立，两向余量非负，并满足

$$|R_i-R_p|\le 2\Gamma_{ip}+\Delta_i^{\mathrm{end}}+\Delta_p^{\mathrm{end}}. \tag{94}$$

事实上，两向余量之差是 $R_p-R_i+(\ell'_{p,l}-\ell^0_{p,l})-(h^0_{i,l}-h'_{i,l})$。在中点面对端之间作同一面块上的条，引理 3.9 的排他证明仍适用：任何穿条的第三盒先由分离得到半径 $r_i(1+O_{n,A_6,D,\tau}(v))$，随后被切向裕量和法向次序排除。这些条在源 Q_i 内、避开标记区域，体积为 $c_{n,\tau}\Gamma_{ip}r_i^{n-1}$，重数有纯维数上界。新旧条并集的体积至少为两种并集体积之和的一半；给原条保留固定份额，便可另保留 $c_{n,\tau}\mathcal{F}_\tau$，原小源及环境缺陷的独立回收仍成立。

将这些正量保留在 (65)–(77) 中。重复量留一部分，另一部分用 $\mathcal{D}_h\ge f_h$；令 $C_{\mathrm{b}}=2C_2(n)+2$ 及

$$Z_0=a[V+M-A_vM/a-c_{\mathrm{rec}}P_I+C_{\mathrm{b}}P_\partial+2nvS_I].$$

存在固定 $c_0,b_0>0$，使同一左侧 Z_0 满足

$$Z_0\ge c_0f_h-b_0vf_{h-1}+a\mathcal{J}_h+\mathcal{D}_h/4-C_na(v^6S+vP_\partial),\qquad f_0=A_0vM',\tag{95}$$

其中 $\mathcal{J}_h$ 含固定正比例的 $v\sum(\varepsilon_{i,h}+\mathfrak{q}_{i,h})r_i^n$、$\mathcal{F}_h,c_{n,\tau}\mathcal{F}_{\tau,h}$。以 $(b_0v/c_0)^{6-h}$ 加权，中间五个 f_h 精确消去；初端为 $O(v^7M')$，并保留末层 $\mathcal{J}_6,\mathcal{D}_6/a$ 及前层 $v\mathcal{D}_5/a$ 的固定正比例。图选层仅依赖 P,S，仍按 (80)–(81) 选取满足 (86) 的同一 I。临界假设给精确上界

$$\Xi:=V+M-A_vM/a=V-(A_v-a)M/a\le B(A_v-a)v^6V=O_{n,B}(v^6S).$$

将其代入保留正量的不等式，得到 (87) 及 $\mathcal{D}_5/a=O(v^5S)$。初始异常条件及固定层增长给 $S_I\le C_nS(J_0)\le C_nP_I/(Dv)$；(56) 给 $S(\partial I)\le C_nP_\partial/v$，故两者都是 $O(v^5S)$。(91) 给 $\mathfrak{d}^0_6/a=O(v^5S)$。引理 3.10 给 $\Delta_6^{\mathrm{mass}}/a=O(v^6S)$，再用 (85) 得 $\sum\theta_ir_i^n=O(v^5S)$。

最后，盒宽上下界、(93) 和

$$\big||W_i|^{1/n}-vR_i\big|\le C_{n,A_6}vr_i(\varepsilon_i+\theta_i)$$

给出 (89)：各向异性平方由 $\mathfrak{q}_i$ 控制，ε_i,θ_i 一致有界，缩放再乘 v^{-4} 后为 $O(v)$。原始、有效端盒与中点盒的边差由 (92) 控制。由 (40)，$\sum_{\mathcal{T}}\alpha_ir_i^n\le 2\mathcal{F}_6$。对稳健近面用有界度求和 (94)，再用 (87)、(92)，即得 (90)。 □

3.12　原输入的局部铺砌与接触计数

引理 3.17 (全部尺度的局部匹配)**.** 在引理 *3.16* 的同一族上，存在 $Z_v\supset I\cup\partial I$，使

$$S(Z_v)=O_{n,B}(v^{9/2}S).$$

对每个固定 $R<\infty$，在 Z_v^c 中所有根 i 的 $Q(x_i,Rr_i)$ 内，全部原半盒按 r_i 归一化后一致趋近某个覆盖全空间的轴平行单位立方体铺砌。匹配包括碰该窗口的全部指标，容许内外趋零的边缘层；所有相关尺度趋于根尺度，并最终全为外部深处指标。极限中具有固定切向正交长的面对，在前极限的 *CDF* 盒上有精确面对顺序。

证明. 令 N^k 为完整见证图的闭图邻域。对任意 $U\supset I$，每个 $j\in N^1(U)\setminus U$ 规则，选一个邻接 $i\in U$。引理 3.7 给 $r_j\le 3r_i$，故 $B_j\subset Q(x_i,11r_i/2)$。给每个新指标只分配一次，原半盒不交性给

$$S(N^1(U))\le C_\circ S(U),\qquad C_\circ=1+11^n.$$

取

$$\ell(v)=\left\lfloor \frac{\log(1/v)}{2\log C_\circ}\right\rfloor, \qquad Z_v=N^{\ell(v)+2}(I).$$

由 $S(I)=O(v^5S)$ 得所需坏根权界。好根的任意固定图层最终均规则且外部深处。

归一化任意好根序列，使根半径为一、中心为零。固定图层内，规则相邻半径比有统一上下界，中心在固定有界盒中；半盒不交性遂给指标数的统一上界。逐层取子列，得到嵌套的有限根图极限。极限保留 $\|x_i-x_j\|_\infty\ge\max(r_i,r_j)$。凡原半盒碰 A_i^0，其原 Q 与 Q_i 有严格邻接余量，且半径在 $(r_i/2,3r_i/2)$，故均在下一图层有限清单中。因 $e_i^0\le Dv\to 0$，这些极限闭半盒完全覆盖 A_i^0；若漏一内点便漏正体积邻域，再取闭包涵盖边界。

将有限覆盖截到连通的 A_i^0，其相交图连通。相交的两个极限半盒满足

$$\max(r_j,r_p)\le\|x_j-x_p\|_\infty\le(r_j+r_p)/2,$$

所以半径相等。含自身半盒的覆盖组件因此全为单位半盒。该组件每加一图层就覆盖上一并集的 $1/4$ 邻域，故第 m 层覆盖 $Q(0,1/2+m/4)$。可用规则图层数趋于无穷，得到全空间单位铺砌。

还须排除不在固定已见图球中的盒。固定 $R\ge1$（较小窗口可包含于此类窗口）。若额外半盒碰 $Q(0,R)$，令其半径为 r、中心距为 c。原分离与相交给 $c>\max(1,r)$、$c\le R+r/2$，从而 $r<2R, c<2R$。取子列使其中心趋于 x_*，半径可趋零。上面的有限单位组件已覆盖 $Q(0,2R+1)$，有某单位中心 y 满足 $\|x_*-y\|_\infty\le1/2$。但它与额外盒的原分离在极限给距离至少一，矛盾。这同时排除了微小盒及从窗口外伸入的大盒。

若固定窗口的匹配不一致，取一列违例好根；上述紧性和完整清单给出一个全空间单位铺砌，与违例矛盾。边缘触点以趋零内外扩张处理，中心分离保证匹配在内窗口为一一对应。所有匹配指标位于某固定图球，离 I 的图距离趋于无穷。极限面对有固定切向裕量时，前极限成为引理 3.16 中的稳健近面，其两向余量非负，给出精确 CDF 面对顺序。 □

引理 3.18 (角交量的均匀可积性)**.** 对任意外部指标集 Z，置 $\mu=S(Z)/S\le1$。同一第六层中至少一端在 Z 的全部相交对满足

$$\sum_{e\leftrightarrow Z}|X_i\cap X_j|\le C_{n,B}v^6S(\mu^{1/3}+v). \tag{96}$$

全部至少三临界轴的交量为 $o(v^6S)$；涉及外边界的全部交量为 $O(v^7S+v^9S)$。特别地，涉及引理 *3.17* 中 Z_v 的交量为 $O(v^7S)$。

证明. 单临界对无正体积交。对两个深处端点且有 $q\ge2$ 个临界轴的边，取 $R_i\ge R_j$ 的源端为所有者，令 $\zeta_q=q/(2q-1)$。(63) 给

$$|X_i\cap X_j|\le C_{n,A_6}\left[v^q(\varepsilon_i+\varepsilon_j)r_i^n+v^q\Gamma_{ip}r_i^{n-1}+v^{q+\zeta_q}\varepsilon_i^{\zeta_q}r_i^n\right].$$

相交度有界、尺度可比，故所涉所有者按边重复的总权至多 $C_nS(Z)$，即使所有者在 Z 外也可向其坏端点计费。盈余总权为 $O(v^5S)$，所选面缝总和由 $\mathcal{F}_6$ 控制。线性项合计 $O(v^7S+v^8S)$，加权 Hölder 给

$$v^{q+\zeta_q}\sum_e\varepsilon_{i(e)}^{\zeta_q}r_{i(e)}^n\le C_{n,B}v^{q+6\zeta_q}\mu^{1-\zeta_q}S.$$

而

$$q+6\zeta_q-6=\frac{(2q-3)(q-2)}{2q-1}\geq 0,\qquad 1-\zeta_q\geq\frac{1}{3}.$$

对 $q=2,\dots,n$ 求和得 (96)。若 $q\geq 3$，第一指数差至少为 $3/5$，故总和为 $O(v^{33/5}S)=o(v^6S)$。边界对使用 (36)，其总和为 $O(v^2\sum\varepsilon_i r_i^n+v^4S(\partial I))=O(v^7S+v^9S)$。 □

对恰有两个临界轴的正体积相交对 $e=\{i,j\}$，令 T_e 为其他轴的投影交、$b_e=|T_e|$，并取 $r_e=r_i$；换成另一端只有 $1+O(v)$ 因子。记

$$\mathcal{C}_6=\sum_{e:q(e)=2}b_e r_e^2.$$

引理 3.19 (余维二接触计数)**.** 对全部临界输入序列及上述同一第六层，有

$$\limsup_{v\to 0}\frac{\mathcal{C}_6}{S}\leq\binom{n}{2}. \tag{97}$$

证明. 先在单位立方铺砌中固定两个轴，在其余轴作几乎处处横截面。得到单位正方形铺砌，每个四胞接缝有四个方形角；每胞对此轴对只有四个角，所以四胞片的积分计数每单位体积至多一。对轴对求和，窗口 $Q(0,R)$ 中的计数至多 $\binom{n}{2}(2R+C_n)^n$；边界由与窗口相遇的单位胞数控制。T 接缝不计为四胞，横截面允许分片。四胞片的相邻面对端有序时，两条对角不能同时正交：若按两行两列记为 A,B,C,D，

$$A_q^+\leq B_q^-,\quad C_q^+\leq D_q^-,\qquad A_r^+\leq C_r^-,\quad B_r^+\leq D_r^-.$$

若 A,D 在两轴都交，则 $C_q^+<B_q^-$ 且 $B_r^+<C_r^-$，使另一对角两轴都分离。

固定 R，在好根的扩大窗口中应用引理 3.17。固定窗口内候选数由 packing 有界。沿收敛子列，将其余轴按极限投影端点分成有限矩形片，先略去端点的 η 邻域，最后令 $\eta\to 0$。正权重极限角对在每片上必须来自相反象限；覆盖性使另两象限亦由胞填满，故为四胞片。稳健近面给前极限的精确面对顺序，排除两对角同活跃。端点片及退化切向交长无极限权重。若角片进入根窗口，原中心分离先给其端点半径 $O_R(r_k)$；X_i 比 B_i 仅扩张 $O(vr_i)$，故这些原半盒均进入固定扩大窗口的全部匹配清单。由此局部上界为

$$\nu(Q(x_k,Rr_k))\leq\left[\binom{n}{2}(2R+C_n)^n+o_R(1)\right]r_k^n,$$

其中 ν 在下文定义。紧性反证使该界对全部好根一致。

局部到全局采用积分可见性。对每个角对，在两个临界交区间的中点及其他轴 T_e 上放置面片 Σ_e，定义

$$\nu_e=r_e^2\mathcal{H}^{n-2}\lfloor_{\Sigma_e},\qquad\nu=\sum_e\nu_e,\qquad\nu(\mathbb{R}^n)=\mathcal{C}_6;$$

$n=2$ 用点质量。取足够大的固定 $L=2R+C_n$，只保留两端在 $G_L:=Z_v^c$ 的角对，得 ν^{end}。相交度有界、尺度可比给

$$\nu(\mathbb{R}^n)-\nu^{\mathrm{end}}(\mathbb{R}^n)\leq C_nS(Z_v)=o_R(S).$$

对保留角片上的 y，先数全部尺度可比的候选根：

$$N_R(e,y)=\sum_{k}\mathbf{1}_{\{y\in Q(x_k,Rr_k),\ 1/2\le r_k/r_e\le 2\}}\ge (2R-C_n)^n.$$

候选根都在某个好端点的 Lr_e 扩大窗口内，全部窗口匹配使其尺度为 $(1+o_R(1))r_e$；固定厚度的内窗口单位胞计数给此下界。这里尚未删除坏根。坏根的积分可见性损失为

$$\mathcal{L}_R=\sum_{k\in Z_v}\ \sum_{\substack{e\ \text{保留}\\ 1/2\le r_k/r_e\le 2}}\nu_e(Q(x_k,Rr_k)).$$

每个被计坏根所见的端点在 $O_R(r_k)$ 窗口中且尺度可比，半盒不交性和有界相交度给只有 $O_{n,R}(1)$ 个角对，每个质量至多 $C_nr_k^n$。所以 $\mathcal{L}_R\le C_{n,R}S(Z_v)=o_R(S)$。Tonelli 定理于是给

$$\sum_{k\in G_L}\nu(Q(x_k,Rr_k))\ge (2R-C_n)^n\mathcal{C}_6-o_R(S).$$

结合局部上界并对好根求和，先令 $v\to 0$，再令 $R\to\infty$，得到

$$\limsup\frac{\mathcal{C}_6}{S}\le\binom{n}{2}\lim_{R\to\infty}\frac{(2R+C_n)^n}{(2R-C_n)^n}=\binom{n}{2}.$$

这个扣除只涉及角接触或交量；所有胞的基线体积始终保留。 □

3.13　完整源盈余的锐角价格

末层令

$$J_i=(R_i+|W_i|^{1/n})^n-(R_i+\mu_i^{1/n})^n\ge 0.$$

这是由实际源盒定义的完整盈余。

引理 3.20 (有效端缺量的系数一). 有

$$|W_i|-\mu_i\ge|(x_i+W_i')\setminus F_i|,\qquad J_i\ge c_{n,A_6}(v/a)|(x_i+W_i')\setminus F_i|.\tag{98}$$

在 $\varepsilon_i=o(1)$、宽度比一致趋一的子族上，第二式的系数可取 $(1-o(1))v/a$。

证明. 强 CDF 尾界 (26) 给 $|F_i\setminus(x_i+W_i')|\le\lambda_i\Delta_i^{\mathrm{end}}$。在 (27) 的同一斜率选择下，$|W_i|-|W_i'|\ge\lambda_i\Delta_i^{\mathrm{end}}$。所以

$$|W_i|-\mu_i=|(x_i+W_i')\setminus F_i|+|W_i|-|W_i'|-|F_i\setminus(x_i+W_i')|\ge|(x_i+W_i')\setminus F_i|.$$

函数 $\Phi(m)=(R_i+m^{1/n})^n$ 的导数为

$$\Phi'(m)=(R_i+m^{1/n})^{n-1}m^{1/n-1}.$$

在完整求导区间上它不小于 $c_{n,A_6}v/a$。若 $\varepsilon_i=o(1)$，则 $m/(ar_i^n)=1+o(1)$、$R_i/r_i=1+O(v)$，故导数为 $(1+o(1))v/a$，得到结论。 □

引理 3.21 (同层全部交长的锐价格)**.** 对每个固定 $0<\sigma<1/4$，同一第六层有

$$\sum_{i<j}|X_i\cap X_j|-\sum_i J_i\le\frac{n^2}{27(1-\sigma)^2}v^6\mathcal{C}_6+o_\sigma(v^6S). \tag{99}$$

因而

$$\sum_{i<j}|X_i\cap X_j|-\sum_i J_i\le[K_{n,\sigma}+o_\sigma(1)]v^6S,\qquad K_{n,\sigma}=\frac{K_n}{(1-\sigma)^2}. \tag{100}$$

证明. 先处理恰有两临界轴、$\max L_l\le Tv^3r_e$ 的深处角对，其中 T 固定。由 (89)、(92)，可选慢趋零阈值，使除总权 $o(S)$ 外，$\varepsilon_i=o(1)$，原始和有效盒宽除以 vr_i 一致趋一。有非良好端点的这些有界交长边，其交量及下文名义成本均为 $O_T(v^6)o(S)$。只在此误差精度中略去这些边，所有胞的 J_i 仍保留。

固定良好源 i，按两临界轴和面符号分组，取同组全部良好目标 j。反射坐标使源在目标左侧。记

$$H_e=\max(L_1,L_2),\qquad c_{ij}=\max\{-H_e,\min(H_e,(R_i-R_j)/2)\},$$
$$P_{ij}=(L_1+c_{ij})_+,\qquad Q_{ij}=(L_2+c_{ij})_+.$$

反向截断恰为 $-c_{ij}$。从有效面对端取第一轴深度 s、第二轴深度 $s+y$，$0\le y\le C_Tv^3r_i$、$0\le s\le C'_Tv^4r_i$；其他坐标距有效盒两端均大于 $H_Tv^3r_i$，其中 H_T 先取得足够大。若这个点属于 F_i，其同一个原指定见证因 $r(x)>R_i$ 至少捕获目标原始盒的两厚度

$$(P_{ij}-s-\Delta_i^{\mathrm{end}})_+,\qquad (Q_{ij}-y-s-\Delta_i^{\mathrm{end}})_+.$$

原始面对端距不大于中点面对端距 $(R_i+R_j)/2-L_l$，故上述穿透下界成立；截断根差只减小保证量。其他轴上整个目标宽度进入，因为非临界方向的原始源点距离小于 $\min(R_i,R_j)$。对小 v，两厚度远小于目标宽度，无需截宽。扣除 (28) 的目标实际缺量，给目标质量下界

$$(1-o(1))(vr_i)^{n-2}P_{ij}(Q_{ij}-y)_+-C_T(vr_i)^{n-2}v^3r_i(s+\Delta_i^{\mathrm{end}})-C_{n,A_6}\varepsilon_jar_i^n.$$

同组所有 F_j 两两不交，并均与完整自身目标 G_i 不交。所以这些目标质量在同一个见证中可以先全部相加。再用 (41)，其实际剩余容量至多为

$$nar_i^{n-1}(1+O(v))(s+\Delta_i^{\mathrm{end}}+\alpha_ir_i).$$

置 $P'_j=P_{ij}/r_i,Q'_j=Q_{ij}/r_i,y'=y/r_i$。任何实际源点必须满足

$$\frac{s}{r_i}\ge(1-o(1))\frac{\sum_j P'_j(Q'_j-y')_+}{nv^2}-E_i,\quad E_i=C_T\left(v^5+\alpha_i+\frac{\Delta_i^{\mathrm{end}}}{r_i}+\sum_j\varepsilon_j\right).$$

故其右侧正部以下的整层均缺少 F_i。目标数有界、$P'_j,Q'_j=O_T(v^3)$，所以先固定的 C'_T 足以容纳整层。对第二排序交换两轴；两排序只有零测交。以引理 3.20 的系数一乘上缺层体积，积分 y' 后，该源、该有向角给

$$(1-o(1))\frac{r_i^{n-3}}{2nv^3}\sum_j P_{ij}Q_{ij}(P_{ij}+Q_{ij})-O_T(r_i^nv^2E_i). \tag{101}$$

第一排序的积分为 $\sum_j P_j'(Q_j')^2/2$，另一排序给对称项。减去高度 E_i 造成的损失至多 $C_T v^3 E_i$；其他轴宽度为 $(vr_i)^{n-2}(1+o(1))$，即得上述误差。由 (87)、(90) 及有界度，误差总计 $O_T(v^7 S)$。同组只积分由目标质量总和决定的一层，并未重复计缺失源点。不同轴对因其他轴的 $H_T v^3 r_i$ 剪裁互不交，同一轴对不同符号靠近相反端点，亦互不交。该剪裁的相对宽度损失为 $O_T(v^2)$，不削去目标体积。因此 (101) 可对所有组相加。

令

$$f(z) = (L_1+z)_+(L_2+z)_+[(L_1+z)_+ + (L_2+z)_+].$$

它在 $z \le -\min(L_1, L_2)$ 为零，其余区间二阶导为 $6[(L_1+z)+(L_2+z)] \ge 0$，拼接处右导数非负，故为凸函数。于是 $f(c_{ij}) + f(-c_{ij}) \ge 2f(0)$。两端尺度比为 $1+O(v)$，相加得到全部小边的成本下界

$$\sum_i J_i \ge (1-o(1)) \sum_{\text{小边}} \frac{b_e L_1 L_2 (L_1+L_2)}{n v^3 r_e} - o_T(v^6 S).$$

这里先得到的是整张切向权 r_e^{n-2}；$b_e \le (1+C_{n,A_6} v) r_e^{n-2}$ 给出以上较弱而所需的接触权形式。

再处理大交长，不用良好端点假设。取 $R_i \ge R_j$ 的端为源，

$$p = \max L_l/r_i, \quad q = \min L_l/r_i, \quad H_0 = \min(q, pq/v^2), \quad \delta_i^{\text{end}} = \Delta_i^{\text{end}}/r_i.$$

有 $p > (1-O(v))Tv^3$，$0 < q \le p \le C_{n,A_6} v$。若 $\varepsilon_j \ge c_0 pq/v^2$，把该边交量控制为 $Cv^2 \varepsilon_j r_i^n$；若 $\alpha_i + \delta_i^{\text{end}} \ge c_1 H_0$，控制为 $Cv(\alpha_i + \delta_i^{\text{end}}) r_i^n$，因为 $pq \le CvH_0$。这些例外合计 $O(v^7 S)$。

其余边，在源有效盒内取长轴深度 $[c_2 p, 2c_2 p] r_i$，短轴深度 $[c_3 H_0, 2c_3 H_0] r_i$，其他轴全宽。先固定小 c_2，使长轴条在盒内并保留至少 cpr_i 的目标穿透；由 $R_i \ge R_j$，原始穿透至少为交长。再取 c_1, c_3 小，短轴保留至少 cqr_i；有效端误差至多 $\delta_i^{\text{end}} r_i$。将厚度截在目标宽度内仍有这些固定比例下界，因为宽度在 $[cvr_i, Cvr_i]$，而 $p, q \le Cv$。最后取 c_0 小，扣除目标实际缺量后，同一源见证中的额外质量至少为 $c' a r_i^n pq/v^2$。短轴主面对容量却至多为 $Car_i^n(2c_3+c_1)H_0$，可取小到严格少于前者。因此整条均缺少 F_i。引理 3.20 的一般固定系数给

$$J_i \ge c r_i^n \frac{pH_0}{v} = c r_i^n pq \min(1/v, p/v^3).$$

每源至多作为纯维数个大边的源，把 σJ_i 按该次数等分，即使条相互重叠也不重复使用盈余。先令 T 足够大，再令 v 足够小使 $1/v > T$，可得

$$\sum_{\text{大边}} b_e L_1 L_2 \le \sigma \sum_i J_i + O(v^7 S).$$

余下 $(1-\sigma)\sum_i J_i$ 用于上述小边的完整成本。

至少三临界轴及边界边由引理 3.18 给 $o(v^6 S)$。于是每个小边剩余至多

$$b_e L_1 L_2 \left[1 - \frac{(1-\sigma)(L_1+L_2)}{n v^3 r_e}\right] \le \frac{n^2}{27(1-\sigma)^2} v^6 b_e r_e^2.$$

最后一步用 $L_1 + L_2 \ge 2\sqrt{L_1 L_2}$ 后作一变量极大。得到 (99)，再由引理 3.19 得 (100)。次序是先固定 σ，再固定 T 和辅助阈值，随后令 $v \to 0$。 □

3.14　八阶精确系数

八阶价格同时取决于目标缺形的第二次反馈、三近面源层和实际删除质量。我们先保留一个定量粗上包，由竞争输入提取正预算稳定性；随后在整个有效源盒内计算联合高度，最后在后文同一九层账本中消去源缺量。二维的微孔还产生独立的小半径项，须在真实基线导数下单独支付。

定理 3.22 (八阶精确展开)**.** 固定整数 $n\ge 2$，令 $a=v^n=2^n t$、$v=2t^{1/n}$，并记

$$K_n=\binom{n}{2}\frac{n^2}{27},\qquad P_{7,n}(t)=L_n(t)+K_n a v^6-\left(n+\frac{26}{9}\right)K_n a v^7,$$

$$J_n=\frac{(n-1)n^3(2609+1971n+81n^2)}{26244}+\frac{8}{27}\mathbf{1}_{\{n=2\}},\qquad \widehat{J}_n=J_n+\frac{8}{27}\mathbf{1}_{\{n=2\}}.$$

则

$$C_n(1-t)=P_{7,n}(t)+\widehat{J}_n a v^8+o_n(a v^8). \tag{102}$$

特别 $\widehat{J}_2=17638/6561$。所有余项按固定维数理解。

3.14.1　同一八层族与定量粗先验

记 $A_v=(1+v)^n$、$B_n=\binom{n}{2}$、$k=n^2/27$、$\Gamma=(10/9)k$。上界只须考虑任意序列

$$\begin{aligned} &v\downarrow 0,\quad V=|E|>0,\\ &K\subset \mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E \text{ 紧},\quad M=|K|,\\ &\qquad 1+M/V\ge L_n(t)+K_n a v^6-B_0 a v^7, \end{aligned} \tag{103}$$

其中 $B_0=(n{+}26/9)K_n{+}1$ 固定。沿用原有限贪心族及源、目标记号，写 $S=\sum_i r_i^n$、$\mathcal{V}=V+M$。所有 O 常数只依赖固定维数及固定选择参数，不依赖输入、指标数或尺度跨度；little-o 沿任意上述输入序列成立，模量可以依赖该序列。

引理 3.23 (同一八层族的三个前缀)**.** 可先按原 P,S 图固定一个 I，使 (86) 成立，再一次构造八层源、目标。统一全部深度常数为 A_8 后才选择强 *CDF* 斜率。对本次族的 $\ell=6,7,8$，有

$$P_I+\mathcal{D}_\ell/a+v\sum_i(\varepsilon_{i,\ell}+\mathfrak{q}_{i,\ell})r_i^n+\mathcal{F}_\ell+c_\tau\mathcal{F}_{\tau,\ell}=O(v^6S), \tag{104}$$

$$\mathcal{D}_{\ell-1}/a+\mathfrak{d}_\ell^0/a+S_I+S(\partial I)=O(v^5S),\qquad \Delta_\ell^{\mathrm{mass}}/a=O(v^6S). \tag{105}$$

相应宽度、固定裕量稳健面及全尺度局部匹配分别在各实际末层成立。

证明. 纯维数价格取 $c_{\mathrm{rec}}=1/(2^{n+1})$、$C_{\mathrm{b}}=2C_2(n)+2$、$C_*=C_{\mathrm{b}}+2$。原图选层只用原 P,S 和这些价格，故在源深度之前固定。引理 3.13 的有限递归执行至八层；每步先固定深目标，再固定中心邻域，边界仍用原私有源。同一 I,K',M' 和原指定见证用于全部层，完整本目标与异源目标排他性不变。有精确质量恒等式 (85)，以及

$$\mathcal{D}_h\ge f_h\ge 0,\quad \mathfrak{d}_h^0\le f_{h-1}+aP_\partial,\quad f_h=M'-\sum_i|N_{i,h}|,\quad f_0=A_0vM',\qquad 1\le h\le 8. \tag{106}$$

第一层使用 $\mathfrak{d}_1^0 \le f_0$。对 (95) 分别取长度 $\ell = 6,7,8$ 的前缀，以 $(b_0 v/c_0)^{\ell-h}$ 加权；中间缺量精确消去，初端除 a 为 $O(v^{\ell+1}S)$。末层正量和 $\mathcal{D}_\ell/a, v\mathcal{D}_{\ell-1}/a$ 的固定份额仍保留。输入假设和已证粗结算给 $\Xi = \mathcal{V} - A_v M/a = O(v^6 S)$ 的双侧界，同一图条件遂给所述先验。引理 3.16 的宽度、面对和引理 3.17 的原输入证明，只用这些固定末层条件，所以在本次三个前缀重新应用，不借用旧层对象。特别

$$M/V = a[1+O(v)], \qquad S/\mathcal{V} = 1+O(v), \qquad M/a \le S \le V/(1-a). \tag{107}$$

□

以下局部论证固定取本次第七或第八层，略去层号。各层分别重取好根、正常槽及实际源层，有限多个常数可预先统一。记

$$R_i = (g_i/a)^{1/n}, \quad X_i = x_i + W_i + [-R_i/2, R_i/2]^n, \quad J_i = (R_i + |W_i|^{1/n})^n - (R_i + \mu_i^{1/n})^n,$$

$$H = \sum_{i<j} |X_i \cap X_j| - \sum_i J_i, \quad \mathscr{D}_i = (x_i + W_i^0) \setminus F_i, \quad \Delta_i = \Delta_i^{\mathrm{end}}.$$

删除质量 Δ_h^{mass} 与这里的 CDF 端移分开。由原强斜率选择，对任意 $Y_i \subset (x_i + W_i') \setminus F_i$，

$$|W_i| - \mu_i \ge |Y_i| + c\big[|\mathscr{D}_i \setminus Y_i| + (vR_i)^{n-1}\Delta_i\big]. \tag{108}$$

确实，中点与有效盒的体积差扣除源尾后仍至少为 $c(vR_i)^{n-1}\Delta_i$，原端盒外环至多是其固定倍；先取出 Y_i 再分配剩余，其系数仍为一。完整求导区间上

$$\frac{d}{dm}(R_i + m^{1/n})^n \ge (1 - C\varepsilon_i)(1+v)^{n-1}\frac{v}{a}, \qquad \frac{d}{dm}(R_i + m^{1/n})^n \ge c\, v/a. \tag{109}$$

还记三个端盒的相对宽度误差为

$$\xi_i = \max_{l,\, W_i^0, W_i', W_i} |w_{il}/(vR_i) - 1|, \qquad \sum_i \xi_i R_i^n = O(v^{5/2}S), \quad 0 \le \xi_i \le C.$$

这由宽度平方界、Cauchy–Schwarz 及端移先验得到。只需上述粗界

$$\sum \varepsilon_i R_i^n = O(v^5 S)、$$
$$\sum_{\text{deep}} (\alpha_i + \Delta_i/R_i) R_i^n = O(v^6 S),$$

不预先假定七阶饱和或定性缺源轮廓。

3.14.2　实际覆盖、局部根传输与软接触容量

引理 3.24 (实际空隙及窗口根差)**.** 令 $U = \bigcup_{i \notin I} X_i$、$\mathcal{Q} = \bigcup_i Q_i$。则

$$|\mathcal{Q} \setminus U| = O((v^{n+1} + v^5)S), \qquad \sum_{i<j} |X_i \cap X_j| = O(v^6 S). \tag{110}$$

对好根 $G_v = Z_v^c$ 和任意固定 R，完整窗口清单 $\mathcal{I}_i(R) = \{j : B_j \cap Q(x_i, Rr_i) \ne \varnothing\}$ 满足

$$\sum_{i \in G_v} \sum_{j \in \mathcal{I}_i(R)} |R_i - R_j| r_i^{n-1} = O_R(v^6 S). \tag{111}$$

证明. 第二个粗交量界由引理 3.18 的原 Hölder 估计给出。单盒基线、质量恒等式及 Bonferroni 给

$$|U| \geq A_v M'/a - O(v^6 S) \geq V + M - O(v^5 S).$$

原严格见证给 $|\mathcal{Q}| \leq V + aS$，又

$$0 \leq S - M/a \leq V\left[(1-a)^{-1} - (A_v - a)^{-1} + O(v^6)\right] = O(vS).$$

因而空隙至多 $aS - M + O(v^5 S)$，即第一式。

为证明窗口根差，先在任意单位立方铺砌中连接固定窗口内的两胞。在各胞中心边长 $1/4$ 的内盒独立均匀取端点，连接线段留在固定扩张窗口。窗口所遇胞数有统一界 N_R。条件化两端点法向坐标后，线段与某面平面的交点，其切向密度至多 8^{n-1}：两个均匀密度卷积的界为 $\min(4^{n-1}/(1-\theta)^{n-1}, 4^{n-1}/\theta^{n-1})$。窗口内至多 N_R^2 个面片，故可选固定 $\tau_R = (4 \cdot 8^{n-1} N_R^2)^{-1}$，使存在一条线段只穿过面积至少 τ_R 的面片，并避开余维至少二的边界。每胞凸，线段不重入，路径长度有界；面片每个切向边亦至少 τ_R。

引理 3.17 的完整清单将这条路径拉回原族。只须匹配误差小于一个固定阈值，便得到固定裕量的实际稳健面路径。沿路精确相加实际根差，再用 (90)。一个实际面边能出现的根均位于它的固定倍尺度窗口，尺度可比；原半盒 packing 使重复次数有统一界。这证明 (111)，没有把模型位移作为加法面积误差。 □

对每个外部二临界正交边 $e = \{i, j\}$，令

$$R_e = \max(R_i, R_j), \quad p_e = L_1/(v^3 R_e), \quad q_e = L_2/(v^3 R_e), \quad m_e = \min(p_e, q_e),$$

其余轴实际交投影记为 T_e、$b_e = |T_e|$。固定 $C \geq 1$，置 $\omega_e = \min(1, C m_e)$、$W_C = \sum_e b_e R_e^2 \omega_e$；二维空投影的体积取一。

引理 3.25 (自适应软权容量)**.** 对任意固定 $C \geq 1$，

$$W_C \leq \frac{B_n}{(1+v)^2}\mathcal{V} + O_C(v^3 S). \tag{112}$$

证明. 先取 $n \geq 3$，每条好端点边以较小编号端为锚，反射临界轴为右上布局，以实际 X_i 中心为平面原点、r_i 为尺度。固定很小 $\epsilon > 0$，放置

$$P_B = [1/2 + \epsilon, 1/2 + 2\epsilon] \times [1/2 - 2\epsilon, 1/2 - \epsilon], \qquad P_C = P_B^{\text{transpose}}.$$

每根在所有轴对、符号下只有 $8B_n$ 个 probe。若某 fibre 上 probe 至少半面积未被 U 覆盖，Fubini 与原 Q_i 有界重数给该类 fibre 的 r_i^2 加权量至多 $C|\mathcal{Q} \setminus U|$；所有 probe 均位于 Q_i 平面投影内。

令 $\ell_e = \min L_l$、$\lambda_e = \ell_e/(1000 r_i) > 0$。原临界坐标界使所有 $\lambda_e < \epsilon^2$，不设共同正下界。再删除 fibre 上清单中某对不同胞的平面交面积至少 $\lambda_e r_i^2$ 的部分。剩余 $\Gamma_e \subset T_e$ 称为清洁片。清单固定取 $\mathcal{I}_i(20)$；碰 probe 的覆盖胞必与 Q_i 相交，好根的完整窗口和图深度保证它在清单内、深处且尺度趋同。这些均是有限盒的 Borel 判据。

清洁 fibre 上 probe 被覆盖者必是正确的实际辅助胞。具体令归一化中心、边长误差 $\delta \leq \epsilon/100$。覆盖 P_B 的胞中心满足 $\epsilon - \delta \leq b_x \leq 1 + 2\epsilon + \delta$、$-2\epsilon - \delta \leq b_y \leq 1 - \epsilon + \delta$。若 $b_x \leq 1 - 4\epsilon$，

它与左下端胞的交面积至少 $(4\epsilon-\delta)(\epsilon-2\delta)>2\epsilon^2$；若 $b_y\ge 4\epsilon$，它与右上端胞的交面积至少 $(\epsilon-3\delta)(4\epsilon-2\delta)>2\epsilon^2$。两者均触发已删碰撞。因此辅助胞位于 $(1,0)$ 的 4ϵ 邻域，另一 probe 给 $(0,1)$ 邻域的辅助胞。同列两个不同胞的交面积大于固定正比例，也触发碰撞，故二者唯一。按这两个有限清单指标，Γ_e 分成有限 Borel 片。

每片同一 transverse 点分配给四胞 A,B,C,D 的四个相应角面位置。这些都是实际角面，四胞都包含该点。须比较不同锚点的分配：若共享同一胞、轴对、角符号和该点，两组其余三个中心落入同三个近单位列。经共享胞比较尺度，第二组各胞中心到第一锚点至多 $(6+o(1))r_i$，原半盒半径为 $(1/2+o(1))r_i$，故全在第一清单。同列指标若不同，有固定大面积碰撞；所以两组实际四胞完全相同。两条不同边只能是这四胞的相反对角。实际端点给精确恒等式

$$L_{AD,x}+L_{BC,x}=(A_x^+-B_x^-)+(C_x^+-D_x^-).$$

第一边的 x 交长至少 ℓ_e，第二边只须为正；故至少一个相邻面侵入量大于 $\ell_e/2$。另一平面轴交长大于 $r_i/2$，产生面积大于 $\ell_e r_i/4>\lambda_e r_i^2$ 的第一清单碰撞，矛盾。每个实际角面点至多用一次，此结论不要求两边共享阈值。

收费时必须先抵消每边小阈值：

$$\frac{\omega_e}{\lambda_e}\le\frac{C\ell_e/(v^3R_e)}{\ell_e/(1000r_i)}\le C_nC/v^3. \tag{113}$$

打开碰撞并用求和上界，对清单 pair s,t 的平面交面积 $A_{st}\ge\lambda_e r_i^2$，轴平行性给

$$R_e^2\omega_e|\pi_{\widehat{qr}}(X_s\cap X_t)|=\frac{R_e^2\omega_e}{A_{st}}|X_s\cap X_t|\le C_nCv^{-3}|X_s\cap X_t|.$$

每锚点边数有界，一个全局 pair 只进入有界个可比尺度窗口。由 (110)，总碰撞费为 $O_C(v^3S)$。probe 空隙费为 $O((v^{n+1}+v^5)S)$，坏端点费为 $O(v^{9/2}S)$。把每个分配的 R_e^2 换为所属胞 R_c^2，误差由 (111) 支付为 $O(v^6S)$；同一 helper 的片先求并，不随分片数重复收费。角面单射和 $\omega_e\le 1$ 遂给

$$4W_C\le\sum_{i,\,q<r,\,\pm,\pm}R_i^2\prod_{l\neq q,r}(R_i+w_{il})+O_C(v^3S).$$

宽度 L^1 误差由 (89) 为 $O(v^{7/2}S)$。逐乘积展开及精确质量式给每个轴对

$$\sum_i R_i^2\prod_{l\neq q,r}(R_i+w_{il})=(1+v)^{n-2}\sum_i R_i^n+O(v^{7/2}S),$$

$$\sum_i R_i^n=(M'+\mathcal{D})/a\le\mathcal{V}/A_v+O(v^6S).$$

四个符号消去系数四，得到结论。

二维没有 transverse 变量，另作离散计数。好边 i,j 的局部铺砌为中心 $(0,0),(1,1)$ 的单位方体。覆盖 $(1/2+\eta,1/2-\eta)$ 的胞，与两指定胞分离，依次迫使其中心横坐标至少一、纵坐标至多零；令 $\eta\downarrow 0$，局部有限性给唯一辅助胞 $(1,0)$，另一胞为 $(0,1)$。完整匹配拉回四个实际胞，其四个相邻面有固定稳健裕量及精确 CDF 面序。每胞每角至多分配一次：两组共享角由中心分离先迫使四胞相同，两相反对角同时正交又被这四条精确面序排除。将每边 $R_e^2/4$ 分到四角，根权差用至多两条稳健面路径支付。故无权角和至多 $\sum_i R_i^2+O(v^{9/2}S)\le\mathcal{V}/A_v+O(v^{9/2}S)$。由 W_C 不大于无权和，即得二维情形。 □

3.14.3 正常槽空缺与全部高支撑的净预算

对深处二临界边沿用 p, q, R_e, b_e，并记

$$z = \frac{\mathrm{clip}((R_i - R_j)/2; -\max L_l, \max L_l)}{v^3 R_e},$$
$$x = \frac{1+v}{n}p, \quad y = \frac{1+v}{n}q, \quad \zeta = \frac{1+v}{n}z,$$
$$\widehat{b} = \frac{b_e}{(1+v)^{n-2}R_e^{n-2}}, \quad b = \min(1, \widehat{b}).$$

固定小 $\nu > 0$，正常集合 $\mathcal{N}$ 定义为

$$|x - 1/3| < \nu, \quad |y - 1/3| < \nu, \quad |\zeta| < \nu, \quad 1 - b < \nu. \tag{114}$$

取 ν 足够小，正常根差未截断，$R_i/R_j = 1 + O(v^3)$，且

$$c_n v^3 R_e \le L_1, L_2 \le T_0 v^3 R_e, \qquad b_e \ge (1-\nu)R_e^{n-2}.$$

正常两端非临界中心差小于 $r_i/100$。同源同轴对同符号角至多一个正常目标，否则其全部中心坐标过近而违反原分离。

取前述同一清洁分配，令 $O_s \subset F_s$ 为送入实际槽 s 的正常片之并。这里槽 $s = (i, q, r, \sigma_q, \sigma_r)$ 的横向容量为 $F_s = \pi_{\widehat{qr}} X_i$。记完整槽容量和真实非负空缺为

$$\mathcal{C} = \frac{1}{4}\sum_s R_i^2 |F_s|, \qquad D_{\mathcal{N}} = \frac{1}{4}\sum_s R_i^2 |F_s \setminus O_s|. \tag{115}$$

正常软权为一时，漏片和根权传输给

$$W_{\mathcal{N}} = \mathcal{C} - D_{\mathcal{N}} + O(v^3 S), \qquad W_{\mathcal{N}} + W_O \le \mathcal{C} + O(v^3 S), \tag{116}$$

其中 W_O 是其余全部二轴边的软权和，含边界。占用先在同槽求并，不假设一条边占满 helper 整槽。

引理 3.26 (槽覆盖识别高支撑目标)**.** 取 $n \ge 3$。存在所有者坏根集 $\mathcal{B}$，使

$$S(\mathcal{B}) \le C(D_{\mathcal{N}} + v^{9/2} S), \tag{117}$$

而实际最大质量根所有者不在 $\mathcal{B}$ 的高支撑边满足

$$\sum_{q(e)\ge 3,\ \mathrm{owner}(e)\notin\mathcal{B}} |X_i \cap X_j| = O(v^8 S). \tag{118}$$

证明. 固定 $\delta < 3^{-(n-2)}/100$。若一个胞某槽的未占部分至少为 δr_i^{n-2}，称其缺槽。由 $R_i \asymp r_i$，缺槽胞总根权至多 $CD_{\mathcal{N}}$。固定窗口 $R_* = 100(n+1)$，令坏根为 Z_v 以及好根中其完整 R_* 清单含缺槽胞者。清单尺度可比和窗口 packing 重数给 (117)。

先看一个不缺槽胞 A 和其真正正 q 面邻居 B。原构造给法向中心差 $r_A + O(vr_A)$，每个切向中心差至多 $(1/2 + 1/128)r_A$。固定切向轴 l；两胞在其余轴的公共投影体积至少为 $3^{-(n-2)} r_A^{n-2}$。故可在公共块中选一个属于 A 的 $(q+, l+)$ 正常占用的点。该正常清洁片重标为四胞 $\begin{smallmatrix} C & D \\ A & \widetilde{B} \end{smallmatrix}$。必

须有 $\widetilde{B}=B$：若不同，二者平面交面积至少 $r_A^2/4$，横向又同含此点；经 A 比较，两者都在正常边锚点的完整固定清单，触发其自身阈值 $O(v^3)<1/100$ 的碰撞，矛盾。

若正常对角为 AD，实际 l 端点满足

$$B_l^+ - A_l^+ = -L_{AD,l} - \Gamma_{BD}.$$

若为 BC，则

$$B_l^+ - A_l^+ = L_{BC,l} + \Gamma_{AC}.$$

辅助面对 BD 或 AC 在其他轴有固定交裕量；原中心分离使其法向半盒缝非负，四胞布局使缝小于 $r_A/8$。其几何切向裕量至少为 $1/16$，故实际调用 $\tau_0=1/128$ 的稳健面预算。反射 l 得左端同样结论，所有符号亦然。因此真正面一步在每个切向轴传递左右实际端点的误差至多为 $CT_0v^3r_A$ 加一个稳健面隙。

对好所有者 i，令 $\mathcal{E}_i$ 为其 R_* 清单中全部上述稳健面隙及 CDF 端移之和。固定窗口重复次数给 $\sum_{i\notin\mathcal{B}}\mathcal{E}_i r_i^{n-1}=O(v^6S)$。取一条 $q\ge 3$ 高支撑边，所有者 $R_i\ge R_j$。若 $\mathcal{E}_i\ge c_*vr_i$，原交量已不超过 $Cv^{q-1}\mathcal{E}_i r_i^{n-1}$。否则依次沿每个临界轴的正方向走一次真正面邻居，共至多 n 步，终点为 h。全路径及辅助胞都在该固定窗口，节点不缺槽。稳健实际根差由 $2\Gamma+\Delta+\Delta$ 控制，故

$$|R_h-R_i|\le C_n\mathcal{E}_i,\qquad |X_{h,l}^- - X_{i,l}^+|\le C_n(T_0v^3r_i+\mathcal{E}_i)$$

在临界轴成立；非临界轴的左右端分别接近 X_i 的对应端。

需识别实际终点 $h=j$。在临界轴两中心相差 $O(vr_i)+C_n\mathcal{E}_i$。在非临界轴，原判据 $A_1=5(1+A_8)$ 及所有者次序给

$$|x_{j,l}-x_{i,l}|<\frac{1-2A_1v}{1-A_8v}R_i,\qquad |x_{h,l}-x_{i,l}|\le (2A_8+o(1))vR_i+C_n(T_0v^3r_i+\mathcal{E}_i).$$

又 $r_h\ge R_h\ge R_i-C_n\mathcal{E}_i$。先选小 c_*，再选小 v，这些严格裕量使 $\|x_h-x_j\|_\infty<r_h$，若 $h\ne j$ 则违反原强分离。因此所有临界交长均至多 $C_n(T_0v^3r_i+\mathcal{E}_i)$。结合原 $L_l\le Cvr_i$，分 $\mathcal{E}_i/r_i\le v^3$ 或其反面，得

$$I_e\le C(v^{3q}r_i^n+v^{q-1}\mathcal{E}_i r_i^{n-1}).$$

有限度求和即为 $O(v^8S)$。 □

对固定管宽 $K>0$，置

$$\mathcal{C}_i(K)=\{x\in x_i+W_i' : \text{至少两个轴到有效盒某面的距离}\le Kv^3r_i\},$$
$$Z(K)=\frac{v}{a}\sum_i|[(x_i+W_i')\setminus F_i]\setminus\mathcal{C}_i(K)|.$$

引理 3.27 (一般支撑数的实际净价格). 对每个固定 $\eta,K>0$，

$$\sum_{q(e)\ge 3} I_e\le \eta Z(K)+\eta v^6D_{\mathcal{N}}+C_{\eta,K}v^8S. \tag{119}$$

证明. 二维没有高支撑，结论直接成立；以下取 $n\ge 3$。只需处理坏所有者三临界边及全部四临界以上边，其余由引理 3.26 处理。对深处 $q\ge 3$ 边，以最大实际根端为所有者，排序

$0<p_1\le\cdots\le p_q\le C_pv$，其中 $p_l=L_l/r_i$。令 $P=\prod_{l=2}^{q}p_l$、$A=p_1P$、$H=\min(p_1,A/v^q)$；实际交量 $I_e\le C_IAr_i^n$。目标缺量例外 $\varepsilon_j\ge c_0A/v^q$ 给 $I_e\le Cv^q\varepsilon_jr_i^n$。其余若 $\alpha_i+\Delta_i/r_i\ge c_1H$，由 $A/H=\max(P,v^q)\le Cv^{q-1}$ 得相应面例外界。二者总交量为 $O(v^{q+5}S)$，全部合计 $O(v^8S)$。

非例外时在有效盒内取有向面深

$$[c_3H,2c_3H]r_i,\quad [c_2p_2,2c_2p_2]r_i,\dots,[c_2p_q,2c_2p_q]r_i,$$

非临界轴留 Kv^3r_i 核心。先选小 c_2，再选小 c_1,c_3，使这些带在各有效宽四分之一内。原始面对端距至多 R_i-L_l，端移小于 c_1H，故同一原见证每个临界轴至少捕获 $\min(p_lr_i/2,w^0_{j,l})\ge\gamma p_lr_i$；这保留真实截宽，非临界轴整宽进入。最后取小 c_0，扣实际 $\mathscr{D}_j$ 后仍有 car_i^nA/v^q 的额外 F_j 质量。真正第 1 轴点态面对容量却把半径增量限制为 $C(2c_3+c_1)Hr_i$，剩余容量至多其固定倍 ar_i^{n-1}。因 $H\le A/v^q$，再缩小 c_1,c_3 即矛盾；所以整矩形 $\mathcal{R}_e$ 缺源。

取固定 $T(K)>2K/c_2+1$。若 $p_2>Tv^3$，第 2 至 q 轴及所有非临界轴到两面均远于管阈值，最多第 1 轴近面，故矩形在整个管外。其成本

$$X_e=(v/a)|\mathcal{R}_e|\ge c_Xr_i^nHP/v^{q-1}\ge cI_ev^{1-q}\min(1,P/v^q).$$

同一所有者跨全部支撑数至多有 D 个相交矩形，故 $\sum_{\text{owner}=i}X_e\le DZ_i(K)$，只花一份物理剩余。分配每边 $(\eta/D)X_e$，记 $\lambda=\eta c_X/(DC_I)$。在饱和分支小 v 已支付 A；非饱和而尚有正净额时 $P<v^{2q-1}/\lambda$。排序 $p_1^{q-1}\le P$ 给

$$I_e\le(\eta/D)X_e+C_\eta v^{\beta_q}r_i^n,\qquad \beta_q=\frac{q(2q-1)}{q-1}=2q+1+\frac{1}{q-1}.$$

于是三临界长尾净余为 $C_\eta v^{15/2}S(\mathcal{B})$，$q\ge4$ 的净余晚于 v^8S。短窗 $p_2\le Tv^3$ 的 gross 直接至多 $C_Kv^{q+4}r_i^n$；三临界只保留 $C_Kv^7S(\mathcal{B})$，不从管外 Z 支付。边界高支撑用原单源界和边界邻端权 $O(v^5S)$，为 $O(v^8S)$。由 (117)，坏根项均被小 v 下任意固定 $\eta v^6D_{\mathcal{N}}$ 吸收，其 $v^{9/2}S$ 余项更小。这证明结论；仅扣原来已保留的 Z 和槽领先预算，不另减任何 J_i。二维没有高支撑，式中左侧为零，无须越界调用该几何。 □

3.14.4　完整标量亏损与定量正常反馈

令 $f(s,t)=s_+t_+(s_++t_+)$，并置

$$D(x,y,\zeta)=\tfrac12[f(x+\zeta,y+\zeta)+f(x-\zeta,y-\zeta)],\qquad G(b,x,y,\zeta)=b/27-bxy+D.$$

正部凸性给 $D\ge xy(x+y)$，从而

$$G\ge b/27-\sup_{x,y\ge0}xy(b-x-y)=b(1-b^2)/27\ge0.$$

在固定正常窗外，存在与后选 T,μ_* 无关的 $c_\nu>0$，使

$$G\ge c_\nu(b+D).\tag{120}$$

证明可用反例序列：$xy\le(D/2)^{2/3}$ 排除 $D/b\to\infty$，也排除 $b\to0$ 且 D/b 有界；余下 b 有正下界、D 有界，近取等迫使 $b=1,x=y=1/3,\zeta=0$。截幅约束使 ζ 有界，正宽处严格凸性使最后等号唯一。零权零成本点无需控制。

正常窗内还可取显式二次界

$$G \ge 10^{-3}\{(1-b)+(x-1/3)^2+(y-1/3)^2+\zeta^2\}. \tag{121}$$

取 ν 使 $1/6 \le x,y \le 1$、$b \ge 1/2$、$|\zeta| \le 1/12$。正部未触零，ζ 贡献恰为 $3(x+y)\zeta^2$。余式对 b 仿射，只须检查 $b=1/2,1$。前者至少为 $1/72$；后者置 $s=x+y, d=x-y$，在 $s \le 1$ 时为

$$\tfrac{1}{4}(s-2/3)^2(s+1/3)+\tfrac{1}{4}(1-s)d^2.$$

在 $s \le 5/6$ 直接控制两平方差；在 $5/6 \le s \le 1$ 第一项至少 $7/864$；在 $s \ge 1$ 余式至少 $1/27$。均强于所写常数。

下面先给所有有界目标共用的实际强迫式。固定 T，在同源、同有向轴对、同排序 $s, s+y$ 上，其他轴留共同核心，距两端大于 $H_T v^3 R_i$。记

$$P_{ij}=(L_1+c_{ij})_+,\quad Q_{ij}=(L_2+c_{ij})_+,\quad c_{ij}=\operatorname{clip}((R_i-R_j)/2;-\max L_l,\max L_l),$$

$$S_i^{\perp}=\prod_{\ell\perp}(w'_{i\ell}-2H_T v^3 R_i),\qquad T_j^{\perp}=\prod_{\ell\perp} w^0_{j\ell},\qquad \mathcal{P}_j(y)=[0,P_{ij}]\times[0,(Q_{ij}-y)_+]\times W^0_{j,\perp}.$$

对任何被选有界目标子集，实际源点必须满足

$$\begin{aligned} s &\ge \sum_j A_{ij}(y) - C R_i E_i(T),\\ A_{ij}(y) &= \frac{T_j^{\perp} P_{ij}(Q_{ij}-y)_+ - |\mathscr{D}_j \cap \mathcal{P}_j(y)|}{n a R_i^{n-1}} \ge 0,\\ \sum_i E_i(T) R_i^n &= O_T(v^6 S). \end{aligned} \tag{122}$$

非负性是帽内实际 F_j 质量，不能在嵌套层比较中丢掉。若原半径增量 $\ell \le s$，目标帽只损失厚 $(s-\ell)+\Delta_i$ 的边带，其斜率是容量导数的 $O_T(v)$ 倍，故用容量在 s 的值上界即可。若 $\ell \ge s$，同一个见证同时看见真正浅面邻居 h 的整横截面轴帽 $[A_h(\ell - s - g_{i\to h} - \Delta_i) - |\mathscr{D}_h|]_+$。它与自身 G_i 及组中角目标排他；法向全捕获会超过剩余容量。原见证区间内 $n a (R_i+\ell)^{n-1} < A_h$，容量减轴帽在转折前递增、后递减，可用转折点 $s + g_{i\to h} + \Delta_i + |\mathscr{D}_h|/A_h$ 的容量上界。因此可取

$$E_i(T) = C_T\left[v^8 + \alpha_i + \Delta_i/R_i + \max_h |\mathscr{D}_h|/(A_h R_i)\right].$$

粗先验、面邻尺度可比及有限度给所需均值界。不同目标的实际质量先在同一个原见证中相加，再对总高度取一个正部；不同排序和有向轴组用共同核心分离。

鲜导数乘实际层并作两排序积分，给每个有向端的完整主成本

$$\frac{(1+v)^{n-1}}{2nv^3}\frac{R_j^{n-2}}{R_i} P_{ij}Q_{ij}(P_{ij}+Q_{ij}), \tag{123}$$

并扣除真实退款核

$$\frac{(1+v)^{n-1}(v/a)S_i^{\perp}}{n a R_i^{n-1}} \int_{\mathcal{P}_j(0)} (P_{ij}+Q_{ij}-x-y)\mathbf{1}_{\mathscr{D}_j}\,\mathrm{d}z. \tag{124}$$

核由 Tonelli 的出现长度 $Q_{ij}-y$、$P_{ij}-x$ 相加得到，包含目标全部原横向切片。高度侵蚀总价格为 $O_T(v^{8}S)$，导数 ε_i 损失为 $O_T(v^{11}S)$，核心删宽为 $O_T(v^{8}S)$，宽度平均误差为 $O_T(v^{17/2}S)$。

仅选正常目标、用同一个核心和 $E_i(T)$，所得实际反馈层记为 $Y_{i,N}$。它位于固定正常小管 $\mathcal{C}_i(K_N)$，K_N 不依赖 T，每胞体积至多 $Cav^5R_i^n$。定义

$$R_N=\frac{v}{a}\sum_i|\mathscr{D}_i\setminus Y_{i,N}|,\qquad \mathfrak{E}=\sum_i R_i^{n-1}\Delta_i,\qquad \mathfrak{G}_N=v^6\sum_{e\in\mathcal{N}}G(b,x,y,\zeta)R_e^n.$$

置 $p_0(v)=n/[3(1+v)]$，标准臂为

$$0\le y\le e_i,\quad 0\le x\le h_i(1-y/e_i),\qquad e_i=p_0v^3R_i,\quad h_i=p_0^2v^4R_i/n,$$

及交换两轴，其他轴取原端整宽；各正常角之并为 $\mathcal{A}_i^0$。若 $d_e=|x-1/3|+|y-1/3|+|\zeta|+\sqrt{1-b}$，则

$$\sum_i|\mathscr{D}_i\triangle\mathcal{A}_i^0|\le C(a/v)R_N+Cav^5\sum_{\mathcal{N}}d_eR_e^n+Cav^6S+Cv^{n-1}\mathfrak{E}. \tag{125}$$

先因 $Y_{i,N}\subset\mathscr{D}_i$ 支付未解释缺集。从 (122) 去掉实际目标缺量，核界 Cv^2/a 与 $\sum|\mathscr{D}_i|=O(av^5S)$ 给物理层误差 $O(av^6S)$。剩余标称层在固定紧窗内对参数 Lipschitz，给显示的 d_e 项。排序变量改为物理第二面距的相对误差为 $O(v)$；补回核心、宽度及正常根比误差更小，端面转换另付 $C(vR_i)^{n-1}\Delta_i$。这证明该式，未用任何无速率形状结论。

由此，正常总退款满足

$$\mathfrak{F}_N\le\Gamma v^7W_N+\epsilon\mathfrak{G}_N+Cv(R_N+\mathfrak{E})+C_{\epsilon,T}v^8S \tag{126}$$

对任意固定 $\epsilon>0$ 成立。核界将 (125) 的误差变为 $Cv^7\sum d_eR_e^n+Cv(R_N+\mathfrak{E})+Cv^8S$。本角二维矩为

$$2\int_0^{e_j}(2e_j-z)h_j(1-z/e_j)\,\mathrm{d}z=\tfrac{5}{3}e_j^2h_j.$$

须先乘回目标横宽 $T_j^{\perp}$ 及 (124) 前因子；标称乘积恰为

$$\frac{(1+v)^{n-1}5p_0(v)^4}{3n^2}v^7\frac{R_j^{n+1}}{R_i}.$$

两端主系数为 Γ；其他同轴反符号臂不交，共一轴或无共轴的臂分别多 v^2,v^4 的相对因子。帽偏移和横权转换由 d_e 支付，横宽平均误差更小。最后 (121) 和有限度给

$$v^7\sum d_eR_e^n\le Cv^4\sqrt{S\mathfrak{G}_N}\le\epsilon\mathfrak{G}_N+C_\epsilon v^8S.$$

这就是平方根误差只花八阶的原因。

正常成本与交量之差同时保留完整 $\mathfrak{G}_N$：二者及领先预算除以 $n^2(1+v)^{n-4}v^6R_e^n$，分别为 $D,\widehat{b}xy,\widehat{b}/27$，总误差 $O_T(v^8S)$。正常根比误差是 $O(v^3)$；把 $\widehat{b}$ 截成 b，因窄根端的横宽上界有 $\sum(\widehat{b}-1)_+R_e^n=O(v^{7/2}S)$，成本更高阶。故不能先只用饱和得到一个无速率 $d_e\to0$，再把反馈误差直接丢弃。

3.14.5 全二轴共同层、非正常折扣及两管次序

引理 3.28 (全部二轴联合价格)**.** 存在固定 $c_R, c_D > 0$，使对任意预定 $\chi > 0$，最后取小 v 时

$$\begin{aligned} &H_2 + c_R Z(K_{\text{all}}) + c_D v^6 D_{\mathcal{N}} \\ &\le [A_6(v) + \Gamma v^7]\mathcal{C} + \chi\mathcal{F} + Cv^8 S, \\ &H_2 = \sum_{q(e)=2} I_e - \sum_i J_i, \\ &A_6(v) = \frac{k}{(1+v)^2} v^6. \end{aligned} \tag{127}$$

其中 K_{all} 是固定大管，且 $\mathcal{N}, O_s, D_{\mathcal{N}}$ 均为上述同一正常集合及清洁分配。

证明. 先固定正常窗、其小管 K_N 及 (120) 的常数。再取大 T，随后取

$$0 < \mu_* \le \min(n/12, k/(16T)), \qquad C_{\text{soft}} \ge \max(1/\mu_*, 16T/k, 12/n, 1).$$

有界正常及有界非正常集合分别记为 $\mathcal{N}, \mathcal{B}_2$，后者满足 $\mu_* \le p, q \le T$。其余有界小角为 $\mathcal{D}$，长角 $\mathcal{L}$ 满足 $\max(p,q) > T$，边界单列。所有源和角保留；不按好根筛掉这些真实交量。

将 $\mathcal{N} \cup \mathcal{B}_2$ 的全部实际目标质量代入 (122)，使用同一个误差 $E_i(T)$、同一核心及排序，得一个共同实际禁层 $Y_{i,\text{all}}$。仅留下正常目标得原 $Y_{i,N}$。每个 $A_{ij} \ge 0$，因此

$$Y_{i,N} \subset Y_{i,\text{all}} \subset (x_i + W_i') \setminus F_i.$$

令 $B_N, B_{\mathcal{B}_2}$ 为这两类目标的完整名义成本，即在共同源核心对完整原目标横宽的高度先线性积分，再乘 $(1+v)^{n-1}v/a$；不先压成 b_e 倍。置 $R_{\text{all}} = (v/a)\sum |\mathscr{D}_i \setminus Y_{i,\text{all}}|$。正部单调且 1-Lipschitz，精确给

$$R_N \le R_{\text{all}} + (1+v)^{-(n-1)} B_{\mathcal{B}_2} \le R_{\text{all}} + B_{\mathcal{B}_2}. \tag{128}$$

此系数是一，不依赖 T, μ_*；同角两类层不需要互不相交。最后才选覆盖全部有界层的大管 K_{all}，有 $Y_{\text{all}} \subset \mathcal{C}(K_{\text{all}})$、$Z(K_{\text{all}}) \le R_{\text{all}}$。

只对这一个共同层使用一次 (108)，完整盈余给

$$\sum_i J_i \ge B_N + B_{\mathcal{B}_2} - \mathfrak{F}_N - \mathfrak{F}_{\mathcal{B}_2} + c_*(R_{\text{all}} + \mathfrak{E}) - C_T v^8 S.$$

正常退款按 (126) 和 (128) 控制；乘 v 的常数与 T 无关，因为正常核窗固定。非正常退款的核为 $C_T v^2/a$；将目标缺集分成 Y_N 和其余，用 $p, q \ge \mu_*$ 给每条完整成本至少 $c_m v^6 R_e^n$，得

$$\mathfrak{F}_{\mathcal{B}_2} \le C_{T,\mu_*} v (R_{\text{all}} + B_{\mathcal{B}_2}) + C_T v^8 S.$$

非正常全域强制性同时保留两份固定余量：

$$\sum_{\mathcal{B}_2} I_e - B_{\mathcal{B}_2} \le (1 - 2\gamma_\nu) A_6 W_{\mathcal{B}_2} - c_\nu' B_{\mathcal{B}_2} + C_T v^8 S. \tag{129}$$

这里 $\gamma_\nu, c_\nu' > 0$ 不依赖后选 T, μ_*。完整 D 成本与实际名义成本有固定双侧比较；非正常根比误差是 Cv 倍完整成本，由强制性的固定一份吸收，宽度和核心误差为绝对 $O_T(v^{17/2}S + v^8 S)$。

将 (120) 的 $b+D$ 正量分成小的两份，分别得到角权折扣和完整成本预留，不能将同一份全亏损使用两次。

小角不申请源盈余，其 gross 本身满足 $pq\le (k/16)\omega_e\le \frac14 k(1+v)^{-2}\omega_e$。边界原单源界给 $C[v^2\sum_{\text{邻边界}}\varepsilon_i R_i^n+v^4 S(\partial I)]$。由 $\mu_i\ge caR_i^n$、$W_i\subset W_i^0$、$\varepsilon_i aR_i^n\le C\varepsilon_i\mu_i=C(|W_i|-\mu_i)\le C|\mathscr{D}_i|$；把缺集分成 Y_N 和余量，再用边界邻端根权 $O(v^5S)$，该费至多 $Cv(R_{\text{all}}+B_{\mathcal{B}_2})+Cv^9S$。

还须支付所有长而退化的二轴角，且不让 T 依赖最后的大管。所有者取大根端，以原尺度记 $P=\max L/r_i, Q=\min L/r_i, H=\min(Q,PQ/v^2)$。目标保证帽两轴宽为固定倍数 Pr_i, Qr_i，其余取原整宽。任何正常层两轴支撑长度至多 $C_N v^3 r_j$，故

$$|Y_{j,N}\cap\mathcal{P}|\le C(v^3/P+v^2)|\mathcal{P}|. \tag{130}$$

若层轴对含长帽轴，由该轴取比例 Cv^3/P；若不含，至少一层轴在帽中取完整横宽 $\ge cvr_j$，给 Cv^2。此论证不除以任意小的 Q，常数不依赖 T。先取大 T 再小 v，正常层占目标帽不超过四分之一。若目标剩余缺量过大，全部交损由 $CvR_N\le Cv(R_{\text{all}}+B_{\mathcal{B}_2})$ 支付。面隙 / 端移例外由 $PQ\le CvH$ 给 $Cv(\mathcal{F}+\mathfrak{E})$。

其余长角取实际缺源条，长轴深度 $[c_2P,2c_2P]r_i$，短轴 $[c_3H,2c_3H]r_i$，其他轴留正常小管 K_N 的核心。同一原见证真实截宽后的目标量仍至少 car_i^nPQ/v^2，浅轴容量至多固定小倍数 ar_i^nH，故整条缺源。其成本至少

$$(v/a)|\mathcal{R}_e|\ge cr_i^nPQ\min(1/v,P/v^3)\ge cTI_e.$$

取 $T>4K_N/c_2$，该条避开正常小管及 Y_N。按源度数分配，长角总费至多

$$(C_L/T)R_N\le (C_L/T)(R_{\text{all}}+B_{\mathcal{B}_2}). \tag{131}$$

穿透比例、正常支撑常数、核心和度数均独立于 T,μ_*,K_{all}，所以 C_L 与后选 T 无关。长条无需避开覆盖全部有界层的大管：与非正常层重合的部分已经由 (128) 的完整成本预留支付。

现在先以小固定 ϵ 吸收正常退款的 $\mathfrak{G}_N$；选固定 T 使 C_L/T 小于 c_*,c'_ν 的预留份额，最后令 v 小吸收全部 $C_{T,\mu_*}v$ 项。剩下固定的 c_RR_{all}，并得

$$H_2+c_RZ(K_{\text{all}})\le[A_6+\Gamma v^7]W_N+(1-\gamma_\nu)A_6W_O+Cv\mathcal{F}+Cv^8S.$$

结合 (116)，价格右端至多

$$[A_6+\Gamma v^7]\mathcal{C}-[\gamma_\nu A_6+\Gamma v^7]D_{\mathcal{N}}+O(v^9S).$$

这给固定的 $c_Dv^6D_{\mathcal{N}}$，只用已预留的角权折扣，不重复消费付非正常层的完整成本份额。最后使 $Cv\le\chi$ 即得结论。二维空积、唯一角位及无高支撑的情形逐式成立；正常帽和长帽估计只余同一轴对，不需越界引用高维命题。全部局部参数按正常窗、小管、全域强制性、大 T、μ_*,C_{soft}、共同层与最后大管的顺序固定，最后才取小 v，没有两管阈值循环。　□

3.14.6　一次恢复与八层粗余项

命题 3.29 (八阶粗上包)**.** 对每个固定 $n\ge2$，有 $C_n(1-t)\le P_{7,n}(t)+O_n(av^8)$。

证明. 先在当前同一八层族的每个 $\ell=7,8$ 末层分别应用上述量化论证。两层各自使用本层的正常集合、槽空缺及共同层，不将第八层对象套到第七层。只需引理 3.23 的粗先验；特别无需先证明 $H_\ell/(v^6S)\to K_n$、$\mathcal{F}_\ell=o(v^6S)$ 或一个无速率缺源轮廓。有限两层的局部阈值可以在统一 A_8 和 CDF 后同时固定。

在引理 3.28 中先固定 $\eta<\min(c_R,c_D)/4$，用 (119) 支付全部高支撑，留正剩余得

$$H_\ell\le[A_6+\Gamma v^7]\mathcal{C}_\ell+\chi\mathcal{F}_\ell+Cv^8S.$$

这里单临界无正体积交，故完整 $H_\ell=H_2+\sum_{q(e)\ge3}I_e$，全部外部 pair 及完整盈余各只计一次。二维高支撑为空，正常 packet 的横积、核心均为空积；四槽容量由实际二维四胞论证取得，全部二轴共同价格直接逐式成立。因此没有从只为高维表述的几何声明越界推论二维。

完整实际槽容量的乘积和由宽度先验给

$$\mathcal{C}_\ell=\sum_i\sum_{q<r}R_i^2\prod_{\ell\neq q,r}(R_i+w_{i\ell})=B_n(1+v)^{n-2}\sum_iR_i^n+O(v^{7/2}S).$$

精确质量式和 $\Xi=O(v^6S)$ 给 $\sum_iR_i^n=(M'+\mathcal{D}_\ell)/a\le\mathcal{V}/A_v+O(v^6S)$。于是

$$H_\ell\le Q(v)\mathcal{V}+\chi\mathcal{F}_\ell+Cv^8S,\qquad Q(v)=K_nv^6[(1+v)^{-4}+(10/9)v(1+v)^{-2}].\tag{132}$$

槽容量误差乘主价为 $O(v^9S)$。此处使用完整槽的实际乘积，不把软接触权上界反向当成槽容量上界。

每层只恢复一次原免费面条，正体积至少 $c_{\mathrm{face}}\mathcal{F}_\ell$。取 $\chi<c_{\mathrm{face}}/8$。实际小源回收的盒内 dyadic 系数保留为 a，对该层有

$$(v/a)\sum_{\text{deep}}\delta_{i,\mathrm{in}}^{\mathrm{mass}}\le Cav\sum_i\varepsilon_ir_i^n+Cv^n\mathcal{F}_\ell\le Cv^{n+6}S+Cv^n\mathcal{F}_\ell.$$

盒外用同一个入向严格见证及半空间质量连续性，成本至多 $Cv\mathcal{F}_\ell$；边界局部小源界给

$$(v/a)\sum_{\partial I}\delta_i^{\mathrm{mass}}\le CavS(\partial I)=O(v^{n+6}S)。$$

环境另有 $Ca(\mathcal{F}_\ell+P_\partial)$，其 aP_∂ 项也是 $O(v^{n+6}S)$。固定突出边界价格仍留给图回收。最后取小 v，使 $\chi\mathcal{F}_\ell$、$Cv\mathcal{F}_\ell$、$Cv^n\mathcal{F}_\ell$、$Ca\mathcal{F}_\ell$ 各至多占同次收入的八分之一。合计只用半份恢复，不重复记入另一份免费面。$\mathcal{F}_\ell=0$ 时这些成本也全为零。所有 $n\ge2$ 的其余 $v^{n+6}S$ 成本均为 $O(v^8S)$。

在恢复后的实际并集上，Bonferroni 使用完整 H_ℓ，再用

$$(R_i+\mu_i^{1/n})^n\ge A_vg_i/a-C(v/a)(g_i-\mu_i)$$

及精确质量恒等式，扣掉物理 $\mathcal{D}_\ell$ 和环境量。重复量净系数至少 $1/(2a)$，小源和环境已由同次恢复支付。因此这两个末层都可选择并集误差上包

$$E_\ell=Q(v)\mathcal{V}+e_\ell,\qquad0\le e_\ell\le C_\ell v^8S,\qquad\ell=7,8.\tag{133}$$

未删除源缺量 $\mathfrak{d}_\ell^0$ 仍保留到望远镜。第六前缀只使用引理 3.21 的领先价，取 $E_6=[K_n+o(1)]v^6S$；前五层取 $E_h=C_0v^6S$。因此第七层只须重放上述量化价格，不必另加定性饱和假设。

对每层加入同一标记半盒和内部突出集，(72)–(76) 给同一公共左侧

$$\mathcal{V} \ge A_v M/a + c_{\mathrm{rec}} P_I - C_{\mathfrak{b}} P_\partial - 2nvS_I + c'_D \mathcal{D}_h/a - b(v/a)\mathfrak{d}_h^0 - E_h, \qquad c'_D = 1/2. \tag{134}$$

输入只计一次。内部精确式

$$(1-a)S_I + M_I - A_v M_I/a = (1-a)(S_I - M_I/a) - (A_v - 1)M_I/a$$

与共享质量、突出量给正回收及所写体积价格；源常数产生的 CvP_∂ 在最后小 v 时由纯维数预留吸收。

置 $\tau = bv/c'_D$、$\Omega_8 = \sum_{j=0}^{7} \tau^j$。使用 (106) 以 τ^{8-h} 加权，精确有

$$\sum_{h=1}^{8} \tau^{8-h}(c'_D f_h - bv f_{h-1}) = c'_D f_8 - bv\tau^7 f_0. \tag{135}$$

初端除 $a\Omega_8$ 为 $A_0 b^8 v^9 (M'/a)/((c'_D)^7 \Omega_8) = O(v^9 S)$。对 $\bar{E} = \Omega_8^{-1} \sum_h \tau^{8-h} E_h$，先减同一 $Q(v)\mathcal{V}$：

$$\bar{E} - Q(v)\mathcal{V} = \frac{e_8 + \tau e_7 + \tau^2[E_6 - Q(v)\mathcal{V}] + \sum_{h=1}^{5} \tau^{8-h}[E_h - Q(v)\mathcal{V}]}{\Omega_8}.$$

四类项分别为 $O(v^8 S)$、$O(v^9 S)$、$o(v^8 S)$、$O(v^9 S)$；第三项只需 (107) 的领先比较。图条件吸收边界及内部体积价格，f_8 和剩余回收非负，遂得

$$\mathcal{V} \ge A_v M/a - Q(v)\mathcal{V} - Cv^8 S - o(v^8 S).$$

零外部按零源口径，不定义空 CDF，内部计数给同方向。

由 $S/V \le (1-a)^{-1}$，直接移真实 M 得

$$1 + M/V \le \frac{A_v}{A_v - a(1+Q(v))} + O(av^8) + o(av^8).$$

与 $L_n = A_v/(A_v - a)$ 的精确差为

$$\frac{aA_v Q}{(A_v - a)(A_v - a - aQ)}.$$

因 $a = O(v^2)$，只须

$$Q = K_n v^6 - \tfrac{26}{9} K_n v^7 + O(v^8), \qquad A_v/(A_v - a)^2 = 1 - nv + O_n(v^2),$$

即得 $P_{7,n} + O_n(av^8)$。若全部输入 big-O 失败，可按上确界取输入使归一化余量趋于 $+\infty$，再以 $o(Vav^8)$ 的精度取外部紧集；该序列最终进入 (103)，与上述固定常数加逐序列小量矛盾。所有原正半径及尺度跨度均保留，不将固定输入的 little-o 与上确界交换。 □

3.14.7　竞争输入的正预算稳定性

以下进一步限制于任意固定 $B < \infty$ 的序列

$$1 + M/V \ge P_{7,n}(t) - Bav^8, \qquad v \downarrow 0. \tag{136}$$

同一 I、八层、原指定见证和统一 CDF 均保持不变。正常窗、清洁槽分配和前面共同层的固定阈值也先固定。随后出现的辅助有限窗只用于测试新的目标 packet。

引理 3.30 (八阶稳定预算)**.** 在第八层，可固定常数 C_*，使

$$\mathfrak{G}_N + B_{\mathcal{B}_2} + R_{\mathrm{all}} + R_N + \mathfrak{E} + \mathcal{F} + \mathcal{F}_{1/128} + v^6 D_{\mathcal{N}} + P_I + P_{\partial} \le C_* v^8 S. \tag{137}$$

其中正常层和 $\mathcal{F}_{1/128}$ 均取本层的原实际对象；$\mathcal{F}_{1/128}$ 包含固定窗口中全部具有该切向裕量的稳健面对。具体沿用 $\mathscr{E}_\tau$ 的稳健近面定义，$\mathcal{F}_\tau = \sum_{(i,p)\in\mathscr{E}_\tau} \Gamma_{ip} r_i^{n-1}$；固定窗口及有界重复次数均在八层统一常数之前取定。特别

$$\sum_{\mathcal{N}} d_e^2 R_e^n = O(v^2 S), \qquad D_{\mathcal{N}} = O(v^2 S).$$

常数不依以后选取的大角窗或尾份额。

证明. 重开引理 3.28 的同一次证明。(126) 的平方根误差用 Young 只花 $\mathfrak{G}_N$ 的一个固定小份额。(120) 的 $b+D$ 另分固定份额，分别保留完整 $B_{\mathcal{B}_2}$、非正常角权折扣和退款吸收。长条的 C_L/T 先取小，其余 $C_{T,\mu_*} v$ 最后取小；由 (128)，这仍保留固定正系数的 $R_{\mathrm{all}} + \mathfrak{E} + v^6 D_{\mathcal{N}}$。故对固定正 c_j，原联合证明给

$$H_2 + c_1 \mathfrak{G}_N + c_2 B_{\mathcal{B}_2} + c_3 R_{\mathrm{all}} + c_4 \mathfrak{E} + c_5 v^6 D_{\mathcal{N}} \le [A_6 + \Gamma v^7]\mathcal{C} + Cv\mathcal{F} + Cv^8 S.$$

先固定 $\eta_0 < \min(c_3, c_5)/16$，再用引理 3.27，高支撑只占其固定小部分。因 $Z(K_{\mathrm{all}}) \le R_{\mathrm{all}}$，全部正量仍有固定份额。

普通面条和固定稳健面条各有实际正体积下界。二者即使重叠，其并集至少为两个下界的各一半之和；有限多个候选组也可用固定正权平均。条均避开 $\bigcup X_i$ 及标记部分，位于原源的 $Q(x, R_i)$ 内，环境仍由原固定面邻居控制。于是同一次恢复可保留正的 $\mathcal{F} + \mathcal{F}_{1/128}$。全部 $Cv\mathcal{F}, Cv^n\mathcal{F}, Ca\mathcal{F}$ 支出合并，最后小 v 时只占其固定小份，不能逐项重用整份面收入。

将这些正量保留在第八层的 (134)，以原八层权平均，末层权 $1/\Omega_8 = 1 + O(v)$，不损失固定正系数。每层公共的内部收入按 (86) 支付边界和 $2nvS_I$ 后仍留固定正的 P_I；内部精确式的 $1-a$ 不变。故以 $\mathcal{L}$ 记所列源 / 面正量，有

$$(1+Q)\mathcal{V} - A_v M/a \ge c_P P_I + c_L \mathcal{L} - Cv^8 S - o(v^8 S).$$

(136)、真实比值恒等式及 (107) 给公共左侧 $O_B(v^8 S)$。所以 $\mathcal{L} + P_I = O(v^8 S)$，原图再给 $P_\partial = O(v^8 S)$。最后用 (128) 得 R_N 的界，用 (121) 得参数平方界。本证明只使用已证粗上包，没有使用下面的新八阶价格。 □

3.14.8　薄轴帽、整源坐标与两次实际反馈

以后固定任意有限 T，选取两端深处、两交长不超过 $Tv^3 R_e$ 的目标 packet $\mathscr{P} \supset \mathcal{N}$。所有帽、根、盒和目标清单固定；测试缺集的变化不重定义几何。记 $\eta_h = |\mathscr{D}_h \setminus Y_{h,N}|$。

引理 3.31 (只扣 raw 的轴帽)**.** 在深处源 i 的有效浅面深度 s 上，同一个原指定见证使所有 *packet* 帽的实际质量先相加后满足

$$s \ge \frac{\sum_{j\in\mathscr{P}} |F_j \cap \Pi_{ij}(y)|}{naR_i^{n-1}} - C_T e_i, \qquad e_i = v^8 R_i + \Delta_i + \max_{h \text{ 面邻}} (g_{i\to h} + \eta_h/\beta_h), \tag{138}$$

其中 $\beta_h \asymp (vR_h)^{n-1}$，且

$$\sum_i R_i^{n-1} e_i \le C[v^8 S + R_N + \mathfrak{E} + \mathcal{F}] = O(v^8 S).$$

该式也适用于全局最浅轴不在某个目标轴对的点。

证明. 真正面邻居 h 的原始整横截面帽 $C_h(d)$ 中，旧正常层占比至多

$$\theta_N(v) = \frac{2(n-1)K_N}{c_w} v^2 + \frac{4\binom{n-1}{2} K_N^2}{c_w^2} v^4.$$

轴对含帽轴时，另一短轴在原整宽中只占 $O(v^2)$；不含时两条短轴各给此因子。有效面位移只移动短区间，不增加其长度。故此比例对任意小 d 一致，令 $\beta_h = (1-\theta_N)\prod_{\ell \ne q} w_{h\ell}^0$，有

$$|F_h \cap C_h(d)| \ge [\beta_h \min(d, w_{hq}^0) - \eta_h]_+.$$

完整横截面的捕获由真正面邻居的固定切向裕量保证，对所有源点及原半径均成立。若保证深度达到全宽，整个 F_h 与 G_i 同时进入见证，其质量为 caR_i^n，超过 $O(avR_i^n)$ 剩余容量；所以实际见证不在饱和分支。

写 $\ell = r(x) - R_i$、$b = s + g_{i\to h} + \Delta_i$。原始 / 有效面对端精确距离为 $R_i + s + g_{i\to h} + \delta_i^+ - \delta_h^-$；目标端移只改善捕获。轴帽保证深度至少 $(\ell - b)_+$。容量 $C_i(\ell) = a[(R_i+\ell)^n - R_i^n]$ 在整个原半径区间的导数严格小于 β_h。因此容量减轴帽在转折 $z = b + \eta_h/\beta_h$ 前增后减，最多为 $C_i(z)$；z 超过原半径区间时仍由容量单调性成立。正常缺层只降低轴帽斜率，平移只扣 η_h。原宽和 $\eta_h \le |B_h^0|$ 还给 $z = O_T(vR_i)$，故比较 $C_i(z)$ 与 $C_i(s)$ 时容量导数仍为 $O(aR_i^{n-1})$。

角帽从中点锚移到源有效端至多损 Δ_i，移到目标原端只改善。若 $\ell \le s$，总帽边带损失至多 $D_{i,T}(s - \ell + \Delta_i)$，其中 $D_{i,T} \le C_T v^{n+1} R_i^{n-1} < naR_i^{n-1}$；容量斜率比较给总实际帽质量至多 $C_i(s) + D_{i,T}\Delta_i$。若 $\ell \ge s$，先将全部角目标、真正浅面邻居和自身 G_i 在同一见证中相加，再用上述转折点，给

$$\sum_j |F_j \cap \Pi_{ij}(y)| \le C_i(s) + CaR_i^{n-1}(g_{i\to h} + \Delta_i + \eta_h/\beta_h) + D_{i,T}\Delta_i.$$

各 F_j 排他，面邻居不同于二轴目标。高度窗 $s = O_T(v^4 R_i)$ 中 $C_i(s)/(naR_i^{n-1}) = s + O_T(v^8 R_i)$，得到必要式。有限面逆度给 $\sum R_i^{n-1} \max_h \eta_h/\beta_h \le Cv^{1-n}\sum \eta_h = CR_N$，其余项由稳定预算控制。 □

在有效盒 $B_i' = x_i + W_i'$ 中，先选各轴最近面符号 σ，再选全局最浅轴 q，平局按固定顺序。令

$$x_h = f_{ih}^{\sigma_h} - \sigma_h(s + y_h), \quad y_q = 0, \qquad \Omega_{i,q,\sigma} = \prod_{h\ne q}[0, w_{ih}'/2], \quad H_i(y) = \min_h(w_{ih}'/2 - y_h).$$

这些 Jacobian 为一的 chart 覆盖整个有效盒至零测分界，并保留所有三近面。仅取临界朝向与 σ 匹配的目标；反向面的深度至少半个源宽，不产生本高度窗的正标称帽。$\Pi_{ij}(y)$ 在原始目标盒的两临界宽为

$$\min(w_{jl}^0, (P_{ij,l} - y_l)_+), \qquad \min(w_{jm}^0, (P_{ij,m} - y_m)_+),$$

其余取原始整宽，其中 $P_{ij,h}=(L_h+c_{ij})_+$。真实全宽截断在定义中保留；固定 T 后小 v 时自动不活跃。令

$$h_i^0(y)=\frac{\sum_j|\Pi_{ij}(y)|}{naR_i^{n-1}},\qquad \mathcal{K}_i(E;y)=\frac{\sum_j|E_j\cap\Pi_{ij}(y)|}{naR_i^{n-1}},$$

$$\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(E)_i=\bigcup_{q,\sigma}\{x(s,y):0\le s<\min(H_i(y),[h_i^0(y)-\mathcal{K}_i(E;y)]_+)\}. \tag{139}$$

输入 E_j 始终在原始目标盒，输出是其中的有效源子集。Tonelli 保证可测性；测试 E 不改变根、锚、clip 或目标清单。

引理 3.32 (整源小算子与两次反馈)**.** 对任意测试集合族，

$$E\subset F\Longrightarrow \mathscr{B}_{\mathscr{P}}(F)\subset\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(E),\qquad \|\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(E)-\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(F)\|_1\le C_Tv\|E-F\|_1.$$

取 $Y_0=\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(0)$、$Y_1=\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(Y_0)$、$Y_2=\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(Y_1)$。存在真实保证层 $B^-\subset\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(\mathscr{D})\cap D'$，使

$$\sum_i J_i\ge(1+v)^{n-1}\frac{v}{a}\sum_i|Y_{2,i}|+c\frac{v}{a}\sum_i|\mathscr{D}_i\setminus B_i^-|+c\mathfrak{E}-O_T(v^9S). \tag{140}$$

退款的实际缺集可换成 Y_1，价格误差 $O_T(v^9S)$。

证明. 正部及 $u\mapsto\min(H,u)$ 为 1-Lipschitz。打开 Tonelli 固定一个目标物理点：若 q 在其轴对内，可覆盖它的源 base 测度至多 $C_T(v^3R_i)(vR_i)^{n-2}$；否则为 $C_T(v^3R_i)^2(vR_i)^{n-3}$。各除以本源的 naR_i^{n-1}，分别为 C_Tv, C_Tv^3。有限逆度给全族物理 L^1 小常数，二维后一类为空。名义高度积分给 $|Y_0|_1\le C_Tav^5S$。

旧正常实际层 $Y_{i,N}$ 的浅轴深为 $O(v^4R_i)$，伴随轴为 $O(v^3R_i)$，其他轴在旧核心内。它在新 chart 中仍是同一排序、同一原始目标帽；新高度包含旧全部非负实际质量且未扣旧侵蚀。因此 $Y_{i,N}\subset\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(\mathscr{D})_i$ 精确成立。(138) 的侵蚀 C_Te_i 只在正帽 base 有损失，该 base 测度至多 $C_Tv^{n+1}R_i^{n-1}$，故物理总损失 $e=O_T(av^9S)$。减此侵蚀得 $B^-\subset D'$，并有

$$\rho:=\|\mathscr{D}-\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(\mathscr{D})\|_1\le(a/v)R_N+e=O_T(av^7S).$$

未使用源取空算子及空旧正常层，原 raw 仍在该全族界内。

记 $\lambda=C_Tv$、$M_0=|\mathscr{D}|_1=O(av^5S)$。反单调性给 $Y_1\subset Y_2\subset Y_0$，且

$$\|\mathscr{D}-Y_0\|_1\le\rho+\lambda M_0=O_T(av^6S),\quad \|\mathscr{D}-Y_1\|_1\le\rho+\lambda(\rho+\lambda M_0)=O_T(av^7S).$$

故 $\|\mathscr{B}_{\mathscr{P}}(\mathscr{D})-Y_2\|_1=O_T(av^8S)$。乘源导数 Cv/a 给成本误差 $O_T(v^9S)$；退款核为 C_Tv^2/a，故换成 Y_1 也只损此阶。这里不能将全部 $\mathscr{D}$ 换成 Y_2 后丢掉 raw 余量。对 B^- 使用 (108) 一次：侵蚀成本为 $O_T(v^{10}S)$，导数 epsilon 损失至多 $C_Tv^6\sum\varepsilon_iR_i^n=O_T(v^{11}S)$。层成本、raw 和端移由同一份完整 J 同时分配，得到所述式。 □

3.14.9　正常 packet 的实际八阶积分

本小节取 $\mathscr{P}=\mathcal{N}$，给相应迭代加下标 N。记 $s_v=(1+v)^{n-1}$、$\lambda_v=s_vv/a$，并定义未扣任何实际盈余的模型价格

$$\mathsf{P}_N=\sum_{e\in\mathcal{N}}I_e-\lambda_v\sum_i|Y_{2,N,i}|.$$

这与只取正常交量后再减全体 J_i 不同。令

$$Q_4(p,q)=\frac{pq(p^2+3pq+q^2)}{3},\qquad Q_5(p,q)=\frac{pq(p+q)(5p^2+29pq+5q^2)}{24},$$
$$F(p,q,z)=\tfrac12\{(p+z)(q+z)(p+q+2z)+(p-z)(q-z)(p+q-2z)\}.$$

引理 3.33 (实际源成本及正常模型价)**.** 沿 (136)，

$$\lambda_v\sum_i|Y_{2,N,i}|=\sum_{e\in\mathcal N}s_vR_e^n\Big[\frac{v^6}{n}F(p,q,z)-\frac{2v^7}{n^2}Q_4(p,q)+\frac{2v^8}{n^3}Q_5(p,q)+\frac{n-2}{n}v^8p^2q^2\Big]+o(v^8S).\tag{141}$$

并有

$$\mathsf P_N\le q_N(v)W_N+o(v^8S),\qquad q_N(v)=\frac{kv^6}{(1+v)^2}+\frac{\Gamma v^7}{(1+v)^3}+kc_{8,n}v^8,\tag{142}$$
$$c_{8,n}=-\frac{13}{18}-\frac{n(n-2)}{3}+\frac{400}{243}.$$

所有三近面源项都已包含；二维相应项为空。

证明. 先保留真实源、目标整横宽。对全局最浅轴在目标轴对内的两个排序，名义成本为

$$\frac{\lambda_vS_i^\perp T_j^\perp}{2naR_i^{n-1}}P_{ij}Q_{ij}(P_{ij}+Q_{ij}),\qquad S_i^\perp=\prod_{\ell\perp}w'_{i\ell},\quad T_j^\perp=\prod_{\ell\perp}w^0_{j\ell}.$$

最浅轴 q_0 不在该轴对内时，两个临界底变量独立，单向名义成本为

$$\frac{\lambda_vT_j^\perp}{naR_i^{n-1}}\sum_{q_0\perp}2\prod_{h\notin\{l,m,q_0\}}w'_{ih}\,\frac{P_{ij}^2Q_{ij}^2}{4}.$$

系数二来自该最浅轴的两个最近面。标称宽和正常根比下，两有向端的后式正是

$$(n-2)s_vv^8R_e^np^2q^2/n。$$

它的退款核为 $O(v^3)$，乘 $|Y_1|_1=O(av^5S)$ 及源导数后仅为 $O(v^9S)$，故名义三近面成本必须保留，三近面退款可以入余项。

整个源纤维上截断不能直接删去。某名义目标非零时，其临界底变量为 $O(v^3R_i)$；总高度为 $O(v^4R_i)$，所以顶端截断只可能来自非临界自由底变量靠近源中分面的宽 $O(v^4R_i)$ 边带。该名义项独立于该变量，相对积分损失为 $O(v^3)$。乘六阶名义成本后为 $O(v^9S)$，多个目标相加也有同一高度上界。无截断时高度对目标质量线性，且任意测试缺集都是原盒子集，所以近零帽也没有负高度或相对展开问题。

固定一条正常帽。在目标的中央横截面上，同角正常目标唯一；其他轴对需要额外坐标近面，同轴反符号角则有完整源宽间隔。非中央横向区域中，距某面 $O(v^4R_j)$ 的比例为 $O(v^3)$；其余近面带的比例为 $O(v^2)$，而 $Y_1\subset Y_0$ 再强迫帽内某法向深度为 $O(v^4R_j)$，相对帽宽多 $O(v)$。故非中央 Y_1 帽质量为 $O(av^7R_j^n)$，退款仅为 $O(v^9R_j^n)$。中央 Y_1 所见 Y_0 的其他角也只有上述质量；经一次高度分母及中央底面积作用，改变 Y_1 帽质量为 $O(av^8R_j^n)$，再次反馈为十阶。因此八阶退款可用同一边的两个真实不同帽计算，不能将两个方向先设为相同。

这里的宽度替换按 L^1 而非逐源小误差进行。平面分母 $naR_i^{n-1}/T_j^{\perp}$ 除以 v^2R_e 在固定正紧区间；子图的 1-Lipschitz 性给宽度变化的物理误差 $Cav^5(\xi_i+\xi_j)R_e^n$。名义成本和退款的总宽度误差分别为 $Cv^6\sum \xi_i R_i^n = O(v^{17/2}S)$ 和更小量。正常根比的系数替换为 $O(v^9S)$，但帽中的实际根差仍保留。目标有效锚移回原始锚另付端移：每张图高度随底变量单调不增，子图周长至多 $C(vR_i)^{n-1}$，有限线性 chart 变换只改常数。故平移物理误差至多 $C\sum (vR_i)^{n-1}\Delta_i$，退款为 $Cv\mathfrak{E}=O(v^9S)$。

现给双帽所需的一致截面计算。取尺度 e，$P/e, Q/e$ 在固定正紧区间，$|c|\le \nu e$、$e/f \ll 1$，令 $P_\pm = P \pm c, Q_\pm = Q \pm c$。方向 t 的首轮平面层 U_0^t 在排序 $X \le Y$ 中满足 $X \le P_t(Q_t-D)_+/f$，$D = Y - X$，另一排序交换两轴。下一层 U_1^t 的高度扣除相反方向 U_0^s 在 $[0,P_t]\times[0,(Q_t-D)_+]$ 中的实际帽质量再除 f。这些集合保留真实排序和正部。记

$$M_{1,\pm}(c) = \int_{U_1^{\mp}\cap([0,P_\pm]\times[0,Q_\pm])} (P_\pm + Q_\pm - X - Y)\,\mathrm{d}X\,\mathrm{d}Y.$$

则

$$M_{1,+}(c) + M_{1,-}(c) = \frac{2Q_4(P,Q)}{f} - \frac{2Q_5(P,Q)}{f^2} + O\!\left(\frac{e^2c^2}{f} + \frac{e^4|c|}{f^2} + \frac{e^6}{f^3}\right). \tag{143}$$

为核一致性，首轮面积和自矩精确为

$$|U_0(P,Q)| = \frac{PQ(P+Q)}{2f}, \qquad M_0 = \frac{Q_4(P,Q)}{f} - \frac{P^2Q^2(P+Q)}{3f^2}.$$

暂去外帽裁剪，双向和在 $c\mapsto -c$ 下不变，是二阶导数有界于 Ce^2/f 的光滑多项式。较小外帽只切长臂远端；距端距离 d 的截厚至多 $C(e/f)d$，带核 $O(e)$ 积分 $0\le d\le 2|c|$ 给 Ce^2c^2/f。这包括 c 远大于、可比于或小于薄高 e^2/f 的全部情形。

再算首轮到下一轮的矩减少量。令 $m = m_{0,s}(P_t,r) = |U_0^s\cap([0,P_t]\times[0,r])|$，$S_{\mathrm{cap}} = P_s+Q_s$。在目标第一排序置 $r = Q_t - D$，高度由 P_tr/f 减为 $(P_tr-m)/f$；故减少量恰为

$$\frac{1}{f}\int_0^{Q_t} (S_{\mathrm{cap}} - Q_t + r)m\,\mathrm{d}r - \frac{1}{f^2}\int_0^{Q_t}(2P_trm - m^2)\,\mathrm{d}r.$$

因 $m\le Ce^3/f$，第二积分为 $O(e^6/f^3)$。两个固定排序的高度参数导数为 $O(e/f)$，末段又有三角尾界，因此

$$|U_0(P_s,Q_s)\triangle U_0(P,Q)| \le Ce^2|c|/f.$$

帽宽改变的竖条也在此界内，对任意小 r 均成立。代入上式的长度、核和 $1/f$，只花 $Ce^4|c|/f^2$。外帽对减少集的裁剪因该集包含于 U_0，仍由同一长臂尾界控制。

在 $c=0$ 时，用 Tonelli 计算减少量，核为

$$W_Q(Y) = P(Q-Y) + (Q^2-Y^2)/2$$

及交换两轴的 W_P。两个排序在线性薄高积分中置薄变量为零，误差 $O(e^6/f^3)$，主多项式为 $PQ(P+Q)(5P^2+21PQ+5Q^2)/24$。加上 M_0 已有的 $P^2Q^2(P+Q)/3$，中间系数为 29，即得 Q_5 和 (143)。实际尺度 $P=v^3R_ep, Q=v^3R_eq, c=v^3R_ez, f=nv^2R_e$ 使其完整退款误差为

$$C[v^7z^2 + v^8|z| + v^9]R_e^n.$$

稳定性平方界和 Cauchy 给其全族和 $O(v^{9}S)$，未把 RMS 偷换为逐边 $z=O(v)$。合并名义两排序、三近面项和双帽退款，证明 (141)。

最后作点态紧窗最大化。除以 $n^{2}(1+v)^{n-4}v^{6}R_{e}^{n}$，单边净泛函是

$$\frac{b}{27}-G(b,x,y,\zeta)+\frac{2v}{1+v}Q_{4}(x,y)-\frac{2v^{2}}{(1+v)^{2}}Q_{5}(x,y)-\frac{n(n-2)v^{2}}{1+v}x^{2}y^{2}.$$

横权 $1-b$ 及根差平方有固定正罚，扰动不含这两个变量，所以先在 $b=1,\zeta=0$ 求最大并保留其部分罚。固定二次强制性与扰动的 Cv-Lipschitz 界迫使最大点距基点为 $O(v)$。只对这些最大点写 $x=1/3+vh_{1},y=1/3+vh_{2}$，实际场不作逐点 Taylor。由 $Q_{4}(1/3,1/3)=5/243$、其两偏导 $10/81$，二阶优化为

$$\begin{aligned}&-\frac{h_{1}^{2}+h_{1}h_{2}+h_{2}^{2}}{3}+\frac{20}{81}(h_{1}+h_{2})\\&\quad=\frac{400}{6561}-\frac{(h_{1}-20/81)^{2}+(h_{1}-20/81)(h_{2}-20/81)+(h_{2}-20/81)^{2}}{3}.\end{aligned}$$

$Q_{5}(1/3,1/3)=13/972$ 和三近面项分别给 $-13/18$、$-n(n-2)/3$ 的相对系数，位移增益为 $400/243$。将结果转成实际 W_{N} 时，首退款与横权差为 $O(v)(1-b)$，由保留的领先罚吸收；$\widehat{b}$ 截为 b 的总差更晚。因而得到 (142)。首退款的因子是 $(1+v)^{-3}$，八阶不能将其换成一。 □

3.14.10　二维小半径源的常数一回收

二维尚有同阶的盒内小源费用。以下局部引理处理原见证跨盒边界的情形。

引理 3.34 (角窗中的精确局部费用)**.** 设矩形 $\mathcal{R}$ 各边介于 cL,CL，$T\subset\mathcal{R}\setminus E$、$Z\subset\mathcal{R}$ 可测。Z 位于四角边长 ϵL 的块内，且

$$D=\mathcal{R}\setminus T,\quad z=|Z\setminus T|,\quad d=|D\setminus Z|,\qquad |Z|,d\le bL^{2}.$$

若 $b,\epsilon\to0$、$\sqrt{b}/\epsilon\to0$，任意可测的 $\mathcal{S}\subset T$ 的原严格见证半径取有限正值并满足 $r(x)\le AL$ 时，

$$|\mathcal{S}|\le\frac{a}{1-a}z+C_{c,C,A}ad.$$

价格常数不依最小原半径或有限列表长度。

证明. 从整个 $\mathcal{S}$ 而非有限 probe 中按半径值降序选尚未被此前闭 Q 覆盖的中心。新中心与旧中心距大于两个半径最大值。有界性和本次正最小半径的 packing 保证有限终止，因此原 Q 覆盖全部 $\mathcal{S}$。选中数可依最小半径，价格不使用这个数界。正式引理 2.4 已使全局原函数为有限正值 Borel 函数；限制到这里的可测集合不改变半径，所以没有对一般可测函数假设正下界。

严格见证给 $|Q(x,r)\cap T|<ar^{2}$。若 $r\ge\ell_{\min}$，盒内交面积至少 $\ell_{\min}^{2}$，而 $|D|\le2bL^{2}$、$r\le AL$，小参数时矛盾。所以 $r<\ell_{\min}$，每轴盒内交长至少 r，从而

$$(1-a)r^{2}<|D|\le2bL^{2},\qquad r=o(\epsilon L).$$

这是每一点的原半径结论，未要求原 Q 全在盒内。

将四角窗扩大到边长 $2\epsilon L$，并为 V。每角分别作上述全点选择，对每个选中中心取向盒内的 $P=x+\sigma[0,r]^2$。它在盒内且仍落于该角 $3\epsilon L$ 块。同符号两 P 不交：实现强中心分离的某轴中心距大于两个半径，故该轴的同向区间不交。不同角的 $3\epsilon L$ 块也分离。所以近角的所有 P 物理不交，且 $|P\cap D|\ge(1-a)r^2$。用原 Q 的全点覆盖得

$$|\mathcal{S}\cap V|\le\sum|Q\cap T|<a\sum r^2\le\frac{a}{1-a}|D|=\frac{a}{1-a}(z+d).$$

远角源点到 Z 至少 ϵL，其原 Q 与 Z 不交。按两个坐标位于盒中点哪侧分四组，每组取朝中心的固定符号。半个盒宽足以容纳 r，故对应 $P\subset\mathcal{R}\setminus Z$；每组全点选择后 P 仍不交，四组仅向 residual 收费：

$$|\mathcal{S}\setminus V|\le 4a\,d/(1-a).$$

合并给 $az/(1-a)+5ad/(1-a)$。正常 z 没有四倍重数。有限选择不要求局部集合紧，所有集合均可测。 □

引理 3.35 (实际删除量及基线导数)**.** 在同一二维第八层，

$$(1+O(v))\frac{v}{a}\sum_{\text{deep}}\delta_{i,\text{in}}\le(2K_2+O(v))v^8S,\qquad K_2=4/27. \tag{144}$$

边界、环境及深处盒外费用分别为 $O(v^{10}S),O(v^{10}S),O(v^9S)$。实际基线中的删除系数可单独保留为 $1+O(v)$，原重复量正预算及源缺量望远镜不变。

证明. 取原入向面邻构成的扩展盒 $\mathcal{R}_i$，仍各边可比于 vr_i，并记

$$q_i=|\mathscr{D}_i\setminus Y_{i,N}|+|\mathcal{R}_i\setminus(x_i+W_i^0)|.$$

入向扩张体积及稳定预算给 $\sum q_i\le(a/v)R_N+Cv\mathcal{F}=O(av^7S)$。坏盒 $q_i>av^5r_i^2$ 的原权为 $O(v^2S)$。对它们只用原 dyadic 引理和 $F_i\subset T_i$，其 inside 总量为

$$Ca\sum_{\text{bad}}(|Y_{i,N}\setminus T_i|+q_i)=O(a^2v^7S).$$

该项乘 v/a 后为十阶，不污染领先系数。

好盒上 $|\mathscr{D}_i|\le Cav^5r_i^2$，$\varepsilon_i\mu_i\le|\mathscr{D}_i|$ 给 $\varepsilon_i\le Cv^5$。中点正盈余给端移 $\Delta_i\le C\varepsilon_ivr_i\le Cv^6r_i$；扩张面积除以原盒另一轴宽给每侧扩张长度也为 $O(v^6r_i)$。所以旧正常层确在扩展盒的四个 $C_Nv^3r_i$ 角窗内。取上引理的 $L=vr_i,b=Cv^5,\epsilon=C_Nv^2$，$\sqrt{b}/\epsilon=O(v^{1/2})\to0$，并有 $|(\mathcal{R}_i\setminus T_i)\setminus Y_{i,N}|\le q_i$。原小半径仍小于 Avr_i，引理还逐点推出其为 $O(v^{7/2}r_i)$。故

$$\sum_{\text{deep}}\delta_{i,\text{in}}\le\frac{a}{1-a}\sum_i|Y_{i,N}\setminus T_i|+Ca^2v^7S.$$

正常层体积的领先常数只需名义两端积分：二维有向两排序面积为 $PQ(P+Q)/(4aR_i)$。在 $p=q=2/[3(1+v)],z=0$，无向两端除 $av^5R_e^2$ 为 $8/[27(1+v)^3]$。稳定性给加权参数平方差 $O(v^2S)$，Cauchy 给一阶差 $O(vS)$；紧窗积分 Lipschitz，因而

$$\sum_i|Y_{i,N}|\le2K_2av^5\sum_{\mathcal{N}}R_e^2+O(av^6S)\le(2K_2+O(v))av^5S.$$

最后用二维实际四槽 $\mathcal{C}=\sum R_i^2\le S$。乘 v/a 即得 (144) 的体积部分；未借正常八阶积分。

稳定性保留的 $P_I+P_\partial=O(v^8S)$ 给精确边界小源式 $(v/a)\sum_{\partial I}\delta_i\le CaP_\partial=O(v^{10}S)$；环境 $Ca(\mathcal{F}+P_\partial)$ 同阶，盒外为 $Cv\mathcal{F}=O(v^9S)$。

最后必须核基线系数。令 $m_i^0=|T_i|$、$\delta_i=m_i^0-\mu_i$、$f_i(m)=(R_i+\sqrt{m})^2$，实际质量给 $(1-Av)g_i\le\mu_i\le m_i^0\le g_i=aR_i^2$。在整个真实区间，

$$\frac{f_i'(m)}{v/a}=v+\frac{vR_i}{\sqrt{m}}\le v+(1-Av)^{-1/2}\le 1+(1+2A)v.$$

故一次真实积分可拆为

$$f_i(\mu_i)\ge A_v g_i/a-(1+O(v))(v/a)(g_i-m_i^0)-(1+O(v))(v/a)\delta_i.$$

$\sum(g_i-m_i^0)=\mathcal{D}_h+\mathfrak{d}_h^0$ 仍精确；环境扣一次 $\mathcal{D}_h$ 后其正系数至少 $1/(2a)$。只对 $\mathfrak{d}_h^0$ 使用原固定 b 及 (106)，删除量单列不被 b 放大。$|X_i|\ge f_i(\mu_i)+J_i$ 与 Bonferroni 仍给 $\sum f_i(\mu_i)-H_h$，所以 J 和删除质量各只计一次。 □

3.14.11　对称斜格孔与两次角反馈

命题 3.36 (宏观孔的有限输入构造)**.** 对每个充分小的 $t>0$，存在有界有限正测度输入 E_t，使

$$\frac{|\mathcal{H}_n(1-t;E_t)|}{|E_t|}=P_{7,n}(t)+J_n a v^8+O_n(av^9).\tag{145}$$

证明. 置 $u=t^{1/n}$、$g=(1+2u)^{-1}$，取

$$e=\kappa u^3,\quad T=(1-e)I+eJ,\quad d=\det T,\quad w=ug+\Lambda u^6,\quad \rho=1-2w,\quad M=a\rho^n,$$

其中 J 为全一矩阵。先把 κ 限于一个固定正紧区间、Λ 限于固定有界区间，下面所有误差在该区间上一致；最后给出参数并先选固定安全常数、再取小 u。在 $C_w=[-w,w]^n$ 上，对每个 x 用同一规则

$$\begin{aligned}&s=w-\|x\|_\infty,\quad r=\rho+s,\\&F(s)=\frac{a}{(2w)^{n-2}}[(\rho+s)^n-\rho^n],\\&f=F'(0),\quad h=e^2/f,\quad \delta=h/e.\end{aligned}$$

有 $f=4nu^2g[1+O_n(u^5)]$、$h=O_n(u^4)$、$\delta=O_n(u)$。

先完整排除其他邻孔。因 $r+w=1-\|x\|_\infty$、$\|Tk\|_\infty\ge(1-(n-1)e)\|k\|_\infty$，小 u 时外包孔分离且 $\|k\|_\infty\ge2$ 的孔不能进入。对 $k\in\{-1,0,1\}^n$，若 $\sum k_l\ne0$，取与和同号的非零坐标，其格中心模为 $1+e(|\sum k_l|-1)\ge1$，至多边界接触。只有非零平衡指标 $\sum k_l=0$ 进入，支撑大小 j 为偶数，$Tk=(1-e)k$，各支撑交长至多 e，其余取整宽。又 $r\ge\rho>2w$，故自身全孔始终包含。

对任何 Borel 删除集 $U\subset C_w$，在整个外包孔定义

$$R_U(x)=\frac{1}{(2w)^{n-2}}\sum_{k\ne0}|(Tk+(C_w\setminus U))\cap Q(x,\rho+s)|,$$

$$\mathcal{B}(U)=\{x\in C_w:s=0\ \text{或}R_U(x)\ge F(s)\}.$$

有限邻孔清单和方体平移、变半径的对称差连续性保证这些坏集为 Borel。映射 $\mathcal{B}$ 反单调，置

$$U_0=\mathcal{B}(\varnothing),\qquad U_1=\mathcal{B}(U_0),\qquad U_2=\mathcal{B}(U_1). \tag{146}$$

则 $U_1\subset U_2\subset U_0$，从而 $\mathcal{B}(U_2)\subset U_2$。所以只要 $(2w)^n-M>|U_2|$，任何在 $C_w\setminus U_2$ 中选出的质量 M 的孔都具有严格见证。每次容量仍用同一个实际自身质量 M，无需求未知孔形的固定点。

所有归一化外包项至多 e^2，数目少于 3^n，故三坏集内点的 $s\le h_H:=F^{-1}(3^ne^2)\le 3^nh$。忽略零测并列面，选全局最浅轴 i，在固定符号区内写 $d_l=w-|x_l|=s+y_l$、$y_i=0$。雅可比为一。活动支撑只能朝相同源面符号，穿透为 $(e-y_l)_+$，目标交集相对于面对端的区间不随 s 变；非支撑方向全宽进入。因此可将它记为 $R_U(y)$，实际坏层厚度是

$$\min\{F^{-1}(R_U(y)),\,w-\max_{l\neq i}y_l\}.$$

计算 $|U_2|/a$ 到 u^7 时，可统一替换为 $R_{U_1}(y)/f$，绝对误差 $O_n(u^8)$。具体地，$F'(s)/f=1+O_n(u^4)$，外包支撑 j 的积分在最浅轴位于支撑内、外时，分别至多

$$O_n\!\left(\frac{(2w)^{2-j}e^{2j-1}w^{n-j}}{af}\right)=O_n(u^{4j-3}),\quad O_n\!\left(\frac{(2w)^{2-j}e^{2j}w^{n-1-j}}{af}\right)=O_n(u^{4j-1}).$$

总量为 $O_n(u^5)$，$j\ge 4$ 仅从 u^{13} 起。若 $y_l>w-h_H$ 触发厚度截断，该轴必在所计支撑外，否则 $y_l>e$ 使交量零。逐项外包积分在该轴恒定，截去的边带只损相对 $O_n(h_H/w)=O_n(u^3)$，给绝对 $O_n(u^8)$。线性化后对所有同时进入的目标求和，不将坏体积按不交角集作错误加法。

下面计算两支撑目标的第二轮反馈。在固定短角以 X,Y 表示两个物理面深除以 e，取 $[0,1]^2$。记 $\overline{m}_l(q)$ 为 U_l 在该目标帽 $[0,e]\times[0,eq]$ 乘全部其他宽中的质量，除以 $e^2(2w)^{n-2}$。轴置换和全反射保持三个坏集，所以交换排序与相反短角同价。令 $D=|X-Y|$、$q=1-D$，定义平面模型

$$P_0=\{\min(X,Y)\le\delta q\},\quad m_0(q)=|P_0\cap([0,1]\times[0,q])|,\quad P_1=\{\min(X,Y)\le\delta(q-m_0(q))\}.$$

有 $0\le m_0(q)\le q$。若其余坐标距各面均 $>2e$，只有该短角可能进入，U_0 的截线为 $F^{-1}(e^2q)/e=\delta q+O_n(\delta u^4)$。非中央切片须另计：某横向面深至多 h_H 的比例为 $O_n(h_H/w)=O_n(u^3)$；最浅横向面深在 $(h_H,2e]$ 的比例为 $O_n(u^2)$，但坏点还必须有 $\min(X,Y)\le h_H/e=O_n(u)$，故仍为 $O_n(u^3)$。平面模型同样受此面积界控制，因而 $\sup_q|\overline{m}_0(q)-m_0(q)|=O_n(u^3)$。中央 U_1 截线为 $F^{-1}(e^2[q-\overline{m}_0(q)])/e$，与 P_1 差 $O_n(\delta u^3)$；非中央因 $U_1\subset U_0$ 仍有同样总误差。二维横向例外为空。

于是 Tonelli 给

$$2\int_0^1\overline{m}_1(q)\,\mathrm{d}q=I_1+O_n(u^3),\qquad I_1=\int_{P_1}(2-X-Y)\,\mathrm{d}X\,\mathrm{d}Y=\frac{5}{3}\delta-\frac{13}{4}\delta^2+O_n(\delta^3). \tag{147}$$

核对最后系数：在 $X\le Y$ 的排序，$Y=X+D$、$0\le X\le q$，P_0 取 $X\le\delta q$，P_1 取 $X\le\delta(q-m_0(q))$。所以

$$I_0=\frac{5}{3}\delta-\frac{2}{3}\delta^2,\qquad I_0-I_1=2\delta\int_0^1(1+q)m_0(q)\,\mathrm{d}q+O(\delta^3).$$

再以 Tonelli 写后一个积分为 $\int_{P_0} W(Y)$，$W(Y)=3/2-Y-Y^2/2$。两个排序分别将 $W(Y)$ 换为 $W(D)$、$W(0)$，Lipschitz 误差为 $O(\delta^2)$，主项为

$$\delta\int_0^1 (1-D)[W(D)+W(0)]\,\mathrm{d}D=\frac{31}{24}\delta.$$

故 $-2/3-31/12=-13/4$，重合臂和排序到面距的区别均已包含。

最浅轴在某两支撑内时，对全部轴对的两个相反短角和两排序求和，贡献为

$$P\left[1-\frac{5}{3}\delta+\frac{13}{4}\delta^2\right]+O_n(u^8),\qquad P=\frac{2B_n(2w)^{n-2}e^3}{af}.$$

最浅轴不在该对内时，两目标穿透的面积积分为 $e^4/4$。整个目标面窗中 $U_1\subset U_0$ 的相对删量至多 $C_n(h_H/e+h_H/w)=O_n(u)$，所以此项换成完整面窗只损 $O_n(u^8)$。计入 $n-2$ 种最浅轴及两面符号，得到必须保留的三面项

$$T_3=\frac{B_n(n-2)(2w)^{n-3}e^4}{af},\qquad \frac{|U_2|}{a}=P\left[1-\frac{5}{3}\delta+\frac{13}{4}\delta^2\right]+T_3+O_n(u^8).$$

二维 $T_3=0$。更高平衡支撑已由前述积分幂界排除到误差内。

统一展开为

$$\begin{aligned}P&=\frac{B_n\kappa^3}{8n}u^5g^{n-3}[1+O_n(u^5)],\\ \delta&=\frac{\kappa}{4ng}u[1+O_n(u^5)],\\ T_3&=\frac{B_n(n-2)\kappa^4}{32n}u^7g^{n-4}[1+O_n(u^5)].\end{aligned}$$

实际可删量为 $((2w)^n-M)/a=n\Lambda u^5g^{n-2}+O_n(u^{10})$。因此取

$$\begin{aligned}\Lambda=&\frac{B_n\kappa^3}{8n^2g}-\frac{5B_n\kappa^4}{96n^3g^2}u\\&+\left[\frac{13B_n\kappa^5}{512n^4g^3}+\frac{B_n(n-2)\kappa^4}{32n^2g^2}\right]u^2+c_nu^3.\end{aligned}\tag{148}$$

前三项逐项抵消坏量预算；余量为 $u^8[nc_ng^{n-2}+O_n(1)]$。先在预定紧区间统一误差，再选固定大整数 c_n，最后小 u，有 $(2w)^n-M>|U_2|$。沿第一坐标连续分位切片选 Borel 孔 $P_u\subset C_w\setminus U_2$、$|P_u|=M$。因 $\mathcal{B}(U_2)\subset U_2$，每个孔点的原规则半径严格满足

$$\left|\bigcup_k (Tk+P_u)\cap Q(x,\rho+s)\right|\le M+(2w)^{n-2}R_{U_2}(x)<a(\rho+s)^n.$$

剪切参数最后取

$$\kappa=\frac{8n}{3}g^2+\frac{320n}{81}g^3u.\tag{149}$$

它留在前述固定正紧区间；Λ 前三项有界，选安全常数后只须再令 $c_nu^3\le 1$，故无选参循环。用 $m_*=ag^n$、$d=1-B_n\kappa^2u^6+O_n(u^9)$，精确相减

$$\frac{d}{d-M}-L_n(t)=\frac{M-dm_*}{(d-M)(1-m_*)}.$$

分子除以 au^6 为

$$B_n g^n\left[\kappa^2-\frac{\kappa^3}{4ng^2}+\frac{5\kappa^4}{48n^2g^3}u-\left(\frac{13\kappa^5}{256n^3g^4}+\frac{(n-2)\kappa^4}{16ng^3}\right)u^2\right]+O_n(u^3).$$

零阶在 $\kappa_*=8ng^2/3$ 最优，二阶导为 $-2B_ng^n$。一阶导除以 $2B_ng^n$ 在该点为 $320ng^3/81$，故 (149) 的位移增加 $(400/243)K_nav^8$。逆分母在二维是 $1+8u^2+O(u^3)$，在 $n\ge3$ 为 $1+O_n(u^3)$。再展开 g，所得八阶系数满足

$$\frac{J_n}{K_n}=\frac{(n+4)(n+5)}{2}-\frac{10}{9}(n+5)-\frac{13}{18}-\frac{n(n-2)}{3}+\frac{400}{243}+21_{\{n=2\}},$$

等于定理所写正多项式；尤其 $J_2=15694/6561$。

最后取整数 $N=\lceil u^{-10}\rceil\ge4$、$\Omega_N=T([-N,N]^n)$、$E_t=\Omega_N\setminus\bigcup_k(Tk+P_u)$，保留全部边界切孔。周期积分精确给 $|E_t|=(2N)^n(d-M)>0$。$w+r\le1$、$\|T^{-1}\|_{\infty\to\infty}<2$ 保证 $\|k\|_\infty\le N-3$ 的孔及其严格见证均在 Ω_N 内。输入密度点也进入严格 halo；凸外盒外任一中心的方体至多半体积在分离半空间内，所以小 t 下外部点不进入。有限比值因而为 $d/(d-M)+O_n(a/N)$。安全余量首次影响 av^9，截断误差更小，遂得对每个充分小实数 t 的 (145)。 □

3.14.12　二维两尺度孔与匹配下界

命题 3.37 (精确八阶的有限下界)**.** 对每个充分小的 $t>0$，存在有界正有限测度输入 E_t，使

$$\frac{|\mathcal{H}_n(1-t;E_t)|}{|E_t|}=P_{7,n}(t)+\widehat{J}_nav^8+O_n(av^9).$$

证明. $n\ge3$ 已由命题 3.36 给出。下面固定二维，沿用其 $u,g,\kappa,e,T,d,C_w,\rho,M,F$ 和真实坏集算子 $\mathcal{B}$，始终 $M=a\rho^2$，不因加入微孔而重算根。记

$$\Lambda_0=\frac{\kappa^3}{32g},\qquad\Lambda_1=-\frac{5\kappa^4}{768g^2},\qquad\Lambda_2=\frac{13\kappa^5}{8192g^3},$$

并在宏孔参数中改取

$$\Lambda=\Lambda_0+\Lambda_1u+\Lambda_2u^2-a\Lambda_0+cu^3. \tag{150}$$

κ 仍取 (149) 的二维值。前面的全部实际集合估计对有界 Λ 一致，因此此改动后可重新明确构造 U_0,U_1,U_2。

二维只有 $k=(1,-1),(-1,1)$ 的外孔可产生正交量，浅带中四个最浅轴 chart 的目标帽为 $[0,e]\times[0,(e-y)_+]$ 或交换两轴，独立于 s。坏层高度是连续函数 $\min(F^{-1}(R(y)),w-y)$；帽与任意固定 Borel 集的交量连续，故 U_2 闭且边界零测。其体积等于内部体积，并有前面已证的统一展开

$$|U_2|/a=2\Lambda_0u^5+2\Lambda_1u^6+2\Lambda_2u^7+O(u^8).$$

该首项正，允许在真实内部放入微孔，而非在形式极限轮廓中放孔。

固定当前小 u，取 $t'=t(1-u)<t$、$v'=2\sqrt{t'}$、$a'=4t'$。对 dyadic 间距 h，只保留 $q\in h\mathbb{Z}^2$ 中满足 $Q(q,h)\subset\operatorname{int}U_2$ 的点，并取微孔半宽和并集

$$w_\mu=\frac{hv'}{2(1+v')},\qquad H_\mu=\bigcup_q(q+[-w_\mu,w_\mu]^2).$$

这里 host $Q(q,h)$ 可以重叠；体积计数使用不交基本胞 $q+[-h/2,h/2)^2$。当 $h\to 0$，有效基本胞总体积趋于 $|U_2|$：距内部补集大于 $3h/2$ 的点都被有效胞覆盖，内部边带趋零。故可取第一个满足 $h\le u^{20}$ 且有效胞体积至少 $(1-u)|U_2|$ 的 dyadic 间距，选择有限终止。微孔不交，并有

$$|H_\mu| = a|U_2|[1+O(u)]. \tag{151}$$

每个微孔的所有点 z 保留短半径

$$r_\mu(z) = h - w_\mu - \|z-q\|_\infty.$$

小 u 时 $r_\mu \ge h-2w_\mu \ge 2w_\mu > 0$，故含自身全微孔。其他微格孔在某轴的距离至少 r_μ，至多边界相碰；且 $\|z-q\|_\infty + r_\mu = h-w_\mu < h$，所以整个见证在 host 内。其缺陷率至多

$$\left(\frac{w_\mu}{h-2w_\mu}\right)^2 = t' < t.$$

这是原阈值的逐点严格见证，含微孔边界点。

必须保护宏观见证所见的微孔质量。固定已经构造的 $H_\mu\subset U_2$，定义

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_\mu(V) = \{s=0\}\cup\Bigg\{x\in C_w:\ &\sum_{k\neq 0}|(Tk+(C_w\setminus V))\cap Q(x,\rho+s)|\\ &+\sum_{k\neq 0}|(Tk+H_\mu)\cap Q(x,\rho+s)|\ge F(s)\Bigg\}.\end{aligned}$$

下面以 $R_{H_\mu}(x)$ 记此第二个其他周期微孔质量和，R_U 沿用宏观定义。置 $U=U_2\cup\mathcal{B}_\mu(U_2)$。因 $(C_w\setminus U_2)\cup H_\mu\subset C_w$ 且两部分不交，$\mathcal{B}_\mu(U_2)\subset U_0$；反单调性给 $\mathcal{B}_\mu(U)\subset\mathcal{B}_\mu(U_2)\subset U$。这是一遍显式集合运算，没有未知孔形固定点。

在上述四个 chart 中，新旧目标帽质量差为 $|H_\mu\cap\Pi(y)|$，只有 $0\le y\le e$ 可能非零。$F'\ge f=2a\rho$，逆函数和真实纤维上截断为 $1/f$-Lipschitz。利用 $\mathcal{B}(U_2)\subset U_2$，得

$$|U| \le |U_2| + \frac{1}{f}\sum_{\text{四图}}\int_0^e |H_\mu\cap\Pi(y)|\,\mathrm{d}y \le |U_2| + \frac{4e}{f}|H_\mu| \le |U_2| + Cu|H_\mu|.$$

无需假设每个宏观帽中的微孔恰有均匀密度。深源的完整外包交量仍不足 $F(s)$，故四图外没有漏掉新的坏点。

记可删总量 $D=(2w)^2-M$，其精确式为

$$D/a = 2\Lambda u^5 + \Lambda^2 u^{10}(1-4u^2).$$

由 (150)、(151)，

$$[D+|H_\mu|-|U|]/a \ge 2cu^8 - Cu^8.$$

先在固定参数紧区间取统一 C，再选大固定 c，最后小 u 使 $cu^3\le 1$，所以选参没有循环且余量严格正。$M-|H_\mu|>0$，可在开集 $C_w\setminus U$ 内先取质量更大的紧集，再用第一坐标连续分位切出恰为 $M-|H_\mu|$ 的紧宏孔 A_μ。总孔 $P_\mu=A_\mu\cup H_\mu$ 的实际质量精确为 M。

宏孔 $x\in A_\mu$ 的原长半径 $\rho+s$ 含整个本胞 P_μ，其他周期孔由 $(C_w\setminus U)\cup H_\mu$ 上包。因 $x\notin \mathcal{B}_\mu(U)$，同一见证严格满足

$$M+R_U(x)+R_{H_\mu}(x)<M+F(s)=a(\rho+s)^2.$$

微孔 host 在 $\operatorname{int}U_2\subset U$，没有宏孔；不同宏胞的外包孔分离，所以短见证在最终输入中仍严格有效。

相对原宏观参数，此改动给

$$\Delta\rho=2a\Lambda_0u^6+O(u^9),\qquad \Delta M=4a^2g\Lambda_0u^6+O(av^9).$$

于是 $\Delta M/(av^8)=g\Lambda_0/16+O(u)\to 8/27$；比值 $d/(d-M)$ 对 M 的导数为 $1+O(a)$，故宏观八阶系数恰增加 $8/27$。这里总质量保持为新指定 M，不是在原宏孔上直接再加微孔。

最后仍取整数 $N=\lceil u^{-10}\rceil$、凸外盒 $\Omega_N=T([-N,N]^2)$，并保留全部边界切孔。周期积分精确给输入质量 $(2N)^2(d-M)>0$。宏、微见证均小于一，$\|T^{-1}\|<2$，所有内层孔点的指定见证保留；边界孔总质量 $O(aN)$。凸盒外任意中心任意半径方体至多半体积在分离半空间内，小 t 下不能进入严格 halo；输入密度点也进入 halo。所以全部真实半径的比值为 $d/(d-M)+O(a/N)$，而非仅给指定半径的子族。有限化误差晚于 av^9，得到二维系数 $J_2+8/27=17638/6561$。 □

3.15　八阶余项的定量控制

第六前缀的局部领先价只有 $o(v^6S)$ 误差。我们将原有限源递归执行到九层，使该前缀的权为 $O(v^3)$，其贡献于是为 $o(v^9S)$。另一项困难来自全部交长：若只将补集的误差粗估为八阶，就留下不能缩小的余项。下面先把整个正常模型放入一个固定管，保留联合层的 raw、完整名义成本和槽欠量，以固定参数吸收管外角部。记

$$\rho_*=9,\qquad P_{8,n}(t)=P_{7,n}(t)+\widehat{J}_nav^8,\qquad \mathcal{V}=V+M,\quad S=\sum_i r_i^n.$$

定理 3.38 (八阶展开的九阶余项)**.** 对每个固定整数 $n\ge 2$，有

$$C_n(1-t)=P_{8,n}(t)+O_n(av^{\rho_*}),\qquad a=v^n=2^nt,\quad v=2t^{1/n},\quad t\downarrow 0.$$

3.15.1　同一九层族及其正量

只须考虑固定 $B<\infty$ 下任意实际输入和外部严格 halo 紧集的序列

$$1+M/V\ge P_{8,n}(t)-Bav^9,\qquad v\downarrow 0.\tag{152}$$

最终它进入固定的 $P_{7,n}-B_0av^8$ 竞争分支，故也属于 (103) 的固定分支。所有几何常数先固定；收敛模量允许依赖序列，价格常数不依输入数或尺度跨度。

引理 3.39 (九层实际源族)**.** 可固定同一个 I,K',M' 及原有限值 *Borel* 见证半径，一次构造 $h=1,\dots,9$ 的源、目标与 *CDF* 盒，使

$$\mathcal{D}_h\ge f_h\ge 0,\qquad \mathfrak{d}_1^0\le f_0=A_0vM',\qquad \mathfrak{d}_h^0\le f_{h-1}+aP_\partial\quad(h\ge 2)\tag{153}$$

及精确质量式 (85) 成立。本次每个 $\ell=6,7,8,9$ 前缀满足粗先验 (104)–(105)，下标相应取 ℓ。第九层自己的正常集合、旧正常层和槽满足

$$\begin{aligned}&\mathfrak{G}_N+B_{\mathcal{B}_2}+R_N+R_{\mathrm{all}}+\mathfrak{E}+\mathcal{F}+\mathcal{F}_{1/128}+P_I+P_\partial=O(v^8S),\\&D_{\mathcal{N}}=O(v^2S),\qquad\sum_{\mathcal{N}}d_e^2R_e^n=O(v^2S),\qquad|Y_{i,N}|\le Cav^5R_i^n.\end{aligned}\tag{154}$$

本层还有

$$\sum_i\xi_iR_i^n=O(v^{5/2}S),\quad 0\le\xi_i\le C,\quad\sum_i\varepsilon_iR_i^n=O(v^5S),\quad S(\partial I)=O(v^5S).\tag{155}$$

当 $n\ge3$ 时，实际高支撑坏所有者集有 $S(\mathcal{B})=O(v^2S)$；二维高支撑为空和，不需要该集合。

证明. 先按纯维数价格选择原图中的 I，使 (86) 成立。任意预定固定 $H_*>0$ 的收缩盒覆盖 K'：引理 3.2 先将每点送到外部 $0.9Q_j$，当 $H_*v<1/10$ 时它属于收缩盒。所有原半径共同缩小后仍中心分离；新半盒的缩小损失为 $O(H_*v)r_i^n$，相遇半盒个数和尺度可比性给新局部空隙 $O_{n,D,H_*}(v)$。同一个私有定位证明于是将唯一深覆盖点定位在 $C(n,D,H_*)vr_i$ 中心邻域内。

令固定 $L_0=C_0>cD+1$，使原私有源位于 $Q(x_i,C_0vr_i)$。从第一层重新执行有限递归。已有 L_{h-1} 后，先取 $H_h>L_{h-1}+D+1$，再设

$$G_{i,h}=K'\cap Q(x_i,(1-H_hv)r_i),\qquad T_{i,h}=\begin{cases}P_i, & i\in\partial I,\\ N_{i,h-1}, & i\notin I\cup\partial I.\end{cases}$$

首层取 $T_{i,1}=P_i$。删除原指定半径小于 $2L_{h-1}vr_i$ 的点；局部输入 $E\cap Q(x_i,3L_{h-1}vr_i)$ 的严格外部界给删除量 $Cav^nr_i^n$，零测局部输入给空点集。保留见证包含整个前层中心邻域及 P_i，故其半径大于 $(1-Dv)r_i$。原贪心捕获给外部规则 $Q_j\ni x$、$r_j\ge r(x)$；若 $r_j>r_i$，线性半径引理给 $r_j-r_i\le Ce_j^0r_j=O(vr_j)$。因此全部保留点仍用原半径，并满足

$$R_{i,h}<r(x)\le(1+A_9v)r_i,\qquad(1-A_9v)ar_i^n\le\mu_{i,h}\le g_{i,h}\le ar_i^n.$$

严格下界来自完整 $G_{i,h}\subset Q(x,r(x))\cap E^c$ 及原严格缺陷。

中心分离给

$$\|x-x_j\|_\infty>\max(r_i,r_j)-L_{h-1}vr_i\ge(1-L_{h-1}v)r_j,$$

故未删除源与所有异源目标排他；小 v 时也在自身目标内。边界仍取 P_i，其原半径还满足 $r(x)\le r_i$。随后才由本层唯一覆盖点定位选 $L_h>\max\{L_{h-1}+1,C(n,D,H_h)\}$，定义 $N_{i,h}=K'\cap Q(x_i,L_hvr_i)$。这些邻域两两不交，其外的 f_h 质量至少双重覆盖，得 $\mathcal{D}_h\ge f_h$。边界改源损失至多 aP_∂，删除单记在 Δ_h^{mass}，所以 (153) 完整保留。九步常数全部固定后统一 A_9，再选一个强 CDF 斜率，最后取共同的小 v 阈值。

对本次长度 $\ell=6,7,8,9$ 的前缀分别加权 (95)。初端除 a 为 $O(v^{\ell+1}S)$，竞争分支及粗包络给 $\mathcal{V}-A_vM/a=O(v^6S)$ 的双侧界。因此本层的形状、重复量、稳健面和前层重复量均有原粗先验，从而得到 (155)。全尺度局部匹配只用这些原半盒条件；每层的实际 CDF 面对顺序和根桥按本层另取。

对 $\ell=7,8,9$，全二轴联合价格的证明只用上述粗先验：正常退款的误差由固定小份额的 $\mathfrak{G}_N$ 与 Cv^8S 控制；窗外 $b+D$ 分固定份额保留完整非正常名义成本、角权折扣及 raw。长条只避固定正常小管，先取 C_L/T_0 小，其余固定窗常数最后以小 v 吸收。高支撑净价仅用一个先固定的小份额，普通和稳健面条的并集取两个体积下界的各一半。同次恢复支付所有面项后，本次三个前缀均可取

$$E_\ell=Q(v)\mathcal{V}+O(v^8S),\quad Q(v)=K_nv^6[(1+v)^{-4}+(10/9)v(1+v)^{-2}],\quad \ell=7,8,9. \tag{156}$$

第六前缀由引理 3.21 在本层给 $(K_n+o(1))v^6S$，前五层为 Cv^6S。

为将第六层的局部 H 价格代入共同体积式，取本层 $U_6=\bigcup_{i\notin I}X_{i,6}$，不加入面条。环境估计对这个较小集合仍给 $\sum u_{i,6}\le Ca(\mathcal{F}_6+P_\partial)$。Bonferroni 与完整 J 的定义给

$$|U_6|\ge\sum_i(R_{i,6}+\mu_{i,6}^{1/n})^n-(K_n+o(1))v^6S.$$

粗先验使删除成本 $(v/a)\Delta_6^{\mathrm{mass}}=O(v^7S)$，环境成本也为 $o(v^6S)$。用精确质量恒等式，扣物理 $\mathcal{D}_6$ 后净系数至少 $1/(2a)$，因而

$$|U_6|-\mathcal{D}_6-\sum_i u_{i,6}\ge A_vM'/a+\mathcal{D}_6/(2a)-b(v/a)\mathfrak{d}_6^0-(K_n+o(1))v^6S.$$

这里 $\mathfrak{d}_6^0/a$ 仅为 $O(v^5S)$，保留到层间消项。加同一个内部集合和纯维数边界价格，即给第六前缀所需的共同账本。

保留第九层上述正量，按九层权平均共同账本。末层权为一，前两层误差分别乘 $O(v)$，$O(v^2)$，第六层乘 $O(v^3)$，初端为 $O(v^{10}S)$。于是保留量 $\mathcal{L}_9\ge0$ 满足

$$(1+Q)\mathcal{V}-A_vM/a\ge c\mathcal{L}_9-Cv^8S.$$

准确比值恒等式

$$(1+Q)\mathcal{V}-A_vM/a=\frac{A_v-a(1+Q)}{a}\,V\left[\frac{A_v}{A_v-a(1+Q)}-(1+M/V)\right]$$

和 (152) 将左侧压到 $O_B(v^8S)$。因此本族的 raw、端移、面量、正常平方罚和槽欠量均有 (154)。常数一的嵌套 raw 关系再给 $R_N=O(v^8S)$。当 $n\ge3$ 时，正常整槽缺失的原证明给 $S(\mathcal{B})\le C(D_{\mathcal{N}}+v^{9/2}S)$；二维直接用实际四槽。这一步先于下面的正常量化和任何测试窗。 □

后面固定本次第九层，省略层号。需要的结构也随本族取得。本层的粗 Hölder 角界给 $\sum I_e=O(v^6S)$。单盒基线、质量恒等式和 Bonferroni 给 $|\bigcup X_i|\ge\mathcal{V}-O(v^5S)$；与 $|\bigcup Q_i|\le V+aS$、$S-M/a=O(vS)$ 合并，得

$$\Big|(\bigcup Q_i)\setminus(\bigcup X_i)\Big|=O((v^{n+1}+v^5)S).$$

三盒的中点壳减去原尾质量，对任意后来选出的 $Y_i\subset(x_i+W_i')\setminus F_i$ 给

$$|W_i|-\mu_i\ge|Y_i|+c[|\mathscr{D}_i\setminus Y_i|+(vR_i)^{n-1}\Delta_i].$$

层系数一与 raw / 端移由同一次导数积分分别保留。真正面邻居的切向裕量使每个原见证捕获整个目标原横截面；法向两向余量非负，$g_{i\to h}\le 2\Gamma_{ih}\le CvR_i$，面逆度固定。非临界轴捕获整个原始目标宽，临界点簇同序。这些性质来自刚构造的全点源条件，不由数值预算替代。

旧 $Y_{i,N}$ 用本层有效源排序、原始目标帽及固定横向核心，落在固定两近面管内。整源图包含同一目标的非负质量且不扣旧侵蚀，故精确 $Y_{i,N}\subset \mathscr{B}_{\mathcal{N}}(\mathscr{D})_i$。其实际 clean 分配使用固定 probe 和清单 20。错误列 helper 产生固定大碰撞；相反对角用精确端点恒等式触发该边自身的 $\min L/(1000r_i)$ 碰撞。无需把匹配精度缩到 $\min L$。根权传输仍由固定裕量面路径与本层稳健根差精确求和，其窗口总和为 $\sum_{i\in G_v}\sum_{j\in\mathcal{I}_i(R)}|R_i-R_j|r_i^{n-1}=O_R(v^6S)$。所以实际完整槽满足

$$W_N=\mathcal{C}-D_{\mathcal{N}}+O(v^3S),\qquad \mathcal{C}=\sum_i\sum_{l<k}R_i^2\prod_{h\neq l,k}(R_i+w_{ih}). \tag{157}$$

二维由实际四角 / 四胞的精确面对序给同式。

引理 3.40 (本族的完整宽度控制)**.** 同一次九层构造满足

$$\sum_i \xi_i^2R_i^n=O(v^7S),\qquad X_\xi:=\sum_i\xi_iR_i^n=O(v^{7/2}S).$$

证明. 令 $b_i=|W_i|^{1/n}$、$q_i=\sum_l\log^2(w_{il}/b_i)$，并写出实际恒等式

$$|X_i|=(R_i+\mu_i^{1/n})^n+J_i+\mathcal{A}_i,\quad \mathcal{A}_i=|X_i|-(R_i+b_i)^n.$$

各归一化宽度在固定正紧区间内。置 $s_l=\log(w_{il}/b_i)$，则 $\sum_l s_l=0$。函数 $\sum_l\log(1+(b_i/R_i)e^{s_l})$ 沿连接零点与 s 的线段有 Hessian 下界 cv，零点的一阶项相消，故 $\mathcal{A}_i\ge cvq_iR_i^n$。这项来自乘积与几何平均的差，独立于缺源项 J；在粗并集下界中保留它不重复消费 J。

把公共账本的重复量系数 $1/2$ 拆成两份 $1/4$，只用其中一份消项，取权 $(4bv)^{9-h}$。另一份的权平均至少为 $c(\mathcal{D}_9/a+v\mathcal{D}_8/a)$。保留末层 $\sum\mathcal{A}_i$，用 (156) 与相同的真实比值恒等式，得

$$v\sum_i q_iR_i^n+\mathcal{D}_9/a+v\mathcal{D}_8/a=O(v^8S). \tag{158}$$

初端十阶；第七及更早层的粗价从 v^2v^6 起，故这一步只使用已证粗八阶上包。

令 $\eta_i=1-\mu_i/g_i$。本层原 dyadic、盒外及边界删除公式，结合 (154)，给 $\Delta_9^{\mathrm{mass}}/a=O(v^7S)$；最坏维数是二维，其实际角窗证明在引理 3.34 中。由精确质量式及 $\mathfrak{d}_9^0\le\mathcal{D}_8+aP_\partial$，

$$\sum_i\eta_iR_i^n=O(v^7S),\qquad \sum_i\eta_i^2R_i^n=O(v^7S).$$

这里前层重复量的保留不可省略。再由 $\varepsilon_i\mu_i\le|\mathscr{D}_i|$、$\mu_i\asymp aR_i^n$ 和旧层逐源体积，

$$\varepsilon_i\le Cv^5+C\frac{|\mathscr{D}_i\setminus Y_{i,N}|}{aR_i^n}.$$

右侧 raw 比值一致有界，其加权和为 $R_N/v=O(v^7S)$，故 $\sum_i\varepsilon_i^2R_i^n=O(v^7S)$。端移比 $\rho_i=\Delta_i/(vR_i)$ 一致有界，且 $\sum_i\rho_iR_i^n=\mathfrak{E}/v=O(v^7S)$，因此平方和也为同阶。最后，$|W_i|/g_i=(1+\varepsilon_i)(1-\eta_i)$，三个端盒各边长差至多 Δ_i。紧区间上的对数与指数比较给

$$\xi_i^2\le C(q_i+\varepsilon_i^2+\eta_i^2+\rho_i^2).$$

与 (158) 合并，再用 Cauchy–Schwarz 即得结论。所有异常源都保留，没有逐源小偏差假设。 □

3.15.2　正常模型的误差率

令 $s_v=(1+v)^{n-1}$、$\lambda_v=s_v v/a$，

$$\mathsf{P}_N=\sum_{e\in\mathcal{N}} I_e-\lambda_v\sum_{i}|Y_{2,N,i}|,\qquad E_N=\mathsf{P}_N-q_N(v)W_N,$$

$$q_N(v)=\frac{k v^{6}}{(1+v)^{2}}+\frac{\Gamma v^{7}}{(1+v)^{3}}+k c_{8,n}v^{8},\qquad c_{8,n}=-\frac{13}{18}-\frac{n(n-2)}{3}+\frac{400}{243}.$$

这里的模型价未减全体 J_i。

引理 3.41 (移动最大点的正常价格)**.** 存在正常窗内非负亏损 $\mathcal{L}_N$，使

$$\mathsf{P}_N\le q_N W_N-c\mathcal{L}_N+Cv^{9}S.$$

证明. 固定正常算子的 Tonelli 范数为 Cv，最浅轴在 pair 外时为 Cv^3。实际必要性、旧层逐点锚定和 (154) 给

$$\|\mathscr{D}-\mathscr{B}_{\mathcal{N}}(\mathscr{D})\|_1=O(av^{7}S),\qquad |\mathscr{D}|_1=O(av^{5}S).$$

反单调两次迭代遂给

$$\|\mathscr{D}-Y_{1,N}\|_1=O(av^{7}S),\qquad \|\mathscr{B}_{\mathcal{N}}(\mathscr{D})-Y_{2,N}\|_1=O(av^{8}S).$$

分别乘退款核 Cv^2/a 和源导数 Cv/a，均为九阶成本。

引理 3.33 的积分按这些本层对象计算。完整横宽的替换误差由引理 3.40 为 $Cv^6X_\xi=O(v^{19/2}S)$。实际帽内的根差仍保留；根比系数、非中央片、其他正常角和三近面退款均为 $O(v^9S)$，正八阶的三近面名义量保留。真实 fibre 顶截只切非临界自由底变量的 Cv^4R_i 中分面带，相对整宽为 $O(v^3)$，故成本九阶。有效 / 原始目标锚转换的退款为 $Cv\mathfrak{E}=O(v^9S)$。双向不同帽的全分支余项 (143) 为

$$C[v^7z_e^2+v^8|z_e|+v^9]R_e^n.$$

由本层平方先验与 Cauchy，其全族和为 $O(v^9S)$；这里包括帽差大于、可比及小于臂高的全部区域。

归一化为 $x=(1+v)p/n,y=(1+v)q/n,\zeta=(1+v)z/n$。用 $\bar b=\min(1,\widehat{b}_e)$ 表示单边横权，实际物理横投影 b_e 仍用于 W_N。记

$$\Phi_v(x,y)=xy(1-x-y)+\frac{2v}{1+v}Q_4(x,y)-\frac{2v^2}{(1+v)^2}Q_5(x,y)\\-\frac{n(n-2)v^2}{1+v}x^2y^2.$$

零参数 Hessian 在 $(1/3,1/3)$ 的特征值为 $-1,-1/3$。先固定小正常窗，使 Hessian 在窗内统一负定。二次强制性与扰动的 Cv-Lipschitz 界使所有最大点距基点 $O(v)$，所以它们在该窗内部。隐函数定理和对称性给唯一最大点 (r_v,r_v)，其中 $r_v=1/3+(20/81)v+O(v^2)$。带横权和根差的主泛函是

$$F_v=\Phi_v-(1-\bar b)xy-3(x+y)\zeta^2.$$

把它写成 $\bar b\Phi_v$ 加余项后，$xy(x+y)$ 减去 $O(v)$ 扰动在固定窗上有正下界，故

$$F_v \le \bar b\Phi_v(r_v,r_v) - c[(1-\bar b) + (x-r_v)^2 + (y-r_v)^2 + \zeta^2].$$

定义 $\mathcal{L}_N$ 为右侧方括号乘 $v^6R_e^n$ 后的全边和。只在真实移动最大点 Taylor，三阶导数在固定紧窗上一致有界。原二次配方给

$$\frac{n^2v^6}{(1+v)^2}\Phi_v(r_v,r_v) = q_N(v) + O(v^9).$$

横权截幅超额及实际根宽误差由引理 3.40 支付；有限相交度给 $\sum_{e\in\mathcal{N}} R_e^n \le CS$。合并所有有率积分误差即得结论。亏损的中心是 r_v，没有将旧固定中心的平方罚错误地升级。 □

3.15.3　整个正常模型的固定管

引理 3.42 (固定管与共同 raw)**.** 可一次固定有限 K，只依正常窗与 A_9，使

$$\mathscr{B}_{\mathcal{N}}(\mathscr{D})_i \subset \mathscr{B}_{\mathcal{N}}(0)_i \subset \mathcal{C}_i(K).$$

对任何后来选择的联合 *packet* $A=\mathcal{N}\cup B$，取同一非负侵蚀和同一真实顶截的层 $B_N^- \subset B_A^- \subset D'$，则

$$Z(K) := \frac{v}{a}\sum_i |D_i' \setminus \mathcal{C}_i(K)| \le \mathcal{R}_A^- + s_v^{-1}\mathsf{M}, \tag{159}$$

其中 $D_i' = (x_i + W_i') \setminus F_i$、$\mathsf{M} = \lambda_v \sum \int h_B^0$，$\mathcal{R}_A^- = (v/a)\sum |\mathscr{D}_i \setminus B_{A,i}^-|$。

证明. 正常帽的两临界参数至多 $C_Nv^3R_i$，总名义高度至多 $C_Nv^4R_i$。若 whole-min chart 中的点属于 $\mathscr{B}_{\mathcal{N}}(0)$，至少一顶帽为正，其两个临界底坐标均不超过 $C_Nv^3R_i$，最浅深度不超过 $C_Nv^4R_i$。所以至少两轴距某有效面不超过固定 Kv^3r_i。最浅轴不在 pair 中的整张图同样满足此条件。因此这个管包含整个正常名义模型，而不仅旧核心层；K 不依测试缺集、后选窗或输入数。

同 chart 上 $h_A = h_N + h_B \ge h_N$。正部与真实顶截均单调且为 1-Lipschitz，故

$$(v/a)|B_A^- \setminus B_N^-|_1 \le s_v^{-1}\mathsf{M}.$$

在管外，把 D' 分为 $D'\setminus B_A^-$ 与 $B_A^-\setminus\mathcal{C}(K)$；后一集合包含于 $B_A^-\setminus B_N^-$，即得 (159)。这里无侵蚀误差，也没有把旧 R_N 改名为新 raw。 □

3.15.4　同一联合层的固定正份额

下面以 μ_* 表示交长下截断，与源质量及多线性重数 m 区分。所有原半径、正常集合、clean 分配和 CDF 在选取测试窗之前固定。

引理 3.43 (保留名义成本的二轴价)**.** 可先固定正数 c_B, c_R, c_D，再对任意固定有限 $T \ge T_0$、$0<\mu_*\le\mu_0$，选择联合 *packet*

$$A = \mathcal{N}\cup\mathcal{B}_{T,\mu_*}, \qquad \mathcal{B}_{T,\mu_*} = \{e\notin\mathcal{N} : \text{两端深处},\ \mu_* \le p_e, q_e \le T\}.$$

在最终小 v 时，其完整实际保证层给

$$H_2 + 8c_B\mathsf{M} + 8c_R\mathcal{R}_A^- + 8c_D v^6 D_{\mathcal{N}} + c\mathcal{L}_N \le q_N\mathcal{C} + \theta_{T,\mu_*}(v)\mathsf{M} + I_{\text{long}} + I_{\text{small}} + C_{T,\mu_*}v^9 S, \tag{160}$$

其中 $\theta_{T,\mu_*}(v) \le C(T\mu_*^{-3}v + T^2v^3 + v)$。名义成本 M 和 *raw* 与引理 *3.42* 相同，$H_2 = \sum_{q(e)=2} I_e - \sum_i J_i$。长角和近零角暂保留为右侧的 *gross*；常数 c_B, c_R, c_D 不依 T、μ_*。

证明. 先给软容量的常数。原每边 clean 阈值 $\lambda_e = \min L_l/(1000r_i)$ 和固定 helper / 清单精度不依软常数。若 $\omega_e = \min(1, C_s \min(p_e, q_e))$，则 $\omega_e/\lambda_e \le CC_s/v^3$。原 gross $O(v^6 S)$ 和固定反向重数给碰撞费 $CC_s v^3 S$；空 probe、坏端点、根权和宽度只用 $\omega_e \le 1$。因此同一真实槽分配同时给

$$W_{C_s} \le \mathcal{C} + C(1 + C_s)v^3 S.$$

取 $C_s = C_0/\mu_*$，正常及所选 bounded 边的权为一。由 (157)，其余边任一子集的软权至多

$$D_{\mathcal{N}} + C\mu_*^{-1}v^3 S. \tag{161}$$

固定精度身份识别不随 μ_* 变化。

重开整源必要性的实际推导。原有效源 global-min chart 中，同一目标帽使用原始目标宽和截幅根差；全部目标先相加，给

$$0 \le h_A \le h_A^0 \le CT^2 v^4 R_i, \qquad D_{i,T} \le CTv^{n+1}R_i^{n-1}.$$

若原半径增量 $\ell = r(x) - R_i \le s$，实际角帽边带斜率是容量导数的 $O(Tv)$ 倍。若 $\ell \ge s$，同一原见证还捕获真正浅面邻居的整横截面。旧正常层在任意深度轴帽中的占比 $O(v^2)$，故只扣原 raw $\eta_h = |\mathscr{D}_h \setminus Y_{h,N}|$ 后，轴帽至少为

$$[\beta_h \min(d, w_{hq}^0) - \eta_h]_+, \qquad \beta_h \asymp (vR_h)^{n-1}.$$

完整邻源先排除全宽分支；容量减轴帽在 $s + g_{i\to h} + \Delta_i + \eta_h/\beta_h$ 前增后减。若转折超出原半径窗，仍用容量单调性。该转折为 $O(vR_i)$，比较导数的常数不含 T。于是必要高度是 $s \ge h_A(\mathscr{D}; y) - e_i(T)$，其中

$$e_i(T) = C[T^4 v^8 R_i + \Delta_i + \max_h(g_{i\to h} + \eta_h/\beta_h)], \qquad \sum_i R_i^{n-1} e_i(T) \le C(1 + T^4)v^8 S.$$

正帽 base 测度至多 $CTv^{n+1}R_i^{n-1} + CT^2 v^{n+3}R_i^{n-1}$。因此共同侵蚀的物理损失为 $CT^5 a v^9 S$，鲜成本为 $CT^5 v^{10} S$。所有这些估计在 $Tv, T\mu_*^{-3}v, T^5v^2 \le c_0$ 时统一成立；本证明最终固定 T、μ_*，再取 v 小，未代入未知的起效函数。

在同 chart 上写 $h_A = h_N + h_B \ge h_N$。未侵蚀的真实顶截层增量满足

$$\lambda_v |B_A \setminus B_N| = \mathsf{M} - \mathfrak{F}_B - \mathfrak{L}_B.$$

总高度 $CT^2v^4R_i$ 只在非临界自由底变量的中分面带被截断；每个名义项独立于该变量，故 $\mathfrak{L}_B \le CT^2v^3\mathsf{M}$。二维无此变量，损失为零。打开 Tonelli，退款核范数为 CTv^2/a。原 raw 给

$CTvR_N$，旧正常层给每坏边退款 $CTv^7R_e^n$。两端的完整名义成本由正部凸性和原宽下界至少为 $cp_eq_e(p_e+q_e)v^6R_e^n \ge c\mu_*^3v^6R_e^n$，从而

$$\mathfrak{F}_B \le CT\mu_*^{-3}v\mathsf{M} + CTvR_N.$$

根比误差也是 $Cv\mathsf{M}$。这些项保留 M 因子，不先以八阶数值界代替。

只对固定正常算子作第二反馈，得到 $\lambda_v|B_N| = \lambda_v|Y_{2,N}| + O(v^9S)$。对联合保证层使用一次完整强 CDF，层的系数为一，另外保留 raw 及端移；导数 epsilon 损失为 $CT^3v^{11}S$。因此

$$\begin{aligned}\sum_i J_i \ge{}& \lambda_v|Y_{2,N}| + \mathsf{M} + c_J\mathcal{R}_A^- + c_E\mathfrak{E}\\ &- C(T\mu_*^{-3}v + T^2v^3 + v)\mathsf{M} - C_{T,\mu_*}v^9S.\end{aligned}$$

宽度误差由引理 3.40 为 $CT^3v^6X_\xi = O_T(v^{19/2}S)$，侵蚀成本十阶。没有对联合 packet 再作第二次迭代，也没有重复减 J。

下面在选 T、μ_* 前分配固定系数。固定正常窗外 (120) 给 $G \ge c_\nu(b+D)$。将 $\mathsf{M} = \mathsf{M}_2 + \mathsf{M}_3$ 按最浅轴在 / 不在 pair 中分开。$\mathsf{M}_2 \le C_M\sum_e \Lambda_eD_e$ 加已列宽度误差，其中 $\Lambda_e = n^2(1+v)^{n-4}v^6R_e^n$，$D_e$ 为该边的完整正部三次成本。先取

$$8c_B < 1, \quad 8c_BC_M \le c_\nu/4, \quad \gamma/27 \le c_\nu/4, \quad 8c_R \le c_J/2.$$

$\mathsf{M}_3 \ge 0$，由 $1-8c_B$ 的原成本支付，余下 $8c_B\mathsf{M}_3$ 留在左侧。强制性另有固定余量给 bounded 非正常边的 $(1-\gamma)A_6W_B$ 上包。这几个小份分别支付完整成本、角权折扣和 raw，不重用同一整份亏损。

由引理 3.41，先保留长角与近零 gross，再对正常与 bounded 非正常作唯一一次槽转换：

$$q_NW_N + (1-\gamma)A_6W_B \le q_N\mathcal{C} - [q_N - (1-\gamma)A_6]D_{\mathcal{N}} + C_{\mu_*}v^9S.$$

最终括号至少 $\gamma kv^6/2$，故可取 $8c_D \le \gamma k/4$。目标宽度和 clean 常数都先固定；槽正价不是第二份正常模型收入。边界由 $\varepsilon_i\mu_i \le |\mathscr{D}_i|$、$\mu_i \asymp aR_i^n$ 及原邻端根权给

$$\sum_{\mathrm{Adj}(\partial I)} \varepsilon_iR_i^n \le Cv^5S(\partial I) + CR_N/v = O(v^7S).$$

单源角界因而为九阶。二维用实际四槽和两原半径帽逐式同证。固定 T、μ_* 后其他误差均为 $C_{T,\mu_*}v^9S$，得结论。 □

引理 3.44 (长角及近零角)**.** 固定引理 *3.42* 的 K 后，可取与后选 T、μ_* 无关的 C_L，使

$$I_{\text{long}} \le (C_L/T)Z(K) + Cv(R_N + \mathcal{F} + \mathfrak{E}), \qquad I_{\text{small}} \le CT\mu_*v^6D_{\mathcal{N}} + C_Tv^9S.$$

证明. 长 q2 边以大根为 owner，写 $P = \max L/r_i, Q = \min L/r_i, H_0 = \min(Q, PQ/v^2)$。原实际缺源条的长轴深度为 $[c_2P, 2c_2P]r_i$，短轴为 $[c_3H_0, 2c_3H_0]r_i$，其他轴取到两有效面均 $> Kv^3r_i$ 的核心。先取 $T \ge T_0(K)$，长轴深度也 $> Kv^3r_i$；其相反面仍距至少四分之三有效宽。所以整条至多短轴可接近任一面，确实避开整个固定管。小 v 时核心保留每宽至少一半，该比

例不依 K。同一原见证的真实目标截宽和浅面剩余容量证明整条缺源，成本 / gross 比至少 $c\min(1/v, P/v^3) \ge cT$。原有限相交度控制跨边重叠，给 $(C_L/T)Z(K)$。

目标正常层在任意短 Q 的目标帽中所占比例为 $C(v^3/P + v^2)$，不除以 Q；故目标 raw 例外只收费 CvR_N，面对例外为 $Cv\mathcal{F}$。原 / 有效壳另有

$$(v^2/a)\sum |B_j^0 \setminus B_j'| \le Cv\sum R_j^{n-1}\Delta_j = Cv\mathfrak{E}.$$

壳不属于 Z，没有把原盒管外缺量误认成有效盒的 Z。核心比例与度数保证 C_L 不依后选 T、μ_*。近零 bounded 边不请求成本下界，直接用 $pq \le T\mu_*\omega_e$ 及 (161) 得第二式。 □

3.15.5　高支撑的一次固定份额

引理 3.45. 固定同一个 K 后，对任意随后固定的小 $\eta > 0$，本层全部高支撑有

$$I_{\ge 3} \le \eta Z(K) + C_{\eta,K}v^9 S.$$

二维该和为空。

证明. 设 $n \ge 3$。由 $\varepsilon_i\mu_i \le |\mathscr{D}_i|$、旧正常层逐源体积及 raw 分解，对任何实际指标集 A，

$$\sum_{\mathrm{Adj}(A)} \varepsilon_j R_j^n \le Cv^5 S(A) + CR_N/v.$$

好 owner 的本层稳健面路径给 $I_e \le C[v^{3q}r_i^n + v^{q-1}\mathcal{E}_i r_i^{n-1}]$，其和为 $O(v^9 S)$。坏 owner 集满足 $S(\mathcal{B}) \le C(D_{\mathcal{N}} + v^{9/2}S) = O(v^2 S)$。原真实矩形证明现用整个固定 K 管：写

$$0 < p_1 \le \cdots \le p_q \le Cv, \quad P = \prod_{l=2}^{q} p_l, \quad A = p_1 P, \quad H_0 = \min(p_1, A/v^q).$$

当 $p_2 > T_K v^3$ 时，第 2 至 q 临界轴均远离两面，非临界轴取管外核心，因此至多第 1 轴近面。同一原见证逐轴捕获 $\min(p_l r_i/2, w_{jl}^0) \ge \gamma p_l r_i$，额外目标与真正浅面剩余容量矛盾，故矩形缺源。令 $X_e = (v/a)|\mathcal{R}_e|$，则

$$X_e \ge c_X r_i^n H_0 P/v^{q-1}, \quad I_e \le C_I A r_i^n, \quad \sum_{\mathrm{owner}(e)=i} X_e \le DZ_i(K).$$

跨全部支撑数的度数 D 固定，只花一份 Z。分配 $(\eta/D)X_e$ 后，两个标量分支给

$$I_e \le (\eta/D)X_e + C_\eta v^{q(2q-1)/(q-1)} r_i^n.$$

具体地，非饱和且尚有正净额时 $P < v^{2q-1}/\lambda$，其中 $\lambda = \eta c_X/(DC_I)$，再用 $p_1^{q-1} \le P$。固定 η 后其共同前提 $v^2 < c\eta$ 最终成立。最早 q3 的余项为 $C_\eta v^{15/2}S(\mathcal{B}) = O(v^{19/2}S)$。坏短窗 $p_2 \le T_K v^3$ 的 gross 为 $C_K v^{q+4}S(\mathcal{B})$，从九阶起。目标 epsilon、面与端移例外从十阶起；边界单源价最早为 $19/2$ 阶。由此得结论。本步骤只估 gross，不再减任何 J，也不再次使用槽收入。 □

3.15.6　九层消项与全部输入

定理 *3.38* 的证明. 先在任意 (152) 序列上构造上述实际九层族。依次固定正常窗、CDF、整个正常模型的管 K，以及引理 3.43 的三个正系数。再取固定大 $T \ge T_0(K)$，使 $C_L/T \le \min(c_B, c_R)$；随后取固定小 $\mu_* > 0$，使 $CT\mu_* \le c_D$ 并 $\mu_* < c_N/2$。再固定 $\eta \le \min(c_B, c_R)$，最后取 v 小，使 $\theta_{T,\mu_*}(v) \le c_B$，并使全部实际帽、clip、清单和固定 η 矩形的条件同时成立。所有正系数都先于 T、μ_* 固定；K 不依新 packet，故没有追逐阈值的循环。

由 (159) 和引理 3.44、3.45，右侧长角、高支撑与退款最多支付 $3c_B\mathsf{M}$、$2c_R\mathcal{R}_A^-$、$c_D v^6 D_{\mathcal{N}}$。原来各留八份，所以合并到同一次二轴联合不等式后仍有

$$H + c_B\mathsf{M} + c_R\mathcal{R}_A^- + c_D v^6 D_{\mathcal{N}} + c\mathcal{L}_N \le q_N\mathcal{C} + C_n v^9 S. \tag{162}$$

全部目标缺量都在这一次实际层中处理，完整 J 只扣一次。旧 $R_N = O(v^8 S)$ 仅出现于乘 v 的费用，未声称它改善。

完整槽的实际乘积与质量给

$$\mathcal{C} = B_n(1+v)^{n-2}\sum_i R_i^n + O(v^{7/2}S),$$

$$\sum_i R_i^n = (M' + \mathcal{D}_9)/a \le \mathcal{V}/A_v + O(v^6 S).$$

整体 $q_N > 0$ 时乘此上包，误差为 $O(v^{19/2}S + v^{12}S)$，得主价

$$Q_{8,N}(v) = K_n\left[\frac{v^6}{(1+v)^4} + \frac{10v^7}{9(1+v)^5} + \frac{c_{8,n}v^8}{(1+v)^2}\right].$$

这里使用完整实际槽，不反向使用软权容量。

还需在本次末层控制删除及环境。当 $n \ge 3$，原盒内 dyadic、扩张及环境费用 $O(v^{n+6}S)$ 至少九阶；盒外费用为 $Cv\mathcal{F} = O(v^9 S)$。当 $n = 2$，在本层重作角窗局部计费。原扩展盒的 raw 加扩张量 q_i 满足 $\sum q_i = O(av^7 S)$。坏盒 $q_i > av^5 r_i^2$ 的原权为 $O(v^2 S)$，乘原 dyadic 的 a 系数后其成本十阶。好盒的缺量给 $\varepsilon_i \le Cv^5$，端移及扩张长度 $O(v^6 r_i)$，旧正常层在四个 $Cv^3 r_i$ 角窗内。引理 3.34 对原有限值半径的整个点集选择，其近角单向方块不交，四个远角组只向 residual 收费。因此本层同样有

$$\sum_{\text{deep}} \delta_{i,\text{in}} \le \frac{a}{1-a}\sum_i |Y_{i,N} \setminus T_i| + Ca^2 v^7 S.$$

两端正常名义面积在参数紧窗 Lipschitz，平方先验与 Cauchy 给 $\sum |Y_{i,N}| \le (2K_2 + O(v))av^5 S$。本层实际四槽使 $\sum_{\mathcal{N}} R_e^2 \le S$，于是 inside 费用为

$$(1+O(v))(v/a)\sum_{\text{deep}} \delta_{i,\text{in}} \le (8/27 + O(v))v^8 S.$$

边界及环境因 $P_I + P_\partial = O(v^8 S)$ 为十阶，盒外仍为九阶。

在整个真实质量区间 $m/g_i \in [1 - A_9 v, 1]$，

$$\frac{d(R_i + m^{1/n})^n/dm}{v/a} = (v + (m/g_i)^{-1/n})^{n-1} = 1 + O(v).$$

将 $g_i-\mu_i=(g_i-m_i^0)+\delta_i$ 的一次积分分成两段：删除保持 $1+O(v)$ 系数，只有 $\mathfrak{d}_h^0$ 乘固定 b。扣掉物理重复量后，其净系数仍至少 $1/(2a)$。原免费面若加入，只恢复一次；所有 $Cv\mathcal{F}, Cv^n\mathcal{F}, Ca\mathcal{F}$ 支出合并。在当前稳定预算下这些项为九阶或更晚。

置

$$\kappa_n=(8/27)\mathbf{1}_{\{n=2\}},\qquad Q_8(v)=Q_{8,N}(v)+\kappa_n v^8.$$

$S\le \mathcal{V}/(1-a)$ 将唯一 inside 主费用换成 $\kappa_n v^8\mathcal{V}+O(v^9S)$。本次第九层因而可取

$$E_9\le Q_8\mathcal{V}+Cv^{\rho_*}S.$$

第八、第七前缀分别用自己的 (156)；由于 $Q-Q_8=O(v^8)$，它们的中心化误差均为 $O(v^8S)$。第六前缀仍用本层 $(K_n+o(1))v^6S$，前五层只用粗价。

每层按同一次内部恢复与环境上界有共同左侧

$$\begin{aligned}\mathcal{V}\ge{}& A_vM/a+c_{\mathrm{rec}}P_I-C_{\mathrm{b}}P_\partial-2nvS_I\\&+c_{\mathrm{m}}\mathcal{D}_h/a-b(v/a)\mathfrak{d}_h^0-E_h,\qquad c_{\mathrm{m}}=1/2.\end{aligned}$$

输入体积只计一次；内部精确式保留

$$(1-a)S_I+M_I-A_vM_I/a=(1-a)(S_I-M_I/a)-(A_v-1)M_I/a.$$

令 $\tau=bv/c_{\mathrm{m}}$、$\Omega_9=\sum_{j=0}^{8}\tau^j$。由 (153)，中间缺量精确消去：

$$\sum_{h=1}^{9}\tau^{9-h}(c_{\mathrm{m}}f_h-bvf_{h-1})=c_{\mathrm{m}}f_9-bv\tau^8f_0.$$

初端除 $a\Omega_9$ 为 $A_0b^9v^{10}(M'/a)/(c_{\mathrm{m}}^8\Omega_9)=O(v^{10}S)$。先从整个权平均减同一个 $Q_8\mathcal{V}$，各层贡献为

层	9	8	7	6	$1,\dots,5$
误差	$O(v^9S)$	$O(v^9S)$	$O(v^{10}S)$	$o(v^9S)$	$O(v^{10}S)$.

第六层仅有定性领先价也足够；其逐序列小量最终有界，所以不妨碍全输入的九阶常数。图条件吸收固定边界和内部体积价，$f_9\ge0$，得到

$$\mathcal{V}\ge A_vM/a-Q_8\mathcal{V}-Cv^{\rho_*}S.$$

外部为空时直接用内部计数，不定义空 CDF 或算子。

由 (19)，用 $S/V\le(1-a)^{-1}$ 直接移实际 M，得

$$1+M/V\le\frac{A_v}{A_v-a(1+Q_8)}+C_nav^{\rho_*}.$$

小 v 时分母统一远离零。与 L_n 的准确差是

$$\frac{aA_vQ_8}{(A_v-a)(A_v-a-aQ_8)}.$$

最后分母线性化的误差除 a 为 $O(aQ_8^2)$，远晚于九阶。固定 n 下，以 $a = v^2 w,\ 0 \le w \le 1$ 作共同正分母 Taylor，到二阶的余项一致为 $O_n(v^3)$。再代 $w = v^{n-2}$：三维未保留项最早三阶，更高维更晚；二维保留 $w = 1$。故有理比值为

$$\frac{A_v}{A_v - a(1+Q_8)} = P_{8,n}(t) + O_n(av^9).$$

其中二维分母的 $8/27$ 与 inside 的 $\kappa_2 = 8/27$ 各出现一次。

若全输入上界失败，选 $v_j \to 0$ 使 $[C_n - P_{8,n}]/(av_j^{\rho_*}) \to +\infty$。按上确界取真实有限输入，再以内正则性取外部严格 halo 紧集，质量损失小于 $V_j a v_j^{\rho_*}$。密度定理给输入几乎处处入 halo，原包络给其测度有限。这条序列最终满足固定 B 的 (152)。对整条序列按上述步骤构造同一个新族，所有几何常数先固定；匹配模量只影响起效阈值；T、μ_*、η 已先固定，所有数值常数独立于输入和尺度跨度。所得有限幂上常数与发散超额矛盾。命题 3.37 对每个充分小实参数给 $C_n \ge P_{8,n} - C_n' a v^9$。上下界合并证明定理。 □

定理 *3.22* 的证明. 定理 3.38 的余项为 $o(av^8)$，故给出 (102)。 □

定理 *1.1* 高阶部分的证明. 由定理 3.38 的全部输入上界和实际有限下界，(3) 及 (5) 成立；二维取 $K_2 = 4/27$，得到 (6)。引理 2.9 给出 L_n 在 v^{n+j} 上的全部系数。补入 $j = 6, 7, 8$ 的真实修正，并用 $v^{n+j} = 2^{n+j} t^{1+j/n}$，得到 (4)；解析基线的截断为九阶，恰属所述余项。$j = 1$ 的系数为 $-n2^{n+1}$，故最初归一化极限成立。

□

4 应用：重数一致的高阶渐近

单线性几何给出固定八阶的实际展开。定理 2.8 同时说明：未来若给出某个新的固定有限阶，其多线性系数可由有限递推取得。这里先记录已得到的八阶及误差率。

推论 4.1 (八阶的统一参数形式)**.** 令

$$\begin{aligned} A_{5,m}(\varepsilon) = 1 &+ \frac{m-1}{2m}\varepsilon + \frac{(m-1)(2m-1)}{6m^2}\varepsilon^2 \\ &+ \frac{(m-1)(2m-1)(3m-1)}{24m^3}\varepsilon^3 + \frac{(m-1)(2m-1)(3m-1)(4m-1)}{120m^4}\varepsilon^4. \end{aligned} \tag{163}$$

对每个固定 $n \ge 2$，关于全部整数 $m \ge 1$ 一致有

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon) = 1 + \sum_{j=0}^{8} b_{n,j}[\varepsilon A_{5,m}(\varepsilon)]^{1+j/n} + O_n(\varepsilon^{1+9/n}). \tag{164}$$

若按普通 ε 幂排列，其第 J 项系数由 (13) 取 $r = 8$ 给出，包含全部整数 / 分数幂碰撞。

证明. 精确约化以 $s = \sigma_{1/m}(\varepsilon)$ 代入单线性强余项。引理 2.6 取 $N = 5$，给

$$0 \le s - \varepsilon A_{5,m}(\varepsilon) \le (32/3)\varepsilon^6, \qquad \varepsilon \le \varepsilon A_{5,m}(\varepsilon) \le s \le 2\varepsilon.$$

九个固定幂的均值定理误差总和为 $O_n(\varepsilon^6)$。而 $1 + 9/n \le 11/2 < 6$，故保持 (164) 的率。逐幂系数按 J=j+nk 合并；首个未保留下标至少为 9，其统一解析误差为 $O_n(\varepsilon^{1+9/n})$。 □

推论 4.2 (自然参数下的统一误差率). 对固定 $n \geq 2$，记 $s = \sigma_{1/m}(\varepsilon)$、$a_s = 2^n s$、$v_s = 2s^{1/n}$。则

$$|C_n^{(m)}(1-\varepsilon) - P_{8,n}(s)| \leq C_n a_s v_s^9$$

关于全部 $m \geq 1$ 一致，且

$$\sup_{m \geq 1} \left| \frac{C_n^{(m)}(1-\varepsilon) - P_{7,n}(s)}{a_s v_s^8} - \widehat{J}_n \right| \leq C_n' \varepsilon^{1/n}.$$

证明. 由精确约化，对同一个标量余项使用定理 3.38。共同区间 $s \in [\varepsilon, 2\varepsilon]$ 使常数和阈值不依重数，再除以 $a_s v_s^8$ 即得第二式。 □

一般有限阶传递只使用给定的标量系数。它不反向给出真实单线性常数在任意更高阶的展开或解析性；新的几何项仍须由同一输入类的上、下界确定。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. *Journal of Geometric Analysis*, 31:10194–10214, 2021. Version 2, 10 March 2020; Theorems 1.2 and 2.10.

[2] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In C. Georgakis, A. M. Stokolos, and W. Urbina, editors, *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis: In Honor of Calixto P. Calderón*, volume 108 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*, pages 87–103. Springer, Cham, 2014.

[3] Kesen Huang. Sharp Solyanik estimates for discrete and ergodic Hardy–Littlewood maximal operators. arXiv:2610.41156v1, 2026. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[4] Kesen Huang. Solyanik estimates for ergodic flows. arXiv:2610.41151v1, 2026. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[5] Mayukh Mukherjee. A sharp covering theorem and Solyanik estimates for Euclidean balls. arXiv:2609.07880v1, 2026. Preprint, version 1, 7 September 2026.