

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Aljaž Ostrež
Matrične potence

Delo diplomskega seminarja

Mentorica: izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž
Somentor: doc. dr. Pavle Boškoski

Ljubljana, 2021

KAZALO

1. Uvod	4
1.1. Fibonaccijevo zaporedje	4
1.2. Markovske verige	5
1.3. Ponovitev iz linearne algebre	7
2. Spektralni razcep	10
2.1. Matrični polinomi	10
2.2. Gladke matrične funkcije	11
2.3. Spektralna teorija	12
3. Zaporedja matričnih potenc	15
3.1. Koordinatna zaporedja	15
3.2. Asimptotsko obnašanje	17
4. Primer uporabe	18
Slovar strokovnih izrazov	18
Literatura	18

Matrične potence

POVZETEK

Powers of Matrices

ABSTRACT

Math. Subj. Class. (2020):

Ključne besede:

Keywords:

1. UVOD

Z naslednjimi zgledi bomo motivirali uporabo matričnih potenc.

1.1. Fibonaccijevo zaporedje. Poglejmo si uporabo matričnih potenc na primeru Fibonaccijevega zaporedja.

Zgled 1.1 (Fibonaccijevo zaporedje). Poznamo rekurzivno formulo za Fibonaccijevo zaporedje:

$$\begin{aligned}f_0 &= 0, f_1 = 1 \\f_{n+1} &= f_n + f_{n-1}, n \geq 1.\end{aligned}$$

Z uvedbo zaporedja $g_n = f_{n-1}$ dobimo sistem:

$$\begin{aligned}f_{n+1} &= f_n + g_n \\g_{n+1} &= f_n\end{aligned}$$

ob začetnih pogojih $f_1 = 1$ in $g_1 = 0$. Ta sistem lahko zapišemo v matrični obliki:

$$\begin{bmatrix} f_{n+1} \\ g_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ g_n \end{bmatrix}$$

za vsak $n \in \mathbb{N}$. Rekurzivno uporabljamo zgornji predpis, da dobimo

$$\begin{bmatrix} f_{n+1} \\ g_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ g_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} f_{n-1} \\ g_{n-1} \end{bmatrix} = \cdots = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} f_1 \\ g_1 \end{bmatrix}$$

oziroma

$$\begin{bmatrix} f_{n+1} \\ g_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{n+1} \\ f_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Z uporabo matričnih potenc torej lahko dobimo eksplicitno formulo za splošni člen v Fibonaccijevemu zaporedju

$$f_n = a_{21},$$

kjer je a_{21} prvi element v drugi vrstici matrike:

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n.$$

◇

Tekom študija smo že spoznali en način za računanje matričnih potenc – potence matrik lahko računamo s prevedbo na Jordanovo formo.

Naj bo $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ matrika. Potem velja:

$$A^n = P J^n P^{-1},$$

kjer je J Jordanova forma matrike A , P pa pripadajoča prehodna matrika. Vemo, da:

$$J^n = \begin{bmatrix} J_1^n & & \\ & \ddots & \\ & & J_k^n \end{bmatrix},$$

kjer so $J_i, i = 1, \dots, k$ Jordanovi bloki. Za Jordanove bloke velja:

$$J_i^n = \begin{bmatrix} \lambda_i^n & \binom{n}{1} \lambda_i^{n-1} & \cdots & \binom{n}{m_i} \lambda_i^{n-m_i} \\ & \lambda_i^n & \cdots & \binom{n}{m_i-1} \lambda_i^{n-(m_i-1)} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_i^n \end{bmatrix},$$

pri čemer je λ_i lastna vrednost matrike A , $m_i \times m_i$ pa velikost Jordanovega bloka. V posebnem primeru, ko je J diagonalna matrika, velja:

$$J^n = \begin{bmatrix} \lambda_1^n & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m^n \end{bmatrix},$$

Zgled 1.2 (Fibonaccijevo zaporedje – nadaljevanje). Z izračunom lastnih vrednosti in lastnih vektorjev bi za matriko:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

dobili Jordanovo formo (oziroma v tem primeru kar diagonalizacijo) matrike A in prehodno matriko:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} & \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Naš sistem enačb lahko zapišemo kot:

$$\begin{bmatrix} f_{n+1} \\ f_n \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = P J^n P^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Izračunamo, da je:

$$f_n = \frac{\sqrt{5}}{5} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right], \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

S pomočjo matričnih potenc smo dobili eksplicitno formulo zaporedja iz rekurzivnega predpisa. \diamond

Zakaj potrebujemo nove metode za računanje matričnih potenc, če jih že znamo računati s pomočjo Jordanove forme? Izkaže se, da je izračun Jordanove forme numerično zahteven, poleg tega pa nam Jordanova forma omogoča potenciranje matrik le v končnih dimenzijah. Velikokrat nam tudi ni potrebno izračunati celotne matrike A^n , ampak želimo le poznati nekatere njene lastnosti. Namesto Jordanove forme bomo uporabili spektralni razcep, ki ni odvisen od izbire baze matrike A .

Želeli bomo opisati asimptotsko obnašanje matričnih zaporedij s splošnim členom $A_n = A^n$, kjer je $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$. To obnašanje se lahko razbere že iz spektra matrike, včasih pa celo le iz spektralnega radija.

1.2. Markovske verige. Uporabo matričnih potenc bomo prikazali na primeru markovskih verig. Navedimo definicijo markovske verige.

Definicija 1.3. Naj bo S števna množica, ki jo poimenujemo *množica stanj*. Njene elemente $s \in S$ imenujemo *stanja*. *Slučajni proces* (z diskretnim časom) je vsako


zaporedje diskretnih slučajnih spremenljivk $X_0, X_1, \dots, X_n, \dots$, katerih zaloga vrednosti leži v S . To zaporedje imenujemo *markovska veriga*, če ima markovsko lastnost:

$$(1) \quad P(X_n = s_n | X_0 = s_0, X_1 = s_1, \dots, X_{n-1} = s_{n-1}) = P(X_n = s_n | X_{n-1} = s_{n-1}),$$


tj. verjetnost stanja na n -tem koraku je odvisna le od stanja na $(n-1)$ -tem koraku. Vpeljemo še pojma *prehodne verjetnosti* $p_{ij} = P(X_n = s_j | X_{n-1} = s_i)$ in *prehodne matrike* $P = (p_{ij})$.

Poglejmo si zgled markovske verige, ki bo hkrati tudi motiviral računanje limite zaporedja $A_n = A^n$, če ta obstaja.

Zgled 1.4. Izberimo si vozlišče na poljubnem neusmerjenem grafu. Izberemo si naključnega sosedo izbranega vozlišča in se premaknemo v njega. Postopek ponavljamo. Kakšen je delež obiskov določenega vozlišča v grafu po dolgem času? Ker sosedo izbiramo naključno, začetnemu grafu priredimo utežen usmerjen graf, kjer so uteži verjetnosti, da se premaknemo v povezanega sosedo. Tu privzamemo, da so izbire sosedov enako verjetne, za vozlišče stopnje k so vse verjetnosti enake $\frac{1}{k}$.



SLIKA 1. Začetni neusmerjen graf.



SLIKA 2. Prirejen utežen usmerjen graf.

Naša množica stanj je $S = \{A, B, C, D, E\}$, prehodna matrika pa bo kar matrika sosednosti prirejenega uteženega usmerjenega grafa

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D & E \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Ker je izbira naslednjega vozlišča v zaporedju odvisna le od trenutnega vozlišča, ima naše zaporedje markovsko lastnost, torej bo naša pot v grafu markovska veriga. Kaj nam pa pove prehodna matrika?

- Matrika P nam pove, kakšna je verjetnost, da bomo prišli v določeno vozlišče v naslednjem koraku, če smo trenutno v vozlišču, ki ga predstavlja vrstica.
- P^2 nam pove, kakšna je verjetnost, da bomo prišli v določeno vozlišče čez 2 koraka.

• ...

Za naš primer se izkaže celo, da obstaja limita:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{bmatrix} 0,25 & 0,17 & 0,33 & 0,17 & 0,08 \\ 0,25 & 0,17 & 0,33 & 0,17 & 0,08 \\ 0,25 & 0,17 & 0,33 & 0,17 & 0,08 \\ 0,25 & 0,17 & 0,33 & 0,17 & 0,08 \\ 0,25 & 0,17 & 0,33 & 0,17 & 0,08 \end{bmatrix}.$$

Ta limita nam pove delež obiskov za vsako vozlišče (če bi zelo dolgo potovali). Limita je tudi neodvisna od izbire začetnega vozlišča, če je le graf povezan. \diamond

1.3. Ponovitev iz linearne algebre. Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ matrika dimenzije $n \times n$. Definiramo množico polinomov matrike A s predpisom

$$(2) \quad \mathcal{P}_A := \left\{ \sum_{i=0}^m \alpha_i A^i \mid \alpha_i \in \mathbb{C}, m \in \mathbb{N}_0 \right\} \subset \mathbb{C}^{n \times n}.$$

Če je $p(x) = \sum_{i=0}^m \alpha_i x^i$ polinom, bomo pisali

$$(3) \quad p(A) := \sum_{i=0}^m \alpha_i A^i.$$

Definiramo preslikavo

$$(4) \quad \begin{aligned} \Phi_A : \mathbb{C}[x] &\longrightarrow \mathcal{P}_A \\ p &\longmapsto p(A), \end{aligned}$$

kjer je $\mathbb{C}[x]$ množica polinomov s koeficienti iz \mathbb{C} . Jedro preslikave Φ_A je

$$(5) \quad \ker(\Phi_A) = \left\{ p \in \mathbb{C}[x] \mid p(A) = 0 \right\},$$

torej $\ker(\Phi_A)$ je množica vseh polinomov, za katere je $p(A) = 0$.

Definicija 1.5. Minimalni polinom $m_A \in \mathbb{C}[x]$ je neničeln monični polinom najmanjše stopnje iz $\ker(\Phi_A)$, tj. monični polinom p najnižje stopnje, za katerega je $p(A) = 0$.

Opomba 1.6. Monični polinom je polinom z vodilnim koeficientom enakim 1.

Spomnimo se, da je minimalni polinom m_A enolično določen z matriko A . Potrebovali bomo še pojem *lastne vrednosti* in *lastnega vektorja* matrike A , osvežimo pa še definicijo *karakterističnega polinoma* matrike A . Poleg tega navedimo še definicijo *lastnega podprostora*.

Definicija 1.7. Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

- Število $\lambda \in \mathbb{C}$ imenujemo *lastna vrednost* matrike A , če obstaja vektor $x \in \mathbb{C}^n$, $x \neq 0$, tako da velja

$$(6) \quad Ax = \lambda x.$$

Vektorji x , za katere velja zgornja enačba, so pripadajoči *lastni vektorji*.

- Polinom

$$(7) \quad \Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) \in \mathcal{P}_A$$

v spremenljivki λ imenujemo *karakteristični polinom* matrike A .

- *Lastni podprostor* matrike A , ki pripada lastni vrednosti λ , je definiran kot $\ker(A - \lambda I)$.

Algebraična večkratnost lastne vrednosti λ je večkratnost λ kot ničle polinoma $\Delta_A(\lambda)$. *Geometrična večkratnost* lastne vrednosti λ pa je dimenzija pripadajočega lastnega podprostora $\ker(A - \lambda I)$. Brez dokaza se spomnimo naslednje trditve, s pomočjo katere med drugim tudi na roke iščemo lastne vrednosti matrike A .

Trditev 1.8. *Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, m_A pripadajoči minimalni polinom, Δ_A pripadajoči karakteristični polinom in $\lambda \in \mathbb{C}$. Naslednje trditve so ekvivalentne:*

- (1) λ je lastna vrednost matrike A ,
- (2) λ je ničla polinoma m_A ,
- (3) λ je ničla polinoma Δ_A .

Iz dejstva, da je lastna vrednost λ ničla polinoma Δ_A , torej $\det(A - \lambda I) = 0$, sledi, da matrika $A - \lambda I$ ni obrnljiva.

Posledica 1.9. *Število $\lambda \in \mathbb{C}$ je lastna vrednost matrike A natanko tedaj, ko matrika $A - \lambda I$ ni obrnljiva.*

Matrika $A - \lambda I$ je *nilpotentna* reda ν , kjer je ν geometrična večkratnost lastne vrednosti λ . To pomeni, da velja $(A - \lambda I)^k = 0$ za $k \geq \nu$.

Iz zgornje trditve sledi, da lahko minimalni polinom m_A matrike A zapišemo kot

$$(8) \quad m_A(z) = (z - \lambda_1)^{\nu_1} (z - \lambda_2)^{\nu_2} \cdots (z - \lambda_m)^{\nu_m},$$

kjer $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ lastne vrednosti matrike A , ν_1, \dots, ν_m pa pripadajoče geometrične večkratnosti.

V nadaljevanju bomo omenjali tudi *matrične* in *operatorske norme*, zato se spomnimo lastnosti norme.

Definicija 1.10. *Matrična norma* na $\mathbb{C}^{n \times n}$ je takšna preslikava $\|\cdot\| : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$, da za vsaki matriki $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ in vsak skalar $\alpha \in \mathbb{C}$ velja:

- (1) $\|A\| \geq 0$ in $\|A\| = 0$ natanko tedaj, ko je $A = 0$ (pozitivnost),
- (2) $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$ (homogenost),
- (3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ (trikotniška neenakost),
- (4) $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ (submultiplikativnost).

Matrične norme, ki so porojene iz vektorskih norm s predpisom

$$(9) \quad \|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \quad \text{za } x \in \mathbb{C}^n,$$

imenujemo *operatorske norme*.

Operatorska norma je torej podrazdred matričnih norm in ima nekaj zanimivih lastnosti.

Trditev 1.11. *Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $x \in \mathbb{C}^{n \times n}$ in $\|\cdot\|$ operatorska norma na $\mathbb{C}^{n \times n}$. Potem velja*

$$(10) \quad \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|.$$

Dokaz. Za $x = 0$ trditev očitno velja. Za $x \neq 0$ pa velja

$$(11) \quad \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A\|,$$

torej je $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$. □

Posledica 1.12. Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ in $\|\cdot\|$ neka operatorska norma na $\mathbb{C}^{n \times n}$. Potem velja neenakost

$$(12) \quad \|A\| \geq \max\{|\lambda_i|, \lambda_i \text{ je lastna vrednost matrice } A\}.$$

Dokaz. Po definiciji lastne vrednosti velja $Ax = \lambda x$ za neki lastni vektor $x \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $x \neq 0$. Zato velja tudi

$$(13) \quad \|Ax\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|.$$

Ker je $\|\cdot\|$ operatorska norma, po trditvi 1.11 velja

$$(14) \quad \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|.$$

Sledi, da je

$$(15) \quad |\lambda| \cdot \|x\| \leq \|A\| \cdot \|x\|,$$


torej je $|\lambda| \leq \|A\|$. To velja za vsako lastno vrednost λ . Posledica sledi. \square

Definicija 1.13. Matrika $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ je *projekcija*, če velja $P^2 = P$.

Zgled 1.14. Poglejmo si primer pravokotne projekcije v prostoru \mathbb{R}^3 . Za pravokotno projekcijo velja, da je $\ker P \perp \text{Im } P$. Projecirajmo vektor $v = (1, 1, 0)$ na ravnino Σ , ki je podana z enačbo $x + y + z = 0$. Ta ravnina ima normalni vektor $n = (1, 1, 1)$, ki ni normaliziran. Vemo, da s formulo

$$(16) \quad \text{proj}_n(v) = \frac{n \cdot v}{n \cdot n} \cdot n$$

projeciramo vektor v na vektor n . S tem lahko izračunamo tudi projekcijo vektorja v na ravnino Σ .



SLIKA 3. Projekcija vektorja v na vektor ravnino Σ .

Če vstavimo v in n v formulo (16), dobimo

$$(17) \quad \text{proj}_n(v) = \frac{2}{3} \cdot (1, 1, 1).$$

Ker velja $x = v - \text{proj}_n(v)$, je torej

$$(18) \quad x = \text{proj}_\Sigma(v) = \frac{1}{3} \cdot (1, 1, -2).$$

Bolj zanimiv, kot le izračun $\text{proj}_\Sigma(v)$, pa je izračun projekcijske matrice, ki vektor v projecira na vektor n . Če pišemo skalarni produkt kot množenje matrik, tj. $a \cdot b = a^T \cdot b$, iz komutativnosti skalarjev in asociativnosti matričnega množenja sledi

$$(19) \quad \text{proj}_n(v) = \frac{n^T v}{n^T n} \cdot n = \frac{(n^T v)n}{n^T n} = \frac{n(n^T v)}{n^T n} = \frac{nn^T}{n^T n} \cdot v.$$

S P označimo izraz $\frac{nn^T}{n^T n}$. Izračunamo, da je

$$(20) \quad P = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

velja pa tudi $P^2 = P$, kar pomeni, da je P projekcija. Enačba $\text{proj}_n(v) = Pv$ pa sledi direktno iz izpeljave. \diamond

Definicija 1.15. Naj bosta X in Y vektorska prostora nad \mathbb{C} , da velja $X \cap Y = \emptyset$. Tedaj vsoti

$$(21) \quad X + Y = \{x + y \mid x \in X, y \in Y\}$$

pravimo *direktna vsota* in jo označimo z $X \oplus Y$.

Trditev 1.16. Matrica $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ je projekcija natanko tedaj, ko je

$$(22) \quad \mathbb{C}^n = \ker P \oplus \text{Im } P \quad \text{in} \quad P|_{\text{Im } P} = I.$$

Dokaz. (\Leftarrow) $P|_{\text{Im } P} = I$ implicira $P(Px) = Px$, tj. $P^2 = P$, kar je ravno definicija projekcije.

(\Rightarrow) Naj bo $x \in \mathbb{C}^n$ in $y \in \text{Im } P$, tako da velja $y = Px$. Definirajmo $z := x - y$. Potem je $x = z + y$ in

$$(23) \quad Pz = Px - Py = Px - P^2x = Px - Px = 0,$$

torej je $z \in \ker P$. Lahko sklepamo tudi, da iz $y \in \text{Im } P$ sledi $Py = y$.

Dokažimo še, da je da je razcep na direktno vsoto enoličen. Naj bosta $y' \in \text{Im } P$ in $z' \in \ker P$. Naj bo $x = y' + z'$. Iz računa

$$(24) \quad y = Px = Py' + Pz' = y'$$

sledi, da je $y = y'$ in $z = z'$. \square

2. SPEKTRALNI RAZCEP

2.1. Matrični polinomi. V podpoglavju 1.3 smo že definirali množico matričnih polinomov \mathcal{P}_A in minimalni polinom matrike $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, pa tudi preslikavo Φ_A iz množice polinomov $\mathbb{C}[x]$ v \mathcal{P}_A .

Trditev 2.1. Naj bo m_A minimalni polinom. Potem je

$$(25) \quad p \in \ker(\Phi_A) \Leftrightarrow p = m_A \cdot q \quad \text{za} \quad q \in \mathbb{C}[x],$$

tj. $p(A) = 0$ natanko tedaj, ko je $p(A)$ večkratnik minimalnega polinoma m_A .

Dokaz. Najprej dokažimo implikacijo (\Leftarrow) . Naj bo m_A minimalni polinom. Če je $p = m_A \cdot q$ za nek $q \in \mathbb{C}[x]$, potem je

$$(26) \quad p(A) = m_A(A) \cdot q(A) = 0 \cdot q(A) = 0,$$

torej je $p \in \ker(\Phi_A)$.

Dokažimo še (\Rightarrow) . Naj bo $p \in \mathbb{C}[x]$, za katerega velja $p(A) = 0$. Če delimo p z m_A , dobimo:

$$p = m_A \cdot q + r$$

za $q, r \in \mathbb{C}[x]$, da velja $\text{st}(r) < \text{st}(q)$. Velja

$$0 = p(A) = \underbrace{m_A(A)}_{=0} \cdot q(A) + r(A) = r(A),$$

torej je $r \in \ker(\Phi_A)$. Ker ima m_A najmanjšo stopnjo v $\ker(\Phi_A)$, sklepamo, da je $r \equiv 0$. \square

Za polinome $p, q, r \in \mathbb{C}[x]$ bomo uporabljali zapis

$$(27) \quad p \equiv q \pmod{r} \iff p - q = s \cdot r \text{ za nek } s \in \mathbb{C}[x].$$

Poglejmo si posledico trditve 2.1

Posledica 2.2. Naj bosta $p, q \in \mathbb{C}[x]$. Velja

$$(28) \quad p(A) = q(A) \iff p \equiv q \pmod{m_A}.$$

V posebnem primeru velja, da je $p(A)$ projekcija natanko tedaj, ko je

$$(29) \quad p^2 \equiv p \pmod{m_A}.$$

Zgornja posledica nam pove, da polinoma p in q nista nujno enaka v $\mathbb{C}[x]$, da je $p(A) = q(A)$. Naslednja trditev pa nam pove, da lahko enakost po $\pmod{m_A}$ preverimo le s pomočjo lastnih vrednosti matrike A in njihovih večkratnosti.

Trditev 2.3. Naj bosta $p, q \in \mathbb{C}[x]$. Za vsak $i = 1, \dots, m$ in $\nu = 0, \dots, \nu_i - 1$ velja

$$(30) \quad p \equiv q \pmod{m_A} \iff p^{(\nu)}(\lambda_i) = q^{(\nu)}(\lambda_i).$$

Dokaz. Trditev sledi iz dejstva, da za nek $n \in \mathbb{N}$ in neničeln $q \in \mathbb{C}[x]$ ter fiksen $z_1 \in \mathbb{C}$ velja

$$p(z) = (z - z_1)^n q(z) \iff p^{(i)}(z_1) = 0 \text{ za } i = 0, 1, \dots, n - 1,$$

kar smo že dokazali pri študiju algebre. \square

2.2. Gladke matrične funkcije. Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ matrika z minimalnim polinomom m_A . Naj bodo $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ničle m_A z večkratnostimi ν_1, \dots, ν_m . Definirajmo množico funkcij, ki so definirane in neskončnokrat odvedljive na okolici $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$, s prepisom

$$(31) \quad C_A^\infty := \{f : D(f) \rightarrow \mathbb{C} \mid \exists U \subset D(f) \text{ odprta, } \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\} \subset U, f|_U \in C^\infty\},$$

kjer je $D(f) \subset \mathbb{C}$ definicijsko območje funkcije f .

Definicija 2.4. Naj bo $f \in C_A^\infty$. Definiramo:

$$(32) \quad f(A) := \Phi_A(p_f) = p_f(A),$$

kjer je p_f polinomska interpolacija funkcije f , ki zadošča pogoju

$$(33) \quad f^{(\nu)}(\lambda_i) = p_f^{(\nu)}(\lambda_i)$$

za vsak $i = 1, \dots, m$ in $\nu = 0, \dots, \nu_i - 1$.

S to definicijo lahko matrične polinome razširimo na množico gladkih matričnih funkcij:

$$(34) \quad \begin{aligned} \tilde{\Phi} : C_A^\infty &\longrightarrow \mathcal{P}_A \\ \tilde{\Phi}_A(f) &= \Phi_A(p_f) = p_f(A) \end{aligned}$$

Opomba 2.5. Za $n + 1$ različnih točk $(z_0, f(z_0)), (z_1, f(z_1)), \dots, (z_n, f(z_n))$ je interpolacijski polinom stopnje največ n . Če pa zahtevamo, da se v teh točkah ujemajo tudi i_k -ti odvodi, pa je stopnja interpolacijskega polinoma navzgor omejena z $\sum_0^n (i_k + 1) - 1$.

Iz definicije 2.4 in trditev 2.1, 2.3 sledi:

Trditev 2.6. Naj bodo oznake kot zgoraj. Velja:

- (1) Definicija $\tilde{\Phi}_A(f)$ ni odvisna od izbire metode za polinomsko interpolacijo p_f .
- (2) Preslikava $\tilde{\Phi}_A$ je razširitev funkcije Φ_A .
- (3) $\tilde{\Phi}$ je homomorfizem algeber, kar pomeni, da velja:

$$\begin{aligned}\tilde{\Phi}_A(\lambda f + \mu g) &= \lambda \tilde{\Phi}_A(f) + \mu \tilde{\Phi}_A(g), \\ \tilde{\Phi}_A(f \cdot g) &= \tilde{\Phi}_A(f) \cdot \tilde{\Phi}_A(g)\end{aligned}$$

za $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ in $f, g \in C_A^\infty$.

2.3. Spektralna teorija. Definirajmo karakteristično funkcijo χ_U s predpisom

$$(35) \quad \chi_U(\lambda) = \begin{cases} 1, & \lambda \in U, \\ 0, & \lambda \notin U \end{cases}$$

za odprte množice $U \subset \mathbb{C}$, za katere velja $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\} \in U$. Funkcija χ_U je idempotent, kar pomeni, da velja $\chi_U \cdot \chi_U = \chi_U$. Po posledici 2.2 sklepamo, da je $\chi_U(A) \in \mathcal{P}_A$ projekcija, ki komutira z A . Vzemimo posebno množico takšnih projekcij.

Definicija 2.7. Naj bodo $U_1, \dots, U_m \subset \mathbb{C}$ odprte množice, ki zadostujejo pogojema:

- (1) $\lambda_i \in U_i$ za $i = 1, \dots, m$ in
- (2) $U_i \cap U_j = \emptyset$ za $i \neq j$.

Z χ_i označimo karakteristično funkcijo množice U_i . Matrike

$$(36) \quad P_i := \chi_i(A) \in \mathcal{P}_A \text{ za } i = 1, \dots, m,$$

so spektralne projekcije, njihovo zalogo vrednosti pa bomo označili z

$$(37) \quad X_i := \text{Im } P_i = P_i \mathbb{C}^n$$

in jo imenujemo *korenski podprostor* za lastno vrednost λ_i .

Omenimo, da je P_i neodvisna od izbire U_i , poleg tega pa velja še $P_i \neq 0$ za vsak i .

Trditev 2.8. Naj $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ matrika z minimalnim polinomom m_A , z ničlami $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ in z večkratnostmi ν_1, \dots, ν_m . Če vzamemo P_i in X_i kot v (36) in (37), potem je

$$(38) \quad \mathbb{C}^n = X_1 \oplus \dots \oplus X_m$$

razcep direktnih vsot v A -invariantne podprostore z omejitvijo, da je $A - \lambda_i I$ nilpotentna reda ν_i na X_i za $i = 1, \dots, m$.

Dokaz. Ker so množice U_i disjunktne, velja $\chi_i(\sum_{i \neq j} \chi_j) = 0$, torej tudi $P_i(\sum_{i \neq j} P_j) = 0$. Iz tega sledi, da je

$$(39) \quad X_i \cap \left(\bigoplus_{i \neq j} X_j \right) = \{0\}.$$

Ker je $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\} \subset \bigcup_{i=1}^m U_i =: U$, je

$$(40) \quad \sum_{i=1}^m P_i = \tilde{\Phi}_A\left(\sum_{i=1}^m \chi_i\right) = \tilde{\Phi}_A(\chi_U) = I,$$

torej $X_1 \oplus \dots \oplus X_m = X$. □

Definicija 2.9. Razcepu \mathbb{C}^n na invariante podprostore iz formule (38) rečemo *spektralni razcep* prostora \mathbb{C}^n .

Opomba 2.10. Podprostor X_i je *invarianten* za A oziroma *A-invarianten*, kadar velja $Ax \in X_i$ za vsak $x \in X_i$, kar lahko zapišemo kot $AX_i \subseteq X_i$.

Spektralni razcep nam pove, da je matrika A podobna bločno diagonalni matriki,

$$(41) \quad A \sim \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_m \end{bmatrix},$$

kjer ima A_i le eno samo lastno vrednost, in sicer λ_i . Ena takših bločno diagonalnih matrik je *Jordanova forma* matrike A , kjer za bloke A_i vzamemo Jordanove bloke J_i , ki pripadajo lastnim vrednostim λ_i . Iz tega dejstva bi lahko slutili, da bi za podprostore X_i vzeli kar korenske podprostore $\ker(A - \lambda_i I)^{\nu_i}$ za lastne vrednosti λ_i .

Trditev 2.11. *Korenski podprostor matrike A za lastne vrednosti λ_i so*

$$(42) \quad X_i = \ker(A - \lambda_i I)^{\nu_i},$$

kjer je ν_i večkratnost lastne vrednosti λ_i .

Dokaz. Trditev 2.8 nam pove, da je $A - \lambda_i I$ nilpotentna reda ν_i na X_i , zato je

$$(43) \quad X_i \subset \ker(A - \lambda_i I)^{\nu_i}.$$

Recimo, da je vsebovanost stroga, torej obstaja neničeln vektor $x \in \ker(A - \lambda_i I)^{\nu_i} \setminus X_i$. Za neki $i \neq j$ obstaja $y := P_j x \in X_j \cap \ker(A - \lambda_i I)^{\nu_i}$. Vzamemo največji $p \in \mathbb{N}$, da velja

$$(44) \quad z := (A - \lambda_i I)^p y \neq 0.$$

Potem je $z \in X_j$ in $Az = \lambda_j z$, iz česar sledi, da

$$(45) \quad (A - \lambda_j I)^{\nu_j} z = (\lambda_i - \lambda_j)^{\nu_j} z \neq 0,$$

kar je protislovje s predpostavko, da je vsebovanost (43) stroga. \square

Trditev 2.12. *Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ z lastnimi vrednostmi $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, ki imajo po vrsti večkratnosti $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_m$. Definirajmo projekcije P_i kot v (36). Tedaj za vsako funkcijo $f \in C_A^\infty$ velja*

$$(46) \quad f(A) = \sum_{i=1}^m \sum_{\nu=0}^{\nu_i-1} \frac{f^{(\nu)}(\lambda_i)}{\nu!} (A - \lambda_i I)^\nu P_i.$$

Dokaz. Funkcija

$$(47) \quad g(\lambda) = \sum_{i=1}^m \sum_{\nu=0}^{\nu_i-1} \frac{f^{(\nu)}(\lambda_i)}{\nu!} (\lambda - \lambda_i)^\nu \chi_i(\lambda), \quad \lambda \in \mathbb{C},$$

sovpada z f , vključno z vsemi pomembnimi odvodi, na vseh točkah $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Po trditvah 2.3 in 2.6 sledi, da je $f(A) = g(A)$. \square

Posledica 2.13. *Naj bodo predpostavke enake kot v trditvi 2.12. Za $k \in \mathbb{N}$ velja*

$$(48) \quad A^k = \sum_{i=1}^m \sum_{\nu=0}^{\min\{\nu_i-1, k\}} \binom{k}{\nu} \lambda_i^{k-\nu} (A - \lambda_i I)^\nu P_i.$$

Dokaz. V trditvi 2.12 za $k \in \mathbb{N}$ uporabimo funkcijo $f(\lambda) = \lambda^k$. \square

Definicija 2.14. Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Množico

$$(49) \quad \sigma(A) := \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$$

imenujemo *spekter* matrike A . Spektralni radij definiramo kot

$$(50) \quad r(A) := \max\{|\lambda|, \lambda \in \sigma(A)\},$$

tj. absolutno največja lastna vrednost matrike A .

Naslednja trditev nam pove, kako se preslika spekter matrike za neko preslikavo iz C_A^∞ .

Izrek 2.15 (Izrek o preslikavi spektra). *Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ in $f \in C_A^\infty$. Potem velja*

$$(51) \quad \sigma(f(A)) = f(\sigma(A)) := \{f(\lambda) | \lambda \in \sigma(A)\}.$$

Dokaz. Naj bo λ poljubna lastna vrednost matrike A in $\mu \notin f(\sigma(A))$. Definiramo $u(\lambda) := \frac{1}{f(\lambda) - \mu} \in C_A^\infty$, torej je $u \cdot (f(A) - \mu I) = 1$ na okolici $\sigma(A)$. Če v to enačbo vstavimo matriko A , dobimo

$$(52) \quad u(A) \cdot (f(A) - \mu I) = (f(A) - \mu I) \cdot u(A) = I,$$

torej matrika $f(A) - \mu I$ ni obrnljiva, zato po posledici 1.9 sledi $\mu \in \sigma(f(A))$.

Naj bo x_i lastni vektor matrike A za pripadajočo lastno vrednost λ_i za $i = 1, \dots, m$. Po trditvi 1.9 za vse $i \neq j$ velja $P_j x_i = 0$. Iz trditve 2.12 sledi

$$(53) \quad f(A)x_i = f(\lambda_i)x_i,$$

torej je $f(\lambda_i) \in \sigma(f(A))$. □

Lema 2.16. *Naj bo $\|\cdot\|$ norma na $\mathbb{C}^{n \times n}$. Za $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ in $\mu > r(A)$ obstajata konstanti $N > 0$ in $M > 1$, da za vse $k \in \mathbb{N}$ velja*

$$(54) \quad N \cdot r(A)^k \leq \|A^k\| \leq M \cdot \mu^k.$$

Če je $\|\cdot\|$ operatorska norma, izberemo $N = 1$.

Dokaz zgornje leme bo sledil v nadaljevanju. Ta lema pa implicira zanimivo formulo, s pomočjo katere lahko spektralni radij matrike izračunamo s pomočjo matričnih potenc.

Trditev 2.17 (Gelfandova formula). *Za matriko $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ velja:*

- (1) $r(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k}$ za vsako matrično normo $\|\cdot\|$ na $\mathbb{C}^{n \times n}$,
- (2) če je $\|\cdot\|$ operatorska norma na $\mathbb{C}^{n \times n}$, potem je $r(A) = \inf_{k > 0} \|A^k\|^{1/k}$.

Dokaz. Uporabimo posledico leme 2.16

$$N^{1/k} r(A) \leq \|A^k\|^{1/k} \leq M^{1/k} \mu.$$

To smo dobili tako, da smo enačbo v lemi pomnožili z $\frac{1}{k}$. Če je $\|\cdot\|$ operatorska norma, za dopustno izbiro $N = 1$ dobimo $r(A) = \inf_{k > 0} \|A^k\|^{1/k}$. □

3. ZAPOREDJA MATRIČNIH POTENC

3.1. Koordinatna zaporedja.

Lema 3.1. Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ z lastnimi vrednostmi $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ z večkratnostmi ν_1, \dots, ν_m .

(1) Za $i = 1, \dots, m$ in $0 \neq z \in X_i$ je množica

$$(55) \quad \{(A - \lambda_i I)^\nu \mid \nu = 0, \dots, \nu_i - 1\} \setminus \{0\}$$

linearno neodvisna v X_i .

(2) Množica

$$(56) \quad B_A = \{(A - \lambda_i I)^\nu P_i \mid i = 1, \dots, m; \nu = 0, \dots, \nu_i - 1\}$$

je linearno neodvisna v \mathbb{C}^n .

Dokaz. (1) Naj bo $i = 1, \dots, m$ in $0 \neq z \in \mathbb{C}^n$. Preveriti moramo, da so vektorji $(A - \lambda_i I)^\nu, \nu = 0, \dots, \nu_i - 1$ neodvisni. Ker je matrika $A - \lambda_i I$ nilpotentna reda ν_i , je

$$(57) \quad (A - \lambda_i I)^\nu = 0 \text{ za } \nu \geq \nu_i,$$

torej moramo preveriti linearno neodvisnost ν_i vektorjev. Po definiciji linearne neodvisnosti mora iz enačbe

$$(58) \quad \sum_{\nu=0}^{\nu_i-1} \alpha_\nu (A - \lambda_i I)^\nu z$$

slediti, da je $\alpha_\nu = 0$ za $\nu = 0, \dots, \nu_i - 1$. Če enačbo 58 pomnožimo z $(A - \lambda_i I)^{\nu_i-1}$ iz leve, enačba (58) z upoštevanjem (57) preide v

$$(59) \quad 0 = \alpha_0 (A - \lambda_i I)^{\nu_i-1} z.$$

Ker $(A - \lambda_i I)^{\nu_i-1} z \neq 0$, je $\alpha_0 = 0$. Če bi enačbo (58) pomnožili z $(A - \lambda_i I)^{\nu_i-2}$ in upoštevali, da je $\alpha_0 = 0$, bi dobili $\alpha_1 = 0$ itd. Sledi, da so $\alpha_0, \dots, \alpha_{\nu_i-1} = 0$ in posledično vektorji $(A - \lambda_i I)^\nu, \nu = 0, \dots, \nu_i - 1$ neodvisni.

(2) Podobno kot v dokazu točke (1) bi dokazali, da je množica

$$(60) \quad B_A^{(i)} := \{(A - \lambda_i I)^\nu P_i \mid \nu = 0, \dots, \nu_i - 1\}$$

linearno neodvisna v $\mathbb{C}^{n \times n}$ za vsak $i = 1, \dots, m$. Dokazati moramo, da so matrike $(A - \lambda_i I)^\nu P_i$ neodvisne, torej

$$(61) \quad \sum_{i=1}^m \sum_{\nu=0}^{\nu_i-1} \alpha_{i,\nu} (A - \lambda_i I)^\nu P_i = 0.$$

Če to enačbo za fiksni i pomnožimo s P_i in ker je $P_i \cdot P_j = 0$ za $i \neq j$ in $P_i^2 = P_i$ dobimo

$$(62) \quad \sum_{\nu=0}^{\nu_i-1} \alpha_{i,\nu} (A - \lambda_i I)^\nu P_i = 0.$$

Iz linearne neodvisnosti množice $B_A^{(i)}$ sledi, da je $\alpha_{i,\nu} = 0$ za $i = 1, \dots, m$ in $\nu = 0, \dots, \nu_i - 1$.

□

Zanima nas asimptotsko obnašanje zaporedij oblike A^k . Za razumevanje asimptotskega obnašanja bomo uporabili neodvisnost množice

$$(63) \quad B_A := \{(A - \lambda_i I)^\nu P_i \mid i = 1, \dots, m; \nu = 0, \dots, \nu_i - 1\}$$

iz leme 3.1. Če to množico razširimo na bazo na bazo \mathbb{B}_A prostora $\mathbb{C}^{n \times n}$, potem iz formule (48) sledi, da so neničelne kooordinate zaporedja A^k v bazi \mathbb{B}_A enake

$$(64) \quad \left\{ \binom{k}{\nu} \lambda_i^{k-\nu} \mid i = 1, \dots, m; \nu = 0, \dots, \nu_i - 1 \right\}.$$

Ker gre $k \rightarrow \infty$, lahko poenostavimo $\nu = \min\{\nu_i - 1, k\}, \dots, \nu_i - 1$. Podobne koordinate dobimo, če gledamo zaporedje $A^k x$, torej če gledamo množico

$$(65) \quad \{(A - \lambda_i I)^\nu P_i x \mid i = 1, \dots, m; \nu = 0, \dots, \nu_i - 1\} \setminus \{0\}.$$

Ker je konvergenca v končno dimenzionalnih vektorskih prostorih ekvivalentna konvergenci koordinat, se neodvisno od izbire baze obnašanje zaporedja A^k , ko gre $k \rightarrow \infty$, odraža s *koordinatnimi zaporedji*

$$(66) \quad z_{\lambda, \nu}(k) := \binom{k}{\nu} \lambda^{k-\nu}$$

za $\lambda \in \sigma(A)$, $\nu = 0, \dots, n - 1$ – tukaj upoštevamo, da je $\nu_i \leq n$ za vsak i . V primeru, da vsa koordinatna zaporedja konvergirajo, konvergira tudi zaporedje A^k oziroma $A^k x$. Koordinate limite zaporedja A^k , ko gre $k \rightarrow \infty$, se izražajo s pripadajočimi limitami koordinatnih zaporedij.

Konvergenca koordinatnih zaporedij se lahko razbere iz velikosti lastnih vrednosti λ in pripadajoče večkratnosti ν .

- Če je $|\lambda| < 1$, potem gre $z_{\lambda, \nu}(k) \rightarrow 0$, ko gre $k \rightarrow \infty$, za vse ν , ker je $\lim_{k \rightarrow \infty} k^\nu \lambda^k = 0$.
- Če je $|\lambda| > 1$, potem gre $|z_{\lambda, \nu}(k)| \rightarrow \infty$, ko gre $k \rightarrow \infty$, za vse ν .
- Če je $|\lambda| = 1$ in $\nu = 0$, potem je $z_{\lambda, 0}(k) = \lambda^k$.
- Če je $|\lambda| = 1$ in $\nu \geq 1$, potem gre $|z_{\lambda, \nu}(k)| \rightarrow \infty$, ko gre $k \rightarrow \infty$.

Z uvedbo koordinatnih zaporedij lahko dokažemo lemo 2.16, iz katere sledi Gelfandova formula 2.17.

Dokaz. (Lema 2.16) Po izreku o preslikavi spektra 2.15 velja

$$(67) \quad (r(A))^k = r(A^k),$$

torej izbira $N = 1$ za operatorske norme sledi iz posledice 1.12. Ocena

$$(68) \quad N \cdot r(A)^k \leq \|A^k\|$$

za neki $N > 0$ sledi iz dejstva, da so norme na končno dimenzionalnih prostorih ekvivalentne.

Dokazati moramo še oceno navzgor. Koordinate zaporedja A^k glede na bazo $\mathbb{C}^{n \times n}$, ki vsebuje množico

$$(69) \quad B_A := \{(A - \lambda_i I)^\nu P_i \mid i = 1, \dots, m; \nu = 0, \dots, \nu_i - 1\},$$

so enake

$$(70) \quad z_{\lambda, \nu}(k) := \binom{k}{\nu} \lambda^{k-\nu},$$

kjer je $i = 1, \dots, m$ in $\nu = 0, \dots, \nu_i - 1$. Ker velja ocena

$$(71) \quad \binom{k}{\nu} \leq k^\nu,$$

in ker za $|\lambda| < 1$ velja $k^\nu \lambda^{k-\nu} \rightarrow 0$, ko gre $k \rightarrow \infty$, za vse $\nu \in \mathbb{N}$, je zaporedje $\frac{1}{\mu^k} A^k$ omejeno, ko gre $k \rightarrow \infty$. Torej je

$$(72) \quad \frac{1}{\mu^k} \|A^k\|_\infty \leq M \text{ oziroma } \|A^k\|_\infty \leq M \mu^k$$

za neko konstanto $M \in \mathbb{N}$ in vsak $n \in \mathbb{N}$. Ocena

$$(73) \quad \|A^k\| \leq M \mu^k$$

spet sledi iz dejstva, da so si norme ekvivalentne. \square

Opomba 3.2.

- (1) To, da so matrične norme med seboj ekvivalentne, pomeni, da za poljubni normi $\|\cdot\|_a$ in $\|\cdot\|_b$ obstajata konstanti $C_1, C_2 > 0$, da za vsako matriko $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ velja

$$(74) \quad C_1 \|A\|_a \leq \|A\|_b \leq C_2 \|A\|_a.$$

- (2) Norma $\|\cdot\|_\infty$ je za $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ definirana kot

$$(75) \quad \|A\|_\infty = \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

Ta norma je ena izmed matričnih norm v razredu p -norm in ji pravimo ∞ -norma.

3.2. Asimptotsko obnašanje.

Definicija 3.3. Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}(X)$ in $\|\cdot\|$ neka matrična norma. Zaporedje (A^k) je:

- *omejeno*, če je $\sup_{k \in \mathbb{N}} \|A^k\| < \infty$,
- *stabilno*, če je $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\| = 0$,
- *konvergentno*, če je $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = P$ za neko matriko $P \in \mathbb{C}^{n \times n}(X)$,
- *periodično* s periodo p , če je $A^p = I$,
- *Cesàrovo konvergentno*, če obstaja limita $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} A^l \right)$.

Členom zaporedja $A^{(k)} = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} A^l$ pravimo *Cesàrova povprečja*.

Pokazali bomo, da se asimptotsko obnašanje A^k odraža z velikostjo $r(A)$ v primerjavi z 1. Pred tem se dogovorimo za nekaj oznak.

Koreni enote v \mathbb{C} so rešitve enačbe $z^q = 1$, torej

$$(76) \quad \Gamma_q := \{e^{\frac{2k\pi i}{q}} \mid k = 0, \dots, q-1\}.$$

Z Γ bomo označili enotsko kronico v \mathbb{C} .

V izreku bomo uporabili tudi naslednjo definicijo.

Definicija 3.4. Lastna vrednost $\lambda_0 > 0$ matrike $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ je *dominantna lastna vrednost*, če je $\lambda_0 \in \sigma(A)$ in velja $|\lambda| < \lambda_0$ za vse $\lambda \in \sigma(A) \setminus \{\lambda_0\}$.

Izrek 3.5. Naj bo $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Naj bo $\{A^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ matrično zaporedje. Veljajo naslednje trditve:

- (1) $\{A^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ je stabilno natanko tedaj, ko je $|r(A)| < 1$.
 (2) $\{A^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ je omejeno natanko tedaj, ko je $|r(A)| \leq 1$ in so vse lastne vrednosti
 (3) $\{A^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ je periodično s periodo p natanko tedaj, ko je omejeno in je $\sigma(A) \subseteq \Gamma_p$.
 (4) d)

Dokaz. DOKAZ TRDITVE 3.5. □

Zgled 3.6.

$$(77) \quad T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, T_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, T_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, T_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

◇

4. PRIMER UPORABE

SLOVAR STROKOVNIH IZRAZOV

LITERATURA

- [1] J. I. Agbinya, *Applied Data Analytics – Principles and Applications*, River Publishers, Denmark, 2020.
- [2] A. Bátkai, M. Kramar Fijavž in A. Rhandi, *Positive Operator Semigroups From Finite To Infinite Dimensions*, Birkhäuser/Springer, 2017.
- [3] C. Meyer, *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*, SIAM, 2000.