



LVIII CONGRESO NACIONAL AMVEC

Alguascalientes
2026



MEMORIAS

21-24
JULIO



asociación
mexicana de
veterinarios
especialistas en
cerdos, a.c.



Vivero-Carranza L¹, Rivera-Benítez J.F.*¹, De La Luz-Armendáriz J.², Galindo-Barboza A.J.³

¹Laboratorio de Virología, Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad, INIFAP. ²Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM., ³Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, FMVZ, UNAM.

* rivera.benitez@inifap.gob.mx

Introducción

El virus de la diarrea epidémica porcina (vDEP) fue detectado en la población porcina mexicana a mediados del año 2013, dando paso a un largo periodo de brotes y posteriormente a un estado de endemismo de la infección. Se han caracterizado los principales genotipos circulantes en la población nacional [1,2]. En la actualidad, continúan reportes de brotes en zonas altamente productoras, uno de los factores asociados puede ser la poca inmunidad de la pira susceptible. El objetivo del estudio fue analizar la prevalencia de anticuerpos (IgG) contra una fracción altamente inmunogénica de la proteína S del virus de la diarrea epidémica porcina genotipo 2.

Materiales y métodos

En Jalisco, 99 granjas comerciales participaron en el estudio durante 2022-2023. Un total de 2,127 muestras de suero fueron tomadas de cerdos sin signos clínicos. Por granja se obtuvieron en promedio 40 muestras, distribuidas por etapa productiva; cerdos en lactancia, destete, crecimiento, desarrollo, finalización, hembras gestantes y de reemplazo, esporádicamente se obtuvieron muestras de sementales. Las muestras fueron analizadas de manera individual en un ensayo inmunoenzimático (ELISA), usando un fragmento altamente inmunogénico de la proteína S, obtenida previamente de forma recombinante. El ELISA fue desarrollado en INIFAP y validado previamente con muestras de cerdos infectados experimentalmente. El valor de la densidad óptica obtenidos a 450 nm fue empleado para calcular el valor S/P. Se consideró un suero positivo cuando el valor S/P fue mayor a 20. El mapa de distribución espacial fue elaborado con QGIS.

Resultados y discusión

La frecuencia serológica absoluta y relativa en cada etapa productiva se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 7. Frecuencia absoluta y relativa de anticuerpos contra la proteína S del vDEP en cerdos sin signos clínicos durante el estudio.

Etapas	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Sementales	3/4	75%
Remplazos	98/373	26.3%
Gestación	195/462	42.2%
Destete	9/435	2.1%
Crecimiento	8/437	1.8%
Finalización	40/416	9.6%

La frecuencia espacial por granja evaluada (n=99) se presenta en la figura 1.




Figura 1. Frecuencia espacial por granja evaluada, se presenta en color rojo las granjas con muestras positivas a anticuerpos contra la proteína S del vDEP (83/99).

Se identificaron valores superiores al 40% en población de cerdos reproductores, lo que da indicios de la exposición previa. En el caso de los cerdos de la línea de producción se observó un incremento en la presentación, de acuerdo a las etapas evaluadas (2.1-9.6%), lo que podría estar relacionada con la presencia del virus en estas etapas. Los resultados obtenidos mediante la prueba de ELISA reflejan el estado endémico del vDEP en las granjas evaluadas, arrojando resultados positivos en 83 de las 99 granjas evaluadas. La prueba de ELISA ha demostrado una correlación de 0.95 comparativamente con la prueba de seroneutralización, por lo que nos permite identificar el grado de protección de la pira frente a desafíos de campo [3].

Conclusiones

Se identificó seropositividad superior al 40% en población de cerdos reproductores, a nivel de granja se observó una frecuencia superior al 80%. La DEP sigue siendo una problemática constante en los sistemas de producción.

Referencias

- Lara-Romero et al., Virus Genes. 2018 Apr;54(2):215-224. doi: 10.1007/s11262-017-1528-x. Epub 2017 Dec 14.
- Rivera-Benítez et al., Viruses. 2024 Feb 18;16(2):309. doi: 10.3390/v16020309.
- Ma G, et al., Transbound Emerg Dis. 2025 Dec 28;2025:6185969. doi: 10.1155/tbed/6185969

Palabras clave

vDEP, Endémico, seroprevalencia

Agradecimientos: Proyecto FONSEC SAGARPA-CONACYT-292826.



CONGRESO NACIONAL
LIII AMVEC
Aguas Calientes 2026

21-24
JULIO
2026



**BIENESTAR ANIMAL,
SOSTENIBILIDAD
E IMPACTO
SOCIO-AMBIENTAL**