MANUAL PRÁTICO

Tutorial Pet

Sozinho em Casa

Um passo por dia para o seu cachorro ficar tranquilo quando você sai



PASSO A PASSO 14 dias

Protocolo | Checklists | Diário | Diploma



Tutorial Pet

PARTE 1

O Manual

Protocolo de 14 dias, passo a passo.

Antes de começar


Leia antes de começar

Este material é educativo e não substitui a avaliação de um médico veterinário. Comportamentos como urinar fora do lugar, destruição e vocalização excessiva podem ter causa clínica — dor, problema neurológico, infecção urinária, perda auditiva ou visual.

Antes de aplicar qualquer protocolo comportamental, leve seu pet a uma consulta e descarte causa médica. Um pet com dor não responde a treino, e insistir nele só aumenta o sofrimento.

Casos moderados a graves podem exigir acompanhamento de veterinário comportamentalista e, em alguns deles, medicação associada ao trabalho de comportamento.







Como usar este manual

- Siga **um dia por vez**. O ritmo é do seu cachorro, não do calendário.
- Marque o quadrinho de cada dia. Dia ruim? Veja a regra de regressão (capítulo 3).
- Use o **app Sozinho em Casa** para o diário, o gerador de rotina pré-saída e o diploma da dupla.



Tutorial Pet

1


Diagnóstico

Antes de tratar, descubra o que realmente acontece.

1 • Diagnóstico

Grave 45 minutos em dois dias diferentes (celular enquadrando a porta) e responda:






1. **Quando o comportamento costuma começar?**
   5 a 30 min após você sair · A qualquer momento, inclusive com você em casa · Junto de um barulho ou evento específico
2. **Onde ele costuma destruir (se destrói)?**
   Portas, janelas, rotas de saída · Objetos variados, sapatos, móveis · Cantos, embaixo de móveis, tentando cavar
3. **Qual a postura dele durante o episódio?**
   Inquieta, ofegante, andando em círculos · Relaxada entre uma atividade e outra · Encolhida, tremendo, escondida
4. **Como é a vocalização?**
   Contínua, no mesmo tom, sem alvo · Intercalada, com pausas longas · Em resposta a um estímulo
5. **E o xixi ou fezes fora do lugar?**
   Comum, mesmo em pet já treinado · Raro se a rotina é adequada · Pode ocorrer no pico do medo

6. **Como ele reage quando você volta?**
   Saudação exagerada e prolongada · Saudação normal · Demora a sair do esconderijo





Como ler o resultado.

O sinal mais confiável de melhora não é o silêncio total. É o **atraso no início**: se a vocalização começava aos 4 minutos e agora começa aos 18, o protocolo está funcionando, mesmo que ela ainda aconteça. O segundo sinal é o **minuto em que ele deita**. Um pet que deita aos 25 minutos está se recuperando sozinho — que é exatamente o que se quer ensinar.






2

Seu protocolo de 14 dias

Seis etapas, uma meta curta por dia.

2 · Seu protocolo de 14 dias




ETAPA

Filmar e mapear

DIA **1**

Meta do dia: 1 gravação de 45 min









Posicione o celular para enquadrar a porta de saída e a área onde o pet costuma ficar. Grave 45 minutos. Saia de casa normalmente, sem despedida especial. Antes de tudo começar, tire a foto do dia 1 para comparar no dia 14 (guarde e esqueça).

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário

DIA
2

Meta do dia: 2ª gravação de 45 min







Repita a gravação de 45 minutos em um dia diferente, para não tirar conclusão de um dia atípico. Preencha a tabela de diagnóstico (aba Diagnóstico) e liste, no Diário, os sinais que você emite antes de sair — gatilhos comuns: pegar as chaves, calçar sapato, pegar a bolsa, escovar os dentes em horário fixo, desligar a TV, colocar perfume, fechar janelas.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário



ETAPA

Desarmar os gatilhos

DIA **3**

Meta do dia: 15 repetições ao longo do dia








Execute os gatilhos sem sair de casa. Pegue a chave e sente no sofá. Calce o sapato e vá lavar louça. Pegue a bolsa e assista televisão. Não olhe para o pet, não fale com ele, não recompense. Distribua as 15 repetições ao longo do dia — não faça tudo de uma vez.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário

DIA
4

Meta do dia: 15 repetições ao longo do dia





Mesma coisa do dia 3: repita os gatilhos sem sair, sem olhar, sem falar, sem recompensar.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário

DIA
5

Meta do dia: 15 repetições ao longo do dia





Último dia desta etapa. Continue distribuindo as repetições ao longo do dia inteiro.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário



ETAPA

Gastar antes de sair

DIA **6**

Meta do dia: 40 min de atividade









Estabeleça a rotina que vai valer do dia 8 em diante: caminhada, seguida de trabalho de faro (espalhe a ração pelo chão, esconda petiscos em caixas, use tapete olfativo), seguida de descanso. A ordem importa: a saída acontece quando o pet já está descansando depois do gasto, nunca com ele agitado.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário

DIA
7

Meta do dia: 40 min de atividade





Repita a rotina de gasto do dia 6: caminhada, trabalho de faro, descanso.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário



ETAPA

A primeira saída real

DIA **8**

Meta do dia: 8 repetições de 5 segundos







1) Faça a rotina de gasto do dia 6. 2) Ofereça o brinquedo recheado, que só aparece quando você sai. 3) Saia sem despedida, feche a porta. 4) Conte 5 segundos e volte. 5) Entre em silêncio, ignore o pet por dois minutos, depois cumprimente com calma. Repita 8 vezes.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário

DIA
9


Meta do dia: 8 repetições de 20 segundos





Mesma sequência do dia 8, agora com 20 segundos de ausência, mantendo as 8 repetições.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário



ETAPA

Esticar em degraus

DIA **10**

Meta do dia: 6 repetições: 30s·45s·1min·30s·1min·30s






Progressão do dia: 30s, 45s, 1min, 30s, 1min 30s, 2min. Repare que o quarto exercício volta para 30 segundos — é intencional, evita que a sequência vire uma escalada previsível.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário

DIA
11

Meta do dia: 6 repetições: 30s·45s·1min·30s·1min·30s → 2min





Repita a mesma progressão do dia 10.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário




ETAPA

Atravessar a janela

DIA 12

Meta do dia: 4 repetições: 3min · 5min · 3min · 8min






Progressão do dia 12: 3 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 8 minutos.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário

DIA
13

Meta do dia: 4 repetições: 5min · 10min · 5min · 12min






Progressão do dia 13: 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 12 minutos.


☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário


DIA
14

Meta do dia: 4 repetições: 8min · 15min · 10min · 20min









Progressão final: 8 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Ao final, grave novamente 45 minutos e compare com o vídeo do dia 1 — é hora do Relatório final e do Diploma da Dupla.

☐ Feito hoje ☐ Pet tranquilo ☐ Anotei no diário



Tutorial Pet

3

Se der errado


Dia ruim faz parte. Veja como ajustar sem perder o progresso.


3 • Se der errado

A regra de regressão — vai ter dia ruim, isso não é falha do protocolo, é como o processo funciona.


- **Se o pet entrar em pânico num exercício:** encerre a sessão do dia, não repita mais nenhuma vez, e volte ao tempo do dia anterior na próxima sessão. Permaneça nele por dois dias antes de tentar avançar de novo. - **Se acontecer duas vezes seguidas:** volte dois degraus e permaneça três dias. Um protocolo que anda devagar chega. Um protocolo forçado recomeça do zero.

Depois de um dia ruim, vocês têm permissão — e instrução — pra tirar o dia seguinte inteiro de folga do protocolo. Nada de exercício, nada de cronômetro. Só vocês dois fazendo o que ele mais gosta.





Os 5 erros mais comuns



Despedida emocional. Abraçar, falar com voz aguda e prometer que volta logo eleva a excitação bem no momento em que ela precisa cair.




Chegada eufórica. Confirma que a sua ausência era mesmo um evento enorme. Entre em silêncio e cumprimente dois minutos depois.



Punir o estrago. Ele não conecta a bronca ao ato antigo. Só aprende a temer a sua volta.



Pular etapas porque "está indo bem". A causa número um de recaída.



Deixar TV ou rádio ligados achando que resolve. Pode ajudar como ruído de fundo, mas não trata a causa.





Tutorial Pet

4

Quando procurar um profissional


Sinais de que é hora de pedir ajuda.


4 • Quando procurar um profissional

Procure um veterinário (de preferência comportamentalista) se:

- O pet se machuca tentando escapar — patas sangrando, dentes quebrados, ferimento no focinho
- Vômito, diarreia ou salivação intensa toda vez que você sai
- Automutilação: lamber até abrir ferida, morder as próprias patas
- Nenhuma melhora perceptível após duas semanas completas de protocolo
- O quadro apareceu de repente num pet que ficava bem sozinho — sugere causa clínica ou evento traumático
- Há agressividade envolvida em qualquer momento do processo









Tutorial Pet

PARTE 2

Fundamentação

A ciência por trás do manual, para quem quer entender e aprofundar.

Como ler esta parte

Esta é a parte para quem quer **entender o porquê**. Os números entre colchetes, como [1] ou [3], remetem à lista de **Referências** no final. Onde a evidência é pequena ou contraditória, dizemos isso com clareza.

Este material é educativo e **não substitui a avaliação de um médico veterinário**. Não indicamos medicamentos, doses ou produtos.

Capítulos

1. O que é ansiedade de separação
2. Por que acontece
3. Sinais e como observar
4. Por que o protocolo funciona
5. Exercício, brinquedos e rotina
6. O que evitar
7. Causas médicas e quando pedir ajuda
8. Prevenção: filhotes e novos lares
9. Perguntas frequentes



Tutorial Pet

A

O que é ansiedade de separação

Não é birra, não é vingança: é sofrimento.

A · O que é ansiedade de separação

Quando você sai e o seu cachorro late, chora, destrói a porta ou faz xixi fora do lugar, é fácil interpretar como teimosia, ciúme ou "vingança". A literatura veterinária descreve outra coisa: um quadro de **sofrimento emocional** que aparece quando o cachorro fica longe da pessoa a quem é apegado. Na prática clínica, o termo mais usado é **ansiedade de separação** (ou, em inglês, *separation-related problems*) [1][5].

Os autores brasileiros de revisão descrevem a síndrome como um distúrbio comportamental que se manifesta quando o animal é separado da sua figura de apego, e a classificam em **leve, moderada e grave**. A causa exata ainda não é totalmente conhecida, e o consenso é que o quadro é **multifatorial** — vários fatores somados, não um único culpado [5].

Quão comum é?

Uma revisão publicada em 2014 estimou que cerca de **20% da população canina** tem algum grau do problema, e destacou que ele provavelmente é **subdiagnosticado**: muitas vezes só se descobre pelos sinais indiretos, como estrago em casa ou reclamação de vizinhos [1]. Já um levantamento recente com tutores (n = 847) identificou cerca de 8% de cachorros com problemas de separação [3]. A diferença entre os números mostra uma coisa importante: **depende de como se mede e de quem responde**. Use esses valores como ordem de grandeza, não como verdade exata.

EM RESUMO

Ansiedade de separação é uma resposta de sofrimento à ausência da pessoa de apego. Não é falta de educação do cachorro nem "maldade". Entender isso muda a forma de agir: com paciência e método, e não com bronca.






Ansiedade, tédio ou medo?

Nem todo cachorro que destrói algo sozinho tem ansiedade de separação. O **tédio** costuma aparecer em qualquer momento, inclusive com você em casa; o **medo** aparece ligado a um barulho ou evento específico (trovão, fogos, obra). Na ansiedade de separação, os sinais se concentram **logo depois da saída** da pessoa e o pico costuma ocorrer nos primeiros minutos [1]. É por isso que o diagnóstico do Capítulo 1 do manual usa um critério simples: *quando* o comportamento começa.

As três condições podem coexistir. Por isso o manual começa filmando: observar o que acontece de verdade vale mais do que adivinhar.









Tutorial Pet

B

Por que acontece

Vários fatores, nenhum culpado único.

B • Por que acontece

Os estudos apontam um conjunto de fatores que **aumentam a chance** do problema. Nenhum deles, sozinho, explica ou garante nada. É como o histórico de uma pessoa ansiosa: vários ingredientes se somam.

O que a literatura associa ao problema

- **Origem e primeiros meses de vida:** separação da mãe e da ninhada antes dos 60 dias, vida em abrigo ou na rua e adoção tardia aparecem entre os fatores citados [1][5].
- **Pouca exposição ao mundo:** filhotes com pouco contato com outros ambientes e pessoas entre os 5 e 10 meses foram mais afetados em estudos revisados [1].
- **Mudanças:** nova casa, mudança de rotina, perda de alguém da família [1][5].
- **Eventos traumáticos:** um susto forte (trovoada, incêndio, ficar preso) pode disparar ou piorar o quadro [1][5].
- **Hipervinculação:** cachorro que acompanha o tutor o tempo todo e quase nunca fica sozinho tende a ter mais dificuldade quando a rotina muda [5].
- **Falta de enriquecimento:** pouca estimulação mental e física no dia a dia [5].

ATENÇÃO

Os próprios autores avisam que parte dessas evidências é **contraditória**: um fator aparece em um estudo e some em outro [1]. Por isso, o foco do manual não está em achar o culpado no passado, e sim em **ensinar o cachorro a ficar tranquilo daqui para frente**.

O que um estudo recente encontrou


Em 2023, pesquisadores alemães aplicaram um questionário a centenas de tutores (847 respostas utilizáveis) e compararam cachorros com e sem problemas de separação [3]. O dado que mais se destacou foi o **tempo que o cachorro leva para relaxar depois que a pessoa sai**: em média, cerca de **8 minutos** nos cachorros com problema, contra cerca de **4 minutos** nos demais.


Esse achado é útil na prática, porque é algo que você consegue observar e medir em casa com um simples vídeo. Foi inspirado nele que o manual usa o **atraso do início** e o **minuto em que o cachorro deita** como sinais de melhora.

O mesmo estudo observou, ainda, que cachorros com problema tendiam a ser descritos como menos calmos e mais excitáveis, e que tinham mais frequentemente passado por abrigo. Mas há limites sérios: os dados vêm de **relato dos tutores** (recrutados em grupos de redes sociais), o experimento com cortisol usou apenas **6 cachorros**, e muitos efeitos foram pequenos ou não resistiram à correção estatística [3]. É um indício, não uma sentença.

NA PRÁTICA

Se o seu cachorro veio de abrigo, foi separado cedo da mãe ou passou por mudanças, isso **não é uma condenação**. O que a ciência mostra de mais animador é que o comportamento pode ser aprendido de novo, com treino gradual (veja o capítulo D).





Tutorial Pet

C

Sinais e como observar

O que olhar, o que filmar, o que anotar.

C • Sinais e como observar

A revisão brasileira de 2023 resume os sinais em dois grupos: os **principais** e os **associados** [5]. Conhecer a lista ajuda a reconhecer o problema cedo, antes de ele virar hábito.

Antes da saída

- seguir você de cômodo em cômodo;
- inquietação, ofegar, andar de um lado para o outro ao perceber os "gatilhos" (chaves, sapato, bolsa);
- buscar muito contato, ficar "grudado".

Durante a ausência

- latir, chorar, uivar;
- destruir portas, janelas, objetos perto da saída;
- xixi ou cocô fora do lugar, mesmo em cachorro treinado;
- andar em círculos, salivar, tremer, ofegar;
- tentar fugir. Em casos graves pode haver ferimentos, como patas feridas ou dentes quebrados [1][5].

Na volta

- euforia exagerada e prolongada ao reencontrar você;
- em alguns cachorros, sinais de cansaço ou abatimento depois do episódio.

A filmagem é a melhor ferramenta

A literatura trata a **filmagem** como a forma mais confiável de avaliar o quadro: ela mostra quando o comportamento começa, quanto dura e se há sinais que você nunca veria de dentro de casa [5]. Também permite comparar o antes e o depois, o que é essencial para saber se o protocolo está funcionando [1].


COMO FILMAR

Enquadre a porta de saída e o local onde o cachorro costuma ficar. Saia como sempre sai. Anote: (1) em que minuto o comportamento começou; (2) quanto durou; (3) em que minuto o cachorro deitou ou se acalmou. Repita em outro dia.

Leve, moderado ou grave?

Em geral, os veterinários graduam o quadro pela **frequência** e pela **intensidade** dos sinais. Uma revisão propõe pontuar cada comportamento conforme apareça poucas vezes por semana (leve), algumas vezes (moderado) ou muitas vezes (grave) [5]. Você não precisa fazer essa conta sozinho: o que importa é saber que **quanto mais frequente e intenso, maior a necessidade de ajuda profissional**. O capítulo G explica quando procurar.







Tutorial Pet

D

Por que o protocolo funciona

Dessensibilização, contracondicionamento e degraus pequenos.

D · Por que o protocolo funciona

O protocolo de 14 dias é baseado em dois princípios descritos na literatura veterinária comportamental: a **dessensibilização sistemática** e o **contracondicionamento** [1][2][4].

Dessensibilização sistemática

A ideia é simples: **expor o cachorro à ausência em doses tão pequenas que ele consiga suportar**, e só então aumentar. Começa-se com saídas curtíssimas (segundos), volta-se antes de o cachorro ficar ansioso e aumenta-se o tempo aos poucos. Se os sinais pioram, **recua-se um degrau** [1]. É exatamente a lógica da progressão dos dias 8 a 14 do manual e da regra de regressão.

Contracondicionamento

Consiste em **associar a sua saída a algo bom**, por exemplo oferecer um brinquedo recheado ou comida pouco antes de sair, para mudar a emoção do cachorro em relação ao momento da partida [1][4]. O manual usa isso na rotina de "gasto antes de sair".

O que dizem os estudos

Em um estudo de 2010 da Universidade de Waikato (Nova Zelândia), **oito cachorros** com problemas de separação foram acompanhados com dessensibilização sistemática combinada a contracondicionamento. Houve **redução significativa** da frequência e da gravidade dos comportamentos em relação à linha de base, e seis cachorros, reavaliados três meses depois, quase não apresentavam mais o problema [2]. Os autores concluíram que a **dessensibilização** parece ser o componente decisivo.

HONESTIDADE SOBRE A EVIDÊNCIA

Esse estudo é **pequeno** (oito cachorros) e não substitui acompanhamento profissional. Mostra uma direção promissora, não uma garantia. O resultado de cada cachorro depende do histórico, da gravidade e da regularidade do treino. Em casos moderados a graves, a orientação é buscar um veterinário comportamentalista [1][4][5].


Por que "devagar" é a regra

Forçar o cachorro a suportar uma ausência longa antes de ele estar pronto é o oposto do que a técnica pede. A AVSAB, sociedade de veterinários especializados em comportamento, recomenda tratar medo e ansiedade com **exposição gradual**, mantendo o cachorro seguro, e evitar **exposição forçada** (*flooding*) [4]. Por isso o manual manda **voltar um degrau** em dia ruim e até **tirar um dia de folga**.



Rotina previsível ajuda

A revisão de 2014 recomenda ausências **regulares, de curta a média duração** e evitar longas ausências no começo do tratamento; recomenda também reduzir a dependência, como deixar de ser seguido pela casa e **diminuir a euforia nas despedidas e chegadas** [1]. É por isso que o manual pede **saídas e chegadas calmas**.





Tutorial Pet

E

Exercício, brinquedos e rotina

Ajudam, mas não substituem o treino.

E • Exercício, brinquedos e rotina

Um cachorro cansado, estimulado e com rotina previsível costuma ter mais facilidade para relaxar. A literatura trata esses itens como **apoio** ao tratamento, não como solução isolada.

Passeio antes de sair

Passear e gastar energia antes da saída é uma recomendação comum. Mas a revisão de 2014 observou que, sozinho, isso **não preveniu** o problema [1]. Entra no manual como parte da preparação (dias 6 e 7), não como substituto da dessensibilização.

Brinquedos recheados e enriquecimento

Em um levantamento com tutores, os brinquedos recheados com comida foram o conselho mais seguido [1]. A revisão brasileira descreve cinco tipos de enriquecimento: **físico, sensorial, cognitivo, social e alimentar** [5]. Um exemplo cognitivo é o brinquedo que exige raciocínio para liberar a comida; um exemplo alimentar é variar a forma de servir a refeição.

CUIDADO

Um estudo de 2023 encontrou **mais** problemas de separação entre cachorros que recebiam brinquedo ou comida na saída. Os autores alertam que isso é correlação, não prova de causa: tutores de cachorros que já sofrem podem estar tentando compensar [3]. Por isso, ofereça o brinquedo como **parte do treino gradual** e não como forma de "distrair" o cachorro em ausências longas.

Rotina previsível

Horários regulares para refeição, passeio e saída ajudam o cachorro a prever o que vem. Em um estudo, os cachorros com problema tinham separações **menos frequentes e mais curtas** no dia a dia [3] (correlação, não prova de causa). Se possível, inclua **pequenas ausências diárias** mesmo nos dias em que você está em casa.

Ambiente seguro

Escolha um espaço onde o cachorro não possa se machucar. O uso de **caixa de transporte** não é uma solução: a revisão de 2014 relata que ela **não reduziu** os sinais e pode aumentar o estresse e causar ferimentos em tentativas de fuga [1]. Já o **confinamento em ambientes muito restritos** foi associado a mais problemas em um estudo recente [3].

- ruído de fundo (rádio, TV) pode ajudar como conforto, mas **não trata a causa** [1];
- difusor de feromônio apaziguador é citado como apoio por alguns estudos, mas **sem grupo controle** isolado, então a evidência é limitada [1];
- não existe produto que substitua o treino gradual.



Tutorial Pet

F

O que evitar

Punição, despedida dramática e “truques” que pioram.

F • O que evitar

Punição

Dar bronca, castigar ou “mostrar o estrago” ao chegar em casa **não funciona**. O cachorro não liga a bronca ao que fez horas antes; aprende apenas a temer a sua volta, o que pode aumentar a ansiedade [1][5]. A AVSAB afirma não existir evidência de que métodos aversivos sejam necessários e relata que eles estão associados a sinais de estresse, a mais cortisol e a problemas de comportamento a longo prazo (agressividade, ansiedade), embora os estudos não provem causa e efeito [4].

Despedidas e chegadas emocionais

Abraçar, falar com voz aguda e prometer que volta logo eleva a excitação justo quando ela precisa cair. O manual orienta saídas **neutras** e chegadas **calmas** [1]. Atenção: um estudo observou que os cachorros com problema tinham, em média, **menos** saudações; ele não prova causa, e os autores sugerem saudações **calmas** [3]. A regra prática é: **afeto, sim; euforia, não**.

Pular etapas porque “está indo bem”

O erro mais comum de quem desanima ou se anima demais. O progresso é medido em degraus; se o cachorro reagir, volta-se um degrau, sem culpa.

Arranjar outro cachorro


Muita gente pensa que um companheiro resolve. A revisão de 2014 aponta que ter outro cachorro **não previne nem resolve** o problema, porque o apego do cachorro é à **pessoa**, e não à companhia de qualquer animal [1].

Tratar sozinho casos graves

Se o cachorro se machuca, tem sinais físicos intensos ou o quadro piora, o caminho é **profissional** (próximo capítulo). A AVSAB também recomenda escolher profissionais que usem métodos humanitários, e desaconselha ferramentas que causam dor ou intimidação e teorias ultrapassadas como “dominância” [4].

EM RESUMO

Evite: punição, despedida dramática, pular etapas, ausências longas antes da hora, caixa como solução e “um cachorro para fazer companhia”. Prefira: método gradual, rotina previsível e ajuda profissional quando o quadro for sério.





Tutorial Pet

G

Causas médicas e quando pedir ajuda

Primeiro descartar saúde. Depois, quando for o caso, tratar com profissional.

G • Causas médicas e quando pedir ajuda

Comportamentos como urinar fora do lugar, destruir e vocalizar em excesso **também podem ter causa clínica**: dor, infecções urinárias, doenças neurológicas e endócrinas, perda de audição ou visão, alterações cognitivas em cachorros idosos. A literatura recomenda **excluir causas médicas** antes de tratar como comportamento [5]. A AVSAB recomenda o mesmo [4]. Por isso o manual começa com o aviso: **leve seu cachorro ao veterinário antes de iniciar**.

Quando procurar um veterinário comportamentalista

- o cachorro se machuca tentando escapar (patas sangrando, dentes quebrados, ferimento no focinho);
- há vômito, diarreia ou salivação intensa toda vez que você sai;
- há automutilação (lamber até abrir ferida, morder as próprias patas);
- não houve nenhuma melhora perceptível após duas semanas completas de protocolo;
- o quadro apareceu de repente em um cachorro que ficava bem sozinho;
- há qualquer agressividade durante o processo.

Medicação: o que dizem as revisões

Para casos moderados a graves, as revisões descrevem o uso de **medicação prescrita por veterinário**, sempre **junto** do trabalho de comportamento e com retirada gradual quando indicada [1][5]. A conclusão da revisão internacional é que o remédio **não resolve o problema isoladamente**; o treino continua sendo a base [1]. Há

efeitos adversos possíveis e a escolha depende do exame clínico, por isso **nunca** se deve medicar o cachorro por conta própria nem seguir recomendação de internet.

IMPORTANTE

Este material é educativo e **não substitui** a avaliação de um médico veterinário. Não indicamos medicamentos, doses ou produtos. Quem decide se há necessidade de medicação, e qual, é o veterinário.

Como escolher um profissional

- procure veterinário com formação em **comportamento** ou adestrador que use **reforço positivo**;
- converse antes e peça para conhecer o método;
- desconfie de quem promete “resolver em um dia” ou usa coleiras de choque, enforcadores e castigos [4].





Tutorial Pet

H

Prevenção: filhotes e novos lares

O que dá para fazer antes de o problema existir.

H • Prevenção: filhotes e novos lares

Se você tem um filhote ou vai adotar, algumas medidas descritas na literatura ajudam a **reduzir o risco** [1][5]. Nenhuma garante nada, mas todas são simples e baratas.

- **Treine ausências curtas desde cedo**, ainda que você esteja em casa (um cômodo de distância, depois a porta fechada por alguns segundos);
- **Exponha o filhote a pessoas, lugares e sons variados** durante a fase de socialização, sempre respeitando o calendário de vacinas e as orientações do veterinário;
- **Alterne** momentos de colo e de independência: o cachorro precisa aprender a descansar sozinho;
- **Evite despedidas e chegadas dramáticas**, desde o primeiro dia;
- **Mantenha uma rotina previsível**, com horários regulares de comida, passeio e descanso;
- **Nunca puna** choro ou estrago;
- **Ofereça enriquecimento**: brinquedos recheados e atividades de faro;
- **Introduza mudanças aos poucos**, como mudança de rotina ou volta ao trabalho.


Ao adotar

A revisão de 2014 recomenda, para quem vai adotar, **preferir filhotes que ficaram com a mãe e a ninhada pelo menos até 60 dias** [1]. A revisão brasileira reforça a importância da **adoção responsável** e do

desmame gradual [5]. Se adotar um cachorro adulto de abrigo, planeje as primeiras semanas em casa, com ausências curtas e progressivas.

SE A ROTINA VAI MUDAR

A revisão brasileira cita a **hipervinculação** (cachorro que quase nunca fica sozinho) como fator que ganhou destaque depois da pandemia [5]. Se a sua rotina vai mudar (volta ao trabalho, mudança de casa), comece **agora** a treinar ausências curtas.





Tutorial Pet

1

Perguntas frequentes

As dúvidas que mais aparecem.

I • Perguntas frequentes

Em quanto tempo vejo resultado?

Depende de cada cachorro. O protocolo de 14 dias é um **ponto de partida**: a revisão brasileira lembra que o tratamento completo pode levar **vários meses** em alguns casos [5]. O sinal mais confiável de melhora é o **atraso no início** do comportamento e o **minuto em que o cachorro deita**.

Meu cachorro já é adulto. Ainda dá tempo?

A revisão brasileira descreve que o quadro não apresenta diferença por idade, sexo ou raça [5]. Em cachorros idosos, vale investigar também **causas médicas** e alterações cognitivas com o veterinário.

Posso deixar a TV ligada?

Pode ajudar como ruído de fundo, mas não trata a causa [1].

E se eu precisar sair por muitas horas durante o protocolo?

Em casos moderados a graves, a revisão brasileira cita que o cachorro **não deveria ficar sozinho** até a dessensibilização estar concluída [5]; a alternativa é contar com alguém de confiança para ficar com o cachorro ou levá-lo junto durante o tratamento [1][5]. Se isso for impossível, converse com o veterinário sobre um plano.

Preciso filmar de novo?

Sim, é recomendado: filmar de novo depois do protocolo mostra o que mudou e ajuda a decidir os próximos passos [1][5].

Remédio ou produto natural resolve?

Nenhum produto substitui o treino. As revisões citam diferentes recursos de apoio, mas com evidência variável; qualquer uso deve ser orientado pelo veterinário [1][5].

Isso é um tratamento?

Este manual é **educativo**. O tratamento de um quadro clínico de ansiedade é feito por um veterinário. Use o material para **entender, observar e organizar** a rotina com o cachorro, e leve suas anotações e vídeos na consulta.



Glossário

Ansiedade de separação: resposta de sofrimento do cachorro quando é separado da pessoa de apego.

Linha de base: como o cachorro se comporta antes do treino; serve de comparação.

Dessensibilização sistemática: expor o cachorro à ausência em doses muito pequenas e crescentes.

Contracondicionamento: associar a saída da pessoa a algo agradável.

Gatilho: sinal que o cachorro aprende a associar à saída (chaves, sapato, bolsa).

Exposição forçada (flooding): expor o cachorro ao que ele teme sem gradação; não recomendada.

Enriquecimento ambiental: atividades e objetos que estimulam mente e corpo do cachorro.

Reforço positivo: recompensar o comportamento desejado.

Correlação x causa: duas coisas aparecerem juntas não prova que uma causa a outra.

Referências

Fontes usadas na elaboração desta parte. Os textos são resumos e interpretações próprias; consulte os originais para o detalhe.

1. Sargisson, R. J. (2014). Canine separation anxiety: strategies for treatment and management. Veterinary Medicine: Research and Reports, 5, 137–144. https://www.dovepress.com/canine-separation-anxiety-strategies-for-treatment-and-management-peer-reviewed-fulltext-article-VMRR
2. Butler, R., Sargisson, R. J. & Elliffe, D. (2010). The efficacy of systematic desensitization for treating the separation-related problem behaviour of domestic dogs. Applied Animal Behaviour Science, 129(2–4), 136–145. https://researchcommons.waikato.ac.nz/items/247f5ebd-5317-466c-a9e3-daeb196fc061/full
3. Silbermann, P. & Gansloßer, U. (2023). Factors influencing isolation behavior of dogs: a holder-based questionnaire and behavioral and saliva cortisol responses during separation. Animals, 13(23), 3735. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10705200
4. American Veterinary Society of Animal Behavior – AVSAB (2021). Position Statement on Humane Dog Training. https://about.illinoisstate.edu/vfdouga/files/2021/08/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf
5. Pereira, B. R. V. & Silva, T. F. (2023). Síndrome da ansiedade de separação em cães: revisão de literatura. Trabalho de conclusão de curso (Medicina Veterinária), UNIBRA, Recife/PE. https://grupounibra.com/repositorio/MVETI/2023/sindrome-da-ansiedade-de-separacao-em-caes-revisao-de-literatura.pdf

Fotos

Imagens do banco gratuito **Pexels**, usadas conforme a licença do site. Créditos por fotógrafo disponíveis no repositório do projeto.

Para aprofundar

- Converse com um veterinário comportamentalista para avaliação individual.
- Leia a declaração da AVSAB sobre treinamento humanitário [4].
- Leia a revisão de Sargisson (2014) [1], de acesso aberto.



Vocês dois chegaram lá.

Continue no app **Sozinho em Casa**: diário, rotina pré-saída e o diploma da dupla.
Próximo passo da dupla: o **Adestramento Básico Tutorial Pet** (senta, fica, vem, passeio sem puxar). Novidades, dicas e os próximos manuais em **tutorialpet.com.br**.

Créditos das fotos

Todas as fotos deste livro são reais e vêm do banco gratuito **Pexels** (pexels.com), usadas conforme a licença Pexels. Nossos agradecimentos aos fotógrafos:

Anastasia Ilina-Makarova @anastasia-ilina-makarova-140436704

Andres Ayrton @andres-ayrton

Ar kay @ar-kay-768552413

ArtHouse Studio @arthousestudio

Barnabas Davoti @barnabas-davoti-31615494

Bethany Ferr @bethany-ferr

Bo Ponomari @bopopics

Burst @burst

cottonbro studio @cottonbro

Damir K @damir

David Kanigan @david-kanigan-239927285

Davide Negro @davide-negro-2157018402

DCC Pets @dcc-pets-1225360955

Diseño Eli @diseno-eli-58496217

Diva Plavalaguna @diva-plavalaguna

Esra Afşar @esra-afsar-123882149

gabesdotphotos photographer @gabesphotos

German Suarez @german-suarez-2985952

Greta Hoffman @greta-hoffman

Helena Lopes @helenalopes

Hrushik Perumalla @hrushikperumalla

https://kaboompics.com/ @karola-g

Ivan Babydov @babydov

Iza Ponchie @iza-ponchie-800369

Jefferson Ferreira da Silva @jefferson-ferreira-da-silva-131641823

JESSICA TICOZZELLI @jersy

Josh Sorenson @joshsorenson

K @kelly

Kara @kara-14371795

KATRIN BOLOVTSOVA @ekaterina-bolovtsova

Kim Dubois @kim-dubois-609615119

Kindel Media @kindelmedia

Lesli Whitecotton @lesli-whitecotton-237271934

Lisa Fotios @fotios-photos

Liza Summer @liza-summer

Marcin Szmigiel @marcin-szmigiel-14638

MART PRODUCTION @mart-production

Mathias Reding @matreding

Meruyert Gonullu @meruyert-gonullu

Miguel González @mikegles

Mikhail Nilov @mikhail-nilov

Mizuno K @mizunokozuki

Monstera Production @gabby-k

Nastya Korenkova @nastya-korenkova-72937441

Nikola @nikola-4391808

Pavel Danilyuk @pavel-danilyuk

Peter Jochim @peterjochim-fotografie

Pragyan Bezbaruah @pragyanbezbo

qiana zhang @qiana-zhang-175967787

Rachel Claire @rachel-claire

RDNE Stock project @rdne

Ron Lach @ron-lach

Samson Katt @samson-katt

Sean Brannon @sean-brannon-762373037

Skyler Ewing @skyler-ewing-266953

Sudhir Sangwan @sudhirsangwan

susana MaRo @susana-maro-20195896

Tahir Xəlfəquliyev @tahir

Tanya Gorelova @tanya-gorelova-2199357

Tima Miroshnichenko @tima-miroshnichenko

Tony Began @tony-began-3126738

Viktoria B. @viktoriab

vilnis Izotovs @vilnisphoto

Vitaly Gariev @silverkblack

Vlada Karpovich @vlada-karpovich

William Prado @william-prado-1302103031

天 明 @2152880966