## $O\Pi$ «Политология», 2023-24

## Введение в ТВиМС

Дополнительные задачи (21 февраля)

А. А. Макаров, А. А. Тамбовцева

**Задача 1.** Функция плотности вероятности нормальной случайной величины с распределением  $N(a, \sigma^2)$  выглядит так:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

- (a) Докажите, что функция f(x) достигает максимума в точке x=a.
- (b) Покажите, что функция f(x) для N(0,1) является чётной. При каких значениях параметров a и  $\sigma$  функция f(x) тоже является чётной?
- (c) Докажите, что функция нормального распределения F(x) имеет точку перегиба в x=a.

**Напоминание:** Функция плотности вероятности f(x) является производной от F(x), то есть f(x) = F'(x).

**Задача 2.** <sup>1</sup> Нормально распределенная случайная величина X с математическим ожиданием  $\mu$  и стандартным отклонением  $\sigma$  удовлетворяет следующему условию:

$$P(|X - \mu| \le 2) = 0.6.$$

Найдите  $P(|X - \mu| > 3)$ .

 $<sup>^{1}</sup>$ Источник: Кочетков Е.С., Смерчинская С.О. Теория вероятностей в задачах и упражнениях. – М.: Форум, 2008.