Estudo	GRACE−Glicose Média	DP	Total	GRACE Média	DP	Total	Diferença Média na ASCROC	DM	[IC 95%]	Peso
de Mulder et al. (B) (2011)	550	0.82	0.60	550	0.81	0.60		0.01	[−0.06; 0.08]	13.2%
Correia et al. (2009)	148	0.82	0.74	148	0.81	0.78		0.01	[−0.16; 0.18]	2.2%
Schiele et al. (2006)	724	0.85	0.69	724	0.84	0.76		0.01	[−0.06; 0.08]	11.9%
Yang et al. (B) (2013)	233	0.73	0.43	233	0.72	0.47		0.01	[−0.07; 0.09]	9.9%
Timóteo et al. (2014)	2099	0.82	0.93	2099	0.80	0.93		0.02	[−0.04; 0.08]	21.0%
de Mulder et al. (A) (2011)	550	0.87	0.54	550	0.85	0.60		0.02	[−0.05; 0.09]	14.6%
Qin et al. (2021)	1098	0.80	1.01	1098	0.75	1.10		0.05	[−0.04; 0.14]	8.5%
Yang et al. (A) (2013)	583	0.71	0.49	583	0.65	0.55		0.06	[0.00; 0.12]	18.6%
Common effect model	**5985**			**5985**				**0.03**	**[0.00; 0.05]**	**100.0%**

Heterogeneity: I^2 = 0%, p = 0.95

Test for overall effect: z = 2.00 (p = 0.046)