

Study	GRACE–Glucose			GRACE			Weight	MD [95% CI]	
	Mean	SD	Total	Mean	SD	Total			
de Mulder et al. (B) (2011)	0.82	0.60	550	0.81	0.60	550	13.2%	0.01 [−0.06; 0.08]	
Correia et al. (2009)	0.82	0.74	148	0.81	0.78	148	2.2%	0.01 [−0.16; 0.18]	
Schiele et al. (2006)	0.85	0.69	724	0.84	0.76	724	11.9%	0.01 [−0.06; 0.08]	
Yang et al. (B) (2013)	0.73	0.43	233	0.72	0.47	233	9.9%	0.01 [−0.07; 0.09]	
Timóteo et al. (2014)	0.82	0.93	2099	0.80	0.93	2099	21.0%	0.02 [−0.04; 0.08]	
de Mulder et al. (A) (2011)	0.87	0.54	550	0.85	0.60	550	14.6%	0.02 [−0.05; 0.09]	
Qin et al. (2021)	0.80	1.01	1098	0.75	1.10	1098	8.5%	0.05 [−0.04; 0.14]	
Yang et al. (A) (2013)	0.71	0.49	583	0.65	0.55	583	18.6%	0.06 [ 0.00; 0.12]	
<b>Total (95% CI)</b>			<b>5985</b>			<b>5985</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.03 [ 0.00; 0.05]</b>	

Heterogeneity:  $\text{Tau}^2 = 0$ ;  $\text{Chi}^2 = 2.15$ ,  $\text{df} = 7$  ( $P = 0.95$ );  $I^2 = 0\%$

Test for overall effect:  $Z = 2.00$  ( $P = 0.046$ )

