

Study	GRACE–Glucose			GRACE			Weight	MD [95% CI]
	Mean	SD	Total	Mean	SD	Total		
de Mulder et al. (2011)	0.82	0.60	550	0.81	0.60	550	15.5%	0.01 [−0.06; 0.08]
Correia et al. (2009)	0.82	0.74	148	0.81	0.78	148	2.6%	0.01 [−0.16; 0.18]
Schiele et al. (2006)	0.85	0.69	724	0.84	0.76	724	13.9%	0.01 [−0.06; 0.08]
Yang et al. (DM) (2013)	0.73	0.43	233	0.72	0.47	233	11.6%	0.01 [−0.07; 0.09]
Timóteo et al. (2014)	0.82	0.93	2099	0.80	0.93	2099	24.6%	0.02 [−0.04; 0.08]
Qin et al. (2021)	0.80	1.01	1098	0.75	1.10	1098	10.0%	0.05 [−0.04; 0.14]
Yang et al. (non–DM) (2013)	0.71	0.49	583	0.65	0.55	583	21.8%	0.06 [0.00; 0.12]
Total (95% CI)			5435	5435			100.0%	0.03 [−0.00; 0.06]
Heterogeneity: Tau ² = 0; Chi ² = 2.11, df = 6 (P = 0.91); I ² = 0%								
Test for overall effect: Z = 1.92 (P = 0.055)								

