



数学物理方法（上）第十次作业参考答案

鲍雷栋^{*1}, 王思越^{†1}, and 禹凯耀^{‡1}¹ 北京大学物理学院

2025 年 5 月 8 日

题 1. 计算积分

$$\int_{-5}^1 8e^{t^2} \cos t \delta(t^2 - 2) dt. \quad (1)$$

解. 根据 δ 函数的性质有

$$\delta(t^2 - 2) = \frac{1}{2\sqrt{2}} [\delta(t + \sqrt{2}) + \delta(t - \sqrt{2})],$$

由于 $-5 < -\sqrt{2} < 1$ 而 $\sqrt{2} > 1$, 因此

$$\int_{-5}^1 8e^{t^2} \cos t \delta(t^2 - 2) dt = \frac{8e^{t^2} \cos t}{2\sqrt{2}} \Big|_{t=-\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}e^2 \cos \sqrt{2}. \quad \square$$

题 2. Dirac 梳是具有等间隔 T 的无穷多 δ 函数

$$\Delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT), \quad (2)$$

证明 Dirac 梳的 Fourier 变换也是 Dirac 梳.

证明. 根据 Fourier 变换的定义有

$$\mathcal{F}[\Delta_T(t)](\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-ikT\omega},$$

由于 $\Delta_T(t)$ 是以 T 为周期的函数, 于是有 Fourier 级数展开

$$\Delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_n e^{-i\frac{2k\pi}{T}t}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} dt e^{i\frac{2k\pi}{T}t} \Delta_T(t) = \frac{1}{T},$$

由此可以得到

$$\mathcal{F}[\Delta_T(t)](\omega) = \frac{2\pi}{T} \Delta_{\frac{2\pi}{T}}(\omega). \quad \square$$

^{*}2100011330@stu.pku.edu.cn[†]2100016344@stu.pku.edu.cn[‡]2301110114@stu.pku.edu.cn



题 3. 利用 Fourier 变换法求解 Laplace 方程的 Green 函数

$$\nabla^2 G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') = -\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \quad (3)$$

解. 根据 Fourier 变换的定义, 设

$$\tilde{G}(\mathbf{k}) = \int d^3x e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} G(\mathbf{x} - \mathbf{x}'),$$

利用 Fourier 变换的性质可以得到

$$\mathbf{k}^2 \tilde{G}(\mathbf{k}) = 1,$$

这个方程在广义函数意义下的解为

$$\tilde{G}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\mathbf{k}^2} + (2\pi)^3 c_0 \delta^{(3)}(\mathbf{k}) + (2\pi)^3 i\mathbf{c}_1 \cdot \nabla \delta^{(3)}(\mathbf{k}),$$

其中常数 $c_0 \in \mathbb{C}, \mathbf{c}_1 \in \mathbb{C}^3$, 作 Fourier 逆变换就可以得到

$$\begin{aligned} G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') &= \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \left[\frac{1}{\mathbf{k}^2} + (2\pi)^3 c_0 \delta^{(3)}(\mathbf{k}) + (2\pi)^3 i\mathbf{c}_1 \cdot \nabla \delta^{(3)}(\mathbf{k}) \right] \\ &= \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} + c_0 + \mathbf{c}_1 \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \end{aligned} \quad \square$$

注. 由于 Green 函数满足的方程是在广义函数的意义下成立的, 因此必须考虑广义函数意义下的解, 这也可以包含 delta 函数. 可以证明方程 $x^n f(x) = 0$ 在广义函数意义下的解是 $f(x) = \sum_{m=0}^{n-1} c_m \partial^m \delta(x)$, 证明见 Rudin 《泛函分析》定理 6.25.

题 4. 证明

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \frac{1}{x - i\epsilon} = \delta(x). \quad (4)$$

证明. 定义函数

$$\delta_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \frac{1}{x - i\epsilon} = \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2},$$

可以计算得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(x) dx = 1,$$

现在任取检验函数 $f(x)$, 不妨设 $f(x)$ 仅在 $[-T_0, T_0]$ 上非零, 于是对任意 $T > T_0$ 都有

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(x) f(x) dx - f(0) \right| &= \left| \int_{-T}^T \delta_\epsilon(x) f(x) dx - f(0) \right| \\ &\leq \left| \int_{-T}^T \delta_\epsilon(x) [f(x) - f(0)] dx \right| + \left| 1 - \int_{-T}^T \delta_\epsilon(x) dx \right| |f(0)|, \end{aligned}$$

任取 $\varepsilon_1 > 0$, 存在 $T_1 > T_0$ 使得

$$\left| 1 - \int_{-T_1}^{T_1} \delta_\epsilon(x) dx \right| |f(0)| < \frac{\varepsilon_1}{2},$$

根据 $f(x)$ 连续可微, 存在 M 使得 $|f(x) - f(0)| = |f'(\xi)||x| < M|x|$, 于是

$$\left| \int_{-T_1}^{T_1} \delta_\epsilon(x) [f(x) - f(0)] dx \right| < M \int_{-T_1}^{T_1} \delta_\epsilon(x) |x| dx = \frac{\epsilon}{\pi} \ln \left(1 + \frac{T_1^2}{\epsilon^2} \right),$$



由于不等式右端在 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 的极限下为零, 存在 $\epsilon > 0$ 使得

$$\left| \int_{-T_1}^{T_1} \delta_\epsilon(x) [f(x) - f(0)] dx \right| < \frac{\epsilon_1}{2},$$

这表明任取 $\epsilon_1 > 0$ 都存在 $\epsilon > 0$ 使得

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(x) f(x) dx - f(0) \right| < \epsilon_1,$$

于是可以得到

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(x) f(x) dx = f(0),$$

因此命题成立. □

注. 在泛函分析中, δ 函数定义为检验函数空间 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性映射 (线性泛函)

$$\delta: \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(\mathbf{x}) \mapsto f(0),$$

其中 \mathbb{R}^n 上的检验函数定义为仅在有界闭区域上非零的无穷阶连续可微函数. 构造 δ 函数的这种极限在泛函分析中称为弱 * 极限 (弱星极限).

题 5. 假设一个运动的点粒子的电荷密度为

$$\rho(\mathbf{r}, t) = q\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{w}(t)), \quad (5)$$

其中 $\mathbf{w}(t)$ 是粒子的运动轨迹. 计算

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r', \quad (6)$$

其中

$$t_r = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}, \quad (7)$$

称作推迟时间, c 是光速.

解. 根据 δ 函数的定义有

$$\rho(\mathbf{r}', t_r) = \int \rho(\mathbf{r}', t') \delta(t' - t + |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c) dt',$$

代入可以得到

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \int \frac{q\delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{w}(t'))\delta(t' - t + |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{q\delta(t' - t + |\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|} dt', \end{aligned}$$

设 $g(t') = t' - t + |\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|/c$, 可以计算得到

$$g'(t') = 1 - \frac{\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|} \cdot \frac{\mathbf{w}'(t')}{c},$$

由于粒子速度低于光速, 因此 $g(t')$ 至多只有一个零点, 且 $g'(t') > 0$, 于是有

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')| - [\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')] \cdot \mathbf{w}'(t')/c} \Big|_{t'=t-|\mathbf{r}-\mathbf{w}(t')|/c},$$

这称为 Liénard-Wiechert 势. □