



# Лабораторная работа №1.01

---

## Исследование распределения случайной величины

выполнили: студенты группы М3205 Бородина Ирина, Патолицына Анастасия

преподаватель: Хуснутдинова Наира Рустемовна

---

### Цели работы:

1. Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

### Задачи:

1. Провести многократные измерения определенного интервала времени (5 секунд).
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

### Экспериментальная установка:

В работе используются *часы с секундной стрелкой* - прибор, в котором происходит периодический процесс с частотой порядка нескольких десятых долей герца, и *цифровой секундомер*, с ценой деления не более 0,01 с. Первый прибор задает интервал времени, который многократно измеряется цифровым секундомером.

### Теория:

- **Распределением Гаусса** - распределение вероятностей, которое в одномерном случае задаётся функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса:

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Вид нормального распределения определяется значениями двух параметров: **математическим ожиданием**  $\langle t \rangle$  и **среднеквадратичным (стандартным) отклонением**  $\sigma$ .

Нормальное распределение симметрично относительно вертикали с абсциссой  $\langle t \rangle$ . Параметр  $\sigma$  характеризует «ширину» распределения.

- Закономерности в распределении значений случайной величины можно **надежно выявить при соблюдении двух условий**:
- **Гистограмма** - способ представления табличных данных в графическом виде - в виде столбчатой диаграммы. Количественные соотношения некоторого показателя представлены в виде прямоугольников, площади которых пропорциональны.

**В нашем случае** - показывающую, как часто при измерениях появляются значения, попадающие в тот или иной из равных интервалов  $\Delta t$ , лежащих между наименьшим  $t_{min}$  и наибольшим  $t_{max}$  из измеренных значений величины  $t$ . (см. рис. 1)

Ось абсцисс

(x) - измеряемая величина  $t$

Ось ординат

(y) - значения  $\frac{\Delta N}{N\Delta t}$ .

$N$  - полное количество измерений,  $\Delta N$  - количество результатов, попавших в интервал  $[t; t + \Delta t]$ .

$\frac{\Delta N}{N}$  - доля результатов, попавших в указанный интервал, и характеризует вероятность попадания в него результата отдельного измерения. Отношение этой величины к ширине интервала  $\Delta t$  характеризует некоторую «плотность вероятности».




Рис. 1. Гистограмма и функция Гаусса.

При очень большом числе измерений ( $N \rightarrow \infty$ ) весь диапазон значений  $t$  в принципе можно разбить на «бесконечно малые» интервалы  $dt$  и подсчитать число результатов  $dN$  в каждом из них. Тогда вместо ступенчатой гистограммы получится плавная кривая соответствующая новой функции  $t$ :

$$\rho(t) = \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \Delta t \rightarrow 0}} \frac{\Delta N}{N \Delta t} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dt}$$

- Параметры  $\langle t \rangle$  и  $\sigma$  могут быть определены только на основе результатов бесконечно большого числа измерений (генеральной совокупности).  
Однако, в соответствии с теорией вероятности из выборочной совокупности, содержащей  $N$  значений случайной величины  $(t_1, t_2, t_3, \dots, t_N)$ , можно найти приближенные значений этих параметров:

**выборочное среднее как среднееарифметическое всех результатов измерений:**

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n t_i$$

**и выборочное среднеквадратичное отклонение:**

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$$

В пределе величины  $\langle t \rangle_N$  и  $\sigma_N$  стремятся к  $\langle t \rangle$  и  $\sigma$ , соответственно.

- Из формулы функции Гаусса видно, что плотность нормального распределения имеет максимум при  $t = \langle t \rangle$  и симметрична относительно этого значения.
- Формула сравнения максимальной «высоты» гистограммы и  $\rho_{max}(t)$ :

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

- Соотношение для вероятности попадания результата измерения в интервал  $[t_1, t_2]$ :

$$P(t_1 < t < t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \rho(t) dt \approx \frac{N_{12}}{N}$$

В случае наиболее употребительных на практике интервалов (так называемых стандартных) эта вероятность при условии реализации нормального распределения случайной величины имеет следующие значения:

$$\begin{aligned} t \in [\langle t \rangle - \sigma, \langle t \rangle + \sigma], \quad P_\sigma &\approx 0,683 \\ t \in [\langle t \rangle - 2\sigma, \langle t \rangle + 2\sigma], \quad P_{2\sigma} &\approx 0,954 \\ t \in [\langle t \rangle - 3\sigma, \langle t \rangle + 3\sigma], \quad P_{3\sigma} &\approx 0,997 \end{aligned}$$

Из экспериментальной выборки объема  $N$  можно найти приближенные значения вероятностей, как отношения  $\frac{\Delta N_\sigma}{N}$ ,  $\frac{\Delta N_{2\sigma}}{N}$ ,  $\frac{\Delta N_{3\sigma}}{N}$ , где  $\Delta N_\sigma$ ,  $\Delta N_{2\sigma}$ ,  $\Delta N_{3\sigma}$  - количество результатов измерений, попавших в интервалы:

$$\begin{aligned} &[\langle t \rangle_N - \sigma_N, \langle t \rangle_N + \sigma_N] \\ &[\langle t \rangle_N - 2\sigma_N, \langle t \rangle_N + 2\sigma_N] \\ &[\langle t \rangle_N - 3\sigma_N, \langle t \rangle_N + 3\sigma_N] \end{aligned}$$

- Среднеквадратичное отклонение среднего значения:**

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$$

- Доверительным** называется **интервал** значений, в который попадает истинное значение измеряемой величины с заданной вероятностью.

$\alpha$  - доверительная вероятность;

$$\Delta t = t_{\alpha, N} \sigma_{\langle t \rangle};$$

$t_{\alpha, N}$  - табличное значение коэффициента Стьюдента;

$\sigma_{\langle t \rangle}$  - среднеквадратичное отклонение среднего значения;

$$\alpha = P(t \in [\langle t \rangle - \Delta t, \langle t \rangle + \Delta t])$$

## Ход работы:

Мы выбрали устанавливаемый по часам промежуток времени в 5 секунд, после чего многократно устанавливая этот промежуток времени, провели 50 измерений. Результаты каждого измерения занесли в Табл. 1.

Далее мы выбрали из Табл. 1 наименьший  $t_{min}$  и наибольшим  $t_{max}$  из результатов измерений:  
 $t_{min} = 4,20$ ,  $t_{max} = 5,66$

После нахождения  $t_{min}$  и  $t_{max}$  мы разбили промежуток  $[t_{min}; t_{max}] = [4,20; 5,66] = [4,10; 5,85]$  на  $m = 7$  равных интервалов  $\Delta t = \frac{5,85-4,10}{7} = 0,25$ , соблюдая условия, что:

1.  $m$  должно быть целым, близким к  $\sqrt{N} = \sqrt{50} \approx 7,07$ ,  $N$  - полное число измерений,
2. Измеренные значения  $t_{min}$  и  $t_{max}$  должны попадать внутрь «крайних» интервалов;
3. Граничные значения, разделяющие соседние интервалы, должны быть по возможности «круглыми» числами - это облегчит построение гистограммы, соответственно мы решили взять интервал  $[4,10; 5,85]$

Границы выбранных интервалов занесли в Табл. 2

Мы посчитали число результатов измерений  $\Delta N_i$ , попавших в каждый из интервалов  $\Delta t = 0,25$  и внесли данные в Табл. 2;

Следующим этапом мы вычислили опытное значение плотности вероятности  $\frac{\Delta N}{N \Delta t}$  и внесли данные вычислений в Табл. 2;

После мы построили гистограмму Рис. 1.

По данным Табл. 1 с помощью формул  $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n t_i$  и  $\sigma_N =$

$\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$  мы вычислили выборочное значение среднего  $\langle t \rangle_N = 5,00\text{с}$  и

выборочное среднеквадратичное отклонение  $\sigma_N = 0,23\text{с}$ .

Полученные значения мы внесли в самый низ Табл. 1.

Для контроля того, правильно ли мы вычислили  $\langle t \rangle_N$ , мы вычислили  $\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle_N) = 0,00\text{с}$ .

Это значение мы также внесли в низ Табл. 1.

Следующим этапом мы вычислили максимальное значение плотности распределения  $\rho_{max}$ , соответствующее  $t = \langle t \rangle$ . Для этого мы использовали формулу  $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ .

Так как в пределе величины  $\langle t \rangle_N$  и  $\sigma_N$  стремятся к  $\langle t \rangle$  и  $\sigma$ , соответственно, то формула приобретает вид  $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma_N\sqrt{2\pi}} = 1,73\text{с}^{-1}$

Это значение мы вносим в низ Табл. 1.

Далее мы нашли значения  $t$ , соответствующие серединам выбранных ранее интервалов из Табл. 2 используя формулу нахождения среднего арифметического значения, полученные значения внесли в соответствующий столбец Табл. 2.

После нам потребовалось вычислить для полученных

$t$  значения плотности распределения  $\rho(t)$  по формуле  $\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-\langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$ , где мы приняли параметры  $\langle t \rangle_N$  и  $\sigma_N$  в качестве  $\langle t \rangle$  и  $\sigma$ .

Внесем полученные значения в Табл. 2.

На гистограмму Рис. 1 мы нанесли все расчетные точки и провели через них плавную кривую.

Следующим этапом мы проверили, насколько точно выполняется в наших опытах соотношение между вероятностями:

$$\begin{aligned} t &\in [\langle t \rangle - \sigma, \langle t \rangle + \sigma], & P_\sigma &\cong 0,683 \\ t &\in [\langle t \rangle - 2\sigma, \langle t \rangle + 2\sigma], & P_{2\sigma} &\cong 0,954 \\ t &\in [\langle t \rangle - 3\sigma, \langle t \rangle + 3\sigma], & P_{3\sigma} &\cong 0,997 \end{aligned}$$

и долями  $\frac{\Delta N_\sigma}{N}$ ,  $\frac{\Delta N_{2\sigma}}{N}$ ,  $\frac{\Delta N_{3\sigma}}{N}$ .

Для этого мы занесли в Табл. 3 вычисленные границы интервалов  $\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$ ,  $\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$ ,  $\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$ .

Далее нам потребовалось по данным Табл. 1 подсчитать и занести в Табл. 3 количество  $\Delta N$  измерений, попадающих в каждый из вычисленных ранее для Табл. 3 интервалов, и отношение  $\frac{\Delta N}{N}$  этого количества к общему числу измерений.

Значения нормального распределения случайной величины  $P_\sigma \cong 0,683$ ,  $P_{2\sigma} \cong 0,954$ ,  $P_{3\sigma} \cong 0,997$  мы также внесли в Табл. 3, где наглядно видно насколько точно выполняется в наших опытах соотношение между вероятностями.

Потом мы рассчитали **среднеквадратичное отклонение среднего значения** по формуле:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$$

Получили:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{50(50-1)} 2,5756} = \sqrt{0,00105127} = 0,0324233 \text{ с}$$

Далее мы нашли табличное значение коэффициента Стьюдента  $t_{\alpha,N}$  для доверительной вероятности  $\alpha = 0,95$ . Рис. 2.

Получилось  $t_{\alpha,N} = 2,009575234489209$

Следом за этим, мы записали доверительный интервал для измеряемого в работе промежутка времени (5 секунд).

Для этого нам необходимо было сначала вычислить  $\Delta t = t_{\alpha,N} \sigma_{\langle t \rangle} = 2,009575234489209 \times 0,0324233 = 0,0651570607 \approx 0,066$

Тогда  $\alpha = P(t \in [\langle t \rangle - \Delta t, \langle t \rangle + \Delta t])$  имеет вид  $0,95 = P(t \in [4,934, 5,066])$

## Результаты:

**Таблица 1:** Результаты прямых измерений

№	$t_i, c$	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
1	5,08	0,08	0,0064
2	4,99	-0,01	0,0001
3	4,20	-0,80	0,6400
4	5,02	0,02	0,0004
5	4,78	-0,22	0,0484
6	5,40	0,40	0,1600
7	4,90	-0,10	0,0100
8	5,14	0,14	0,0196
9	5,01	0,01	0,0001
10	4,46	-0,54	0,2916
11	5,66	0,66	0,4356
12	5,00	0,00	0,0000
13	4,81	-0,19	0,0361
14	5,05	0,05	0,0025
15	4,93	-0,07	0,0049
16	4,76	-0,24	0,0576
17	4,93	-0,07	0,0049
18	5,07	0,07	0,0049
19	5,20	0,20	0,0400
20	5,00	0,00	0,0000
21	5,11	0,11	0,0121
22	4,81	-0,19	0,0361
23	5,03	0,03	0,0009
24	4,91	-0,09	0,0081
25	5,16	0,16	0,0256
26	4,98	-0,02	0,0004
27	5,08	0,08	0,0064
28	4,76	-0,24	0,0576
29	5,28	0,28	0,0784
30	5,05	0,05	0,0025
31	4,87	-0,13	0,0169



№	$t_i, c$	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
32	5,09	0,09	0,0081
33	4,83	-0,17	0,0289
34	5,28	0,28	0,0784
35	4,94	-0,06	0,0036
36	4,99	-0,01	0,0001
37	4,73	-0,27	0,0729
38	5,15	0,15	0,0225
39	4,98	-0,02	0,0004
40	5,13	0,13	0,0169
41	5,01	0,01	0,0001
42	4,85	-0,15	0,0225
43	5,36	0,36	0,1296
44	5,26	0,26	0,0676
45	5,11	0,11	0,0121
46	5,03	0,03	0,0009
47	5,04	0,04	0,0016
48	5,17	0,17	0,0289
49	4,98	-0,20	0,0400
50	4,82	-0,18	0,0324
	$\langle t \rangle_N = 5,00 c$	$\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle_N) = 0,00c$	$\sigma_N = 0,23 c$ $\rho_{max} = 1,73 c^{-1}$

**Таблица 2:** Данные для построения гистограммы

Границы интервалов, c	$\Delta N$	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, c^{-1}$	$t, c$	$\rho, c^{-1}$
от: 4,10 до: 4,35	1	0,08	4,225	0,00594
от: 4,35 до: 4,60	1	0,08	4,475	0,12823
от: 4,60 до: 4,85	9	0,72	4,725	0,84898

Границы интервалов, с	$\Delta N$	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, c^{-1}$	$t, c$	$\rho, c^{-1}$
от: 4,85 до: 5,10	25	2	4,975	1,72478
от: 5,10 до: 5,35	11	0,88	5,225	1,07520
от: 5,35 до: 5,60	2	0,16	5,475	0,20566
от: 5,60 до: 5,85	1	0,08	5,725	0,01158

**Таблица 3:** Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, с от	Интервал, с до	$\Delta N$	$\frac{\Delta N}{N}$	$P$
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	4,77	5,23	44	0,88	0,685
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	4,54	5,46	47	0,94	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	4,31	5,69	49	0,98	0,997




Рис. 1. Гистограмма и функция Гаусса.

## Таблица распределения Стьюдента


**Количество измерений:**

**Доверительная вероятность:**

Вы ввели:

Количество измерений:

Доверительная вероятность:

Коэффициент Стьюдента: 

Число степеней свободы равно  $f = n - 1 = 50 - 1 = 49$  тогда определяем значение коэффициента Стьюдента:

Рис. 2. Коэффициент Стьюдента для 50 измерений при доверительной вероятности 0,95

## Выводы:

В данной лабораторной работе мы исследовали распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени, где мы замеряли этот интервал с часов с секундной стрелкой цифровым секундомером.

В ходе опытов соответствующие значения  $\frac{\Delta N}{N}$  получились примерно равны соответствующим значениям плотности вероятности. Достаточно точно выполняется соотношение между вероятностями

$P_{\sigma} \cong 0,683$ ,  $P_{2\sigma} \cong 0,954$ ,  $P_{3\sigma} \cong 0,997$  и долями  $\frac{\Delta N_{\sigma}}{N}$ ,  $\frac{\Delta N_{2\sigma}}{N}$ ,  $\frac{\Delta N_{3\sigma}}{N}$ .

По графику видно, что исследуемое распределение соответствует нормальному.