

Avaliação do Raciocínio de Barry

Demonstração da Soma dos Ângulos Internos de um Triângulo

Contexto

Barry tentou provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° utilizando um triângulo isósceles e cálculos algébricos.

1 Avaliação do Raciocínio

Nota: 5/10

- **Por que não é um 10?** Barry comete um erro clássico de lógica matemática chamado **circularidade**. Para calcular o valor do ângulo a , ele já utilizou a fórmula $a = 180^\circ - 2c$, que assume previamente que a soma dos ângulos é 180° . Ele usou a própria tese para provar a tese.
- **Por que ganhou 5?** O raciocínio aritmético dele está correto, as propriedades do triângulo isósceles foram aplicadas bem e ele conseguiu verificar que os números fazem sentido juntos para aquele caso específico.

2 Outra Maneira Possível pela Geometria

A forma padrão e matematicamente válida de provar que a soma dos ângulos internos de **qualquer** triângulo é 180° utiliza o **Teorema das Retas Paralelas** (Postulado de Euclides).

Passo a Passo da Demonstração




Figure 1: Construção auxiliar: reta r paralela à base BC passando pelo vértice A .

Passo a Passo da Demonstração

1. **Desenhe uma linha auxiliar:** Dado um triângulo qualquer ABC , desenhe uma reta r que passa pelo vértice A e seja paralela ao lado BC (base).
2. **Identifique os ângulos alternos internos:**
 - A reta que passa por AB corta as duas paralelas. Isso cria um ângulo alterno interno no vértice A que é exatamente igual ao ângulo interno $\hat{B}$.

- A reta que passa por AC faz o mesmo do outro lado, criando um ângulo no vértice A igual ao ângulo interno $\hat{C}$.
3. **Observe a linha reta no vértice A :** No vértice A , os três ângulos adjacentes (o original $\hat{A}$ e os dois novos formados pelas paralelas) ficam lado a lado sobre a reta r .
 4. **Conclusão:** Como eles formam uma linha reta (um ângulo raso), a soma deles é obrigatoriamente 180° . Logo:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

Observação Final

Esta demonstração é **rigorosa** e aplica-se a **todos os triângulos**, diferentemente da tentativa de Barry que:

- Partiu da própria conclusão (circularidade)
- Só funcionaria para o caso específico analisado
- Não constitui uma prova matemática válida