

UNIVERSIDAD DE MURCIA

---

## FVVII: Tarea 1

---

Alonso Oma Alonso

11 de octubre de 2022

# Índice

1. Problema	2
-------------	---

## 1. Problema

Sea  $\mathcal{X}$  un conjunto,  $\mathcal{A} \subset P(\mathcal{X})$  una familia de subconjuntos de  $X$ , e  $Y \subset \mathcal{X}$ . Denotemos  $\mathcal{A}_y = \{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$ . Probar que las operaciones de generación e inducción se pueden intercambiar, es decir,  $\sigma(\mathcal{A})_y = \sigma(\mathcal{A}_y)$ .

**Definición 1.1.** Sea  $S \subset P(\mathcal{X})$ . La intersección de todas las  $\sigma$ -álgebras que contienen a  $S$  se denomina  $\sigma$ -álgebra generada por  $S$  y se denota por  $\mathcal{M}_S$ .

**Definición 1.2.** Sea  $\{\mathcal{X}, \mathcal{M}\}$  un espacio medible, y sea  $A \in \mathcal{M}$ . La  $\sigma$ -álgebra  $\{A \cap B : B \in \mathcal{M}\}$  se denomina  $\sigma$ -álgebra inducida en  $A$  y se denota  $\mathcal{M}_A$ .

La  $\sigma$ -álgebra generada por  $\mathcal{A} \subset P(\mathcal{X})$  es la intersección de todas las  $\sigma$ -álgebras que contienen a  $\mathcal{A}$ . Es decir,  $\sigma(\mathcal{A})$  es la menor  $\sigma$ -álgebra que contiene a  $\mathcal{A}$  y, además, da lugar a un espacio medible. Por lo tanto, ahora podemos aplicar la definición de  $\sigma$ -álgebra inducida en el espacio  $\{\mathcal{X}, \mathcal{M}_\mathcal{A}\}$ . Entonces  $\sigma(\mathcal{A})_y = \{Y \cap B : B \in \mathcal{M}\}$  será la  $\sigma$ -álgebra inducida en  $Y$ , y la denotaremos como  $\mathcal{M}_{\mathcal{A}_y}$ .

Ahora, veamos qué es  $\sigma(\mathcal{A}_y)$ : Por hipótesis, tenemos que  $\mathcal{A}_y = \{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$  la cuál no podemos dar por supuesto que es una  $\sigma$ -álgebra ya que no sabemos si  $\{\mathcal{X}, \mathcal{A}\}$  es un espacio medible. Sin embargo,  $\sigma(\mathcal{A}_y)$  sí que es una  $\sigma$ -álgebra, y además es la menor  $\sigma$ -álgebra que contiene a  $\mathcal{A}_y$ , por lo que la denominaremos  $\mathcal{M}'_{\mathcal{A}_y}$ .

- Para ver que  $\mathcal{M}'_{\mathcal{A}_y} \subset \mathcal{M}_{\mathcal{A}_y}$  vamos a ver que  $\mathcal{A}_y \subset \mathcal{M}_{\mathcal{A}_y}$ . Para ello es fácil ver que  $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}_\mathcal{A} \implies \{Y \cap A : A \in \mathcal{A}\} \subset \{Y \cap B : B \in \mathcal{M}_\mathcal{A}\}$ . Pero como por definición  $\mathcal{M}'_{\mathcal{A}_y}$  es la intersección de todas las *sigma*-álgebras que contienen a  $\mathcal{A}_y$ , entonces  $\mathcal{M}'_{\mathcal{A}_y} \subset \mathcal{M}_{\mathcal{A}_y}$ .
- Veamos ahora que  $\mathcal{M}_{\mathcal{A}_y} \subset \mathcal{M}'_{\mathcal{A}_y}$ : Esta la resolveremos por reducción al absurdo. Supongamos que no fuese cierto. Entonces existiría