



FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA

HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA

ESCUELA DE ENFERMERÍA

**NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS REACCIONES POST
VACUNALES Y ACTITUD DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE
2 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER – LA
VICTORIA, MARZO 2024.**

PARA OPTAR

EL TÍTULO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:

GABRIELA LUNA JAHUIRA

GRECIA PALACIOS BENITES

ASESOR (A)

MG. SILVIA PATRICIA CARRASCO CARRASCO

LIMA, PERÚ

2024

ÍNDICE

	Págs.
Portada.....	i
Índice	ii
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
1.1 Descripción de la situación problemática.....	1
1.3 Objetivos de la investigación	8
1.4 Justificación de la investigación.....	9
1.4.1 Importancia de la investigación	9
1.4.2 Viabilidad del estudio	10
1.5 Limitaciones de estudio	10
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	12
2.1 Antecedentes de la investigación	12
Antecedentes Internacionales	12
Antecedentes Nacionales.....	14
2.2 Bases teóricas.....	17
2.3 Definición de términos básicos	27
.....	29
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES	29
3.1 Formulación de hipótesis general.....	29
3.2 Variables y definición operacional	29
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA.....	32
4.1 Diseño metodológico	32
4.2 Diseño muestral	32
4.3 Técnica de recolección de datos	33
4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	35
4.5 Aspectos éticos	35
CRONOGRAMA	37
PRESUPUESTO	39
.....	40
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40
ANEXOS	54

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2022, refiere que la inmunización constituye una de las más eficaces estrategias para evitar enfermedades infecciosas en los niños. En cuanto a las cifras y estadísticas sobre el tema sostiene que la vacunación previene entre 3.5 y 5 millones de muertes al año alrededor del globo ¹. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en ese mismo año reporta que en los últimos años la cobertura de vacunación en Latinoamérica se ha mantenido alrededor del 90% para la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3) ².

También la OMS a escala global, refiere que, en el transcurso del año 2022, se suministraron tres dosis de la vacuna DTP al 84% de los lactantes a nivel mundial, aproximadamente 110 millones en total. Este protocolo de vacunación tiene como objetivo salvaguardar a los infantes de patologías infecciosas que podrían desencadenar trastornos, discapacidades severas e incluso resultar letales ^{3,4}.

Existen también reportes en el año 2020, alrededor del 85% de los infantes menores de un año en la Región latinoamericana fueron inoculados con tres dosis de la vacuna DTP3, brindándoles protección contra enfermedades infecciosas que podrían ocasionar afecciones graves, discapacidades o incluso resultar mortales ². Sin embargo, estas cifras mundiales pueden ocultar las importantes disparidades que

existen entre los países con distintos estratos de ingresos.

Con respecto a los efectos post vacunación en niños menores de 5 años son comunes, pero son en su mayoría leves y temporales. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. 2023, los efectos secundarios más comunes de las vacunas infantiles son dolor en el lugar de la inyección, fiebre baja, cansancio, irritabilidad y pérdida del apetito ⁵. Dichos efectos secundarios suelen desaparecer en unos pocos días y no suelen requerir tratamiento médico. En algunos casos, los niños pueden experimentar reacciones más graves, como una reacción alérgica, pero estas son muy raras ⁶. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos de los efectos secundarios, ya que las vacunas previenen enfermedades graves y potencialmente mortales en los niños ⁷⁻⁸.

Según Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2021, el 69,1% de los niños y niñas menores de un año de edad completaron su esquema de vacunación según las pautas establecidas en el programa de vacunación de 2018. Conforme a la Directiva Sanitaria de 2007, se observó un incremento del 1,7% en comparación con el año 2016, alcanzando un porcentaje del 56,7% de niños menores de 24 meses con vacunas completas en 2021 ⁹.

Asimismo, el porcentaje de niños menores de 24 meses con esquema de vacunación completo aumentó a un 72,6% en 2021, superando el 70,6% registrado en 2016 según la misma directiva. Para el grupo de niños menores de 36 meses, el 52,9% completó

todas las vacunas correspondientes a su edad en 2021, con una cobertura del 92,2% para la BCG y del 82,9% para la vacuna anti sarampión. La cobertura general de vacunas completas para este grupo de edad en 2021 fue del 73,8% ⁹.

Se implementó a nivel nacional la norma técnica de inmunizaciones NTS N° 884 - MINSA/DGIESP — 2022, que tiene como principal finalidad, mejorar el nivel de salud de la población en base a la prevención y control de diversas enfermedades para así disminuir la morbilidad infantil ¹⁰. Por ello es importante el conocimiento materno sobre las reacciones adversas post vacunales y la actitud que se debería aplicar si se presentará, de esta forma se evitarían complicaciones mediante un buen cuidado de la madre hacia la salud del niño. Ante esto se clasifican en: locales, sistemáticas y alérgicas, siendo la última la más grave y poco frecuente.

Se puede evidenciar diferentes estudios uno de ellos es de Contreras et al. ¹¹. realizado en México en el año 2022, se reporta el 51.2% son madres jóvenes entre 14 a 24 años, el 95.2% procedentes de la zona rural, un 41.7% alcanzó el nivel secundario, el 78.6% son amas de casa. Por último, el 63.1% tiene conocimiento medio y el 97.6% posee actitudes adecuadas ante el esquema de inmunizaciones.

Asimismo, sostiene Bermeo, E. et al ¹², en su estudio realizado en Ecuador en el 2018, donde el 73,3% las vacunas son importantes por la función preventiva que tienen frente a las enfermedades. En base a lo expuesto, se ha concluido que, los padres de familia, han contado con un elevado porcentaje de conocimiento.

Además, Melo, K. ¹³. et al. 2020 en el Perú, consideró que 3.33% de las progenitoras cuentan con conocimiento bajo y un 96.67% de ellas tienen un nivel de conocimiento

medio; en referencia a la variable actitud hacia las inmunizaciones se obtuvo como resultados que el 88.33% de las madres tienen actitud desfavorable y un 11.67% de las madres tienen una actitud favorable.

De acuerdo a la investigación Huamán H.et al. ¹⁴ en Lima — Perú 2019, concluyó que los cuidados que ofrecen los padres frente a las reacciones locales como el dolor son adecuados, sin embargo, frente a las reacciones locales de endurecimiento y enrojecimiento son inadecuados, además los cuidados que brindan frente a las reacciones sistémicas como la fiebre, diarrea, vómito e irritabilidad son adecuados, no obstante, frente a la pérdida de apetito e identificación de la fiebre se encuentran por debajo de la media. Al respecto existe déficit de conocimientos, por ello es importante el rol del enfermero en educar a la madre.

Por otra parte, en el año 2020 se realizó una investigación en el Perú, en la cual se halló que el 90% de las madres considera que la vacunación es importante para la salud de sus hijos, pero solo el 60% conoce los efectos secundarios de las vacunas ¹⁵. Otro estudio realizado en Lima en 2019 encontró que el 70% de las madres encuestadas tenía un nivel de conocimiento adecuado acerca de las inmunizaciones, pero solo el 50% conocía los efectos secundarios de las vacunas ¹⁶.

Además, se encontró un estudio más reciente llevado a cabo en el Centro de Salud Atusparias en 2019 reveló que el 59.3% de las madres encuestadas presentaba un nivel de conocimiento deficiente en relación con las posibles reacciones adversas posteriores a las inmunizaciones en niños menores de 5 años ¹⁷.

La falta de conocimiento sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas puede generar aprehensión y desconfianza en las madres, lo que a su vez puede dar lugar a una reducción en la cantidad de niños vacunados y, como consecuencia, a un incremento en la incidencia de enfermedades que podrían haberse evitado mediante la vacunación.

Por otro lado, se ha podido investigar que el año 2019, se realizó un Barrido Nacional contra la Sarampión Paperas Rubeola y Poliomielitis, se encontró un caso en la cual se evidencio la falta de información sobre los efectos post vacunales, un niño arequipeño menor de 9 años llevo a la ciudad de lima por su delicado estado de salud, la madre del infante refirió que su hijo se encontraba resfriado cuando fue vacunado contra el sarampión en su institución educativa, un día después de haber sido inoculado presentó fiebre, puntos rojos y pasado dos días su piel presento ampollas las cuales se fueron reventando. Los reportes médicos dieron a conocer que realmente el niño padecía de una rara enfermedad conocida con el nombre de síndrome de Stevens Johnson¹⁸.

Este caso fue alarmante y causo gran conmoción y temor en la población de Arequipa debido a la falta de información sobre efectos post vacunales, por ello es importante que el personal de enfermería promocioe la salud a través de charlas educativas y consejería para así proveer cuidados adecuados.

Es por ello que la actitud es conceptualizada como el comportamiento que tienen los seres humanos frente a la vida y en diversas circunstancias. La vacunación en la actitud materna puede estar influenciadas por diversos factores, como las creencias

culturales, las experiencias previas, la falta de información o incluso el miedo a posibles efectos secundarios. Es importante abordar estas inquietudes para fomentar la comprensión de la importancia de la vacunación en la salud infantil ya que esta es una de las más eficaces medidas sanitarias de mayor efectividad en el control de enfermedades.

En base a lo expuesto una preocupación para la mayoría de las madres son las reacciones post vacunales, digamos que para algunas de ellas la palabra “vacunación” no es buena para sus hijos porque les causa dolor en la zona de aplicación y creen que en lugar de protegerlos los está enfermando. Se puede señalar que se cuenta con 3 tipos de actitudes: la actitud conductual, la actitud afectiva y la actitud cognitiva, es por eso que las madres deben de ser apoyadas y guiadas por el personal de enfermería para alcanzar los niveles altos de inmunización mejorando la salud, desarrollo y crecimiento del infante¹⁹.

Estos resultados señalan la presencia de una brecha en el entendimiento materno respecto a los efectos posteriores a la vacunación en niños menores de 2 años en Perú. Esta falta de conocimiento puede incidir negativamente en la actitud de la madre mediante la cobertura de vacunación y en la prevención de enfermedades infecciosas entre la población infantil ²⁰.

En relación al rol educador de la enfermera, este estudio considera el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender como uno de los enfoques más significativos. Este modelo permite inculcar el cambio de comportamiento en las personas para tomar decisiones más saludables en relación con el cuidado de su salud. En este sentido, es

requisito que la madre realice un cambio de conducta mediante la adquisición de conocimientos sobre los cuidados post vacunales para brindar un cuidado que evite enfermedades o consecuencias graves en la salud del niño, garantizando su bienestar y promoviendo su salud ²¹.

De igual importancia, la realidad visualizada en las madres de niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Max Arias Schreiber se puede constatar la falta de conocimiento sobre las reacciones post vacunales asociados a la mala praxis durante la aplicación de la vacuna por parte del personal de enfermería, siendo el principal motivo de quejas y ausencia a los controles de inmunización. Por eso es importante realizar la identificación de las fortalezas y debilidades con la información proporcionada por el personal de salud, permitiendo así la formulación de estrategias destinadas a mejorar la comunicación con las madres.

Por todo lo expuesto se formula el siguiente problema de investigación:

1.2 Formulación del problema

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y las actitudes de las madres de los niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Max Arias Schreiber, marzo 2024?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y las actitudes de las madres de los niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Max Arias Schreiber, marzo 2024.

1.3.2. Objetivos específicos

- Evaluar el nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones post vacunales local y sistemática, en los niños menores de 2 años.
- Evaluar la actitud sobre las reacciones post vacunales como: conductual, cognitiva y afectiva, de las madres.
- Identificar la relación entre el nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y las dimensiones de la actitud como: conductual, cognitiva y afectiva, de las madre.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la inmunización es un componente esencial de la salud primaria, la cual previene y controla los distintos brotes de enfermedades, actualmente existen vacunas que salvan entre 2 y 3 millones de vidas cada año. Asimismo, en el Perú aún no se ha logrado una cobertura al 100% de vacunación infantil, es así que en el 2023 se reportó que la vacunación infantil se redujo un 7,8% producto de la pandemia Covid-19 ²².

Debido a estas cifras alarmantes, resulta imperativo continuar con la investigación ya que aportará el conocimiento ya existente sobre la relevancia del entendimiento y la actitud de la madre acerca de los efectos post vacunales en niños menores de 2 años y se pretende promover los esfuerzos promocionales con el propósito de mejorar la cobertura de vacunación y prevenir enfermedades infecciosas en la población infantil.

Por ello, se ha realizado esta investigación de interés metodológico ya que el estudio cumple con el propósito investigativo, por tal motivo se usará dos variables: dependiente e independiente, empleando el diseño correlacional. Con este fin, se realizará una metodología cuantitativa mediante la aplicación de dos encuestas.

Finalmente, permitirá la evaluación del grado de conocimiento y actitud que poseen las madres acerca de los efectos post vacunales en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, y con los datos obtenidos se podrá identificar las fortalezas y

debilidades del rol educador de la enfermera, evaluando su efectividad y considerando esta información de vital importancia para otros centros de salud en el territorio nacional.

1.4.2 Viabilidad del estudio

El presente estudio es viable ya que cuenta con información aprobada por investigadores científicos, asimismo se han realizado estudios previos lo que facilita la búsqueda actualizada de información y comparación con la literatura. La población de estudio serán 80 madres de los niños menores de 2 años del Centro de Salud Max Arias Schreiber, se llevará a cabo respetando a los principios bioéticos, en la cual se les brindará toda la información necesaria para obtener el consentimiento voluntario de las madres y su participación. Además, el presente trabajo se realizará en un corto plazo, aproximadamente un mes durante el año 2024 para la ejecución de todos los procesos de investigación. El financiamiento del estudio será autofinanciado por los investigadores en su totalidad, no implicará gastos mayores al momento del desarrollo.

1.5 Limitaciones de estudio

La limitación para la elaboración del estudio de investigación será la siguiente:

Las madres que participen en la investigación se encontrarán cuidando a su menor hijo en espera de atención en el consultorio de Inmunizaciones, lo cual podría representar un impedimento para el correcto llenado del cuestionario. Frente a esta situación, se buscará un momento oportuno posterior a la atención del niño para que la madre tenga disponibilidad de tiempo y pueda responder adecuadamente la encuesta.

El permiso del Director del C.S Max Arias Schreiber podría dilatar el tiempo de respuesta para autorizar la ejecución del estudio, sin embargo, se establecerá comunicación constante con el Director del C.S, se explicará la relevancia del estudio, así como el proceso de aplicación del instrumento.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Antecedentes Internacionales

López, G. en el año 2022, México, realizó un artículo de investigación titulado “Influencia del conocimiento en las actitudes en madres con niños menores de 5 años ante el esquema de vacunación”. El método de estudio fue de tipo descriptivo, transversal, de diseño no experimental y enfoque cuantitativo, tuvo como población 110 madres con hijos menores de 5 años. Obtuvo como resultados que el 51.2% son madres jóvenes entre 14 a 24 años, el 95.2% procedentes de la zona rural, un 41.7% alcanzó el nivel secundario, el 78.6% son amas de casa. Por último, el 63.1% tiene conocimiento medio y el 97.6% posee actitudes adecuadas ante el esquema de inmunizaciones ²³ .

Pincay y Quichimbo en el año 2021, Ecuador, realizó un trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre inmunizaciones en madres de menores de 2 años” en el Centro de Salud "Santa Martha". El método de estudio fue de tipo descriptivo, y de corte transversal, con una población de 30 madres. Los resultados fueron que un 83% tiene un conocimiento alto sobre los cuidados post vacunales, el 17% tiene un conocimiento bajo sobre los cuidados post vacunales ²⁴ .

Valero, A. en el año 2020, Ecuador, realizó un trabajo de investigación titulado “Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres sobre inmunización infantil de niños de 0 a 2 años en el Centro de Salud Parque Iberia Cuenca”. Tuvo una metodología de enfoque cuantitativo y de corte transversal, su población fueron 128 madres. Obtuvo como resultados que el 87,5% considera a la vacuna como un medicamento que ayuda a evitar enfermedades. Por otro lado, solo un 64,8% conocía el esquema de vacunación; mientras que un 35,2% desconocía ²⁵.

Adefolalu et al., en el año 2020, Nigeria, realizó un trabajo de investigación titulado “Conocimiento, actitud y cumplimiento materno sobre la vacunación de niños menores de cinco años en el Centro de Salud Primarios en IkOrodu Local Área gubernamental, estado de Lagos”. El método de estudio fue de tipo descriptivo y corte transversal, con una población de 250 madres. Los resultados fueron que el 72% tenían un buen conocimiento sobre la inmunización, el 100% tenían una actitud positiva hacia la inmunización y el 86,4% de las encuestadas habían inmunizado completamente a sus hijos ²⁶.

Sánchez J, en el año 2020, Ecuador, realizó un trabajo de investigación titulado “Conocimiento de las madres sobre el manejo de efectos adversos post vacunales en niños menores de dos años, en el centro de salud Nuevo Israel, durante el periodo 2018”. El método de estudio fue de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo y de corte transversal, con una población de 50 madres. Los resultados fueron que un 52% no

aplica ni manipula, frente a 20% que realiza un cuidado idóneo, así mismo la reacción más frecuente es pápulas mediante la vacuna BCG, rotavirus, SPR (sarampión, paperas y rubéola) y fiebre amarilla y por último la varicela tiene un 52% prevalencia la fiebre como signo post vacunal ²⁷.

Antecedentes Nacionales

Gutiérrez, M. en el año 2022 en Huancayo realizó un trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre inmunizaciones y el manejo de las reacciones post vacunales de las madres de niños menores de 5 años atendidos en el puesto de salud Miluchaca. El método de estudio fue de diseño correlacional, no experimental y de corte transversal, tuvo una población de 80 madres. Obtuvo como resultados que el 67,50 % presentan un nivel de conocimiento regular sobre las inmunizaciones, 48,75% maneja adecuadamente las reacciones post vacunales y el 18.75% madres con manejo inadecuado; 26.25 % presentan un nivel de conocimientos bueno y manejan adecuadamente las reacciones post vacunales. Y solo 6.25 % madres presentaron niveles bajos de conocimiento sobre inmunizaciones ²⁸.

Poma Y. en el año 2022, Chilca, realizó un trabajo de investigación titulado "Nivel de Conocimiento de las madres sobre reacciones adversas post vacunales en niños del Centro de Salud de Chilca 2022". El método de estudio fue enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, corte transversal, no experimental con la participación de 68 madres como muestra de estudio. Obtuvo como resultados que el 73.3% presente un nivel de conocimiento deficiente sobre las reacciones post vacunales, 23.3% un nivel de conocimiento medio y por último 3.3% presenta un nivel de conocimiento alto ²⁹.

Antezano N. en el año 2022, Huancayo, realizó un trabajo de investigación titulado "Conocimiento y actitudes sobre inmunización en madres de niños menores de un año que acuden al centro de salud la libertad Huancayo 2022". El método de estudio fue enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, correlacional, corte transversal, no experimental con la participación de 89 madres como muestra de estudio. Obtuvo como resultados que el 35 % de las madres presentan un bajo nivel de conocimiento sobre inmunizaciones, de las cuales el 16% demuestra una actitud mala, el 10% regular y 9% una actitud buena. También se pudo observar que el 45% de las madres tienen un nivel medio de conocimiento de las inmunizaciones de las cuales el 20% presentaron una actitud mala, 17% tiene una actitud regular y por ultimo 7% buena. Mientras el 21% de madres presenta un nivel alto de conocimiento sobre inmunizaciones donde se puede destacar que 15% presenta una actitud regular, 4% adecuada y por último el 2% una actitud mala ³⁰.

Condori, N. en el año 2021, Ica, realizó un trabajo de investigación titulado “Conocimiento y actitudes sobre inmunización en madres de niños menores de un año que acuden al centro de salud Jesús María, Lima — 2021”. El método de estudio fue de corte transversal y tipo descriptivo, tuvo una población de 80 madres con hijos menores de 1 año. Obtuvo como resultados, el 26.25% muestran conocimientos sobre vacunas en un nivel bajo, el 40% nivel medio y el 33.75% alto; en cuanto a la variable actitudes el 23.75% cuenta con un nivel malo, el 46.25% una actitud regular y el 30.00% bueno ³¹.

Gonzales E. en el año 2020, Lambayeque, realizó un trabajo de investigación titulado “ Nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones post vacunales en niños menores de 5 años. Centro de Salud Copallín - Bagua 2019”. El método de estudio fue tipo descriptivo y enfoque cuantitativo, tuvo una población de 165 madres. Obtuvo como resultados que el 45% de madres tienen un nivel de conocimiento bueno y un 34% regular sobre reacción post vacunal local común; un 48% de madres tienen un nivel de conocimiento bueno y un 32% regular sobre reacción post vacunal local rara asimismo, el 59% de madres tienen un nivel de conocimiento bueno y un 29% regular sobre reacción post vacunal sistémica común y el 48% de madres tienen un nivel de conocimiento bueno y el 42% regular sobre reacción post vacunal sistémica rara ³².

2.2 Bases teóricas

2.2.1 CONOCIMIENTO

Mario B.³³, conceptualiza el conocimiento como un “conjunto de ideas, conceptos, enunciados que pueden ser precisos, claros, ordenados e inexactos” en base a ello clasifica el conocimiento como: científico, ordinario y vulgar. El primero lo define como un conocimiento objetivo, sistemático, racional y verificable; por otro lado, el autor identifica el conocimiento ordinario, como un conjunto de ideas que se basa a través de la experiencia y la reflexión, por último, el conocimiento vulgar como una idea inexacta y limitada a la observación.

Asimismo, el conocimiento se puede clasificar en una serie de factores propios al ser humano, entre ellos tenemos: conocimiento formar, conocimiento informal, el teórico y empírico, por ello conforme se va adquiriendo en la madre, estas obtienen mayor madurez emocional y de autocuidado. Además, obtienen nuevos conocimientos que le permiten cumplir su papel materno con suficiente beneficio, participando en actividades que estén dirigidas a promover un óptimo estado de salud del niño ³⁴ .

2.2.2 Nivel de conocimiento

Los niveles de conocimiento se derivan del avance en la producción del saber y representan un incremento en la complejidad con que se explica o comprende la realidad. Existen tres niveles de conocimiento: alto (es aquel que logra adquirir su mayor autonomía y expresión de mundo inmediato), regular (el conjunto de ideas y conceptos apoyado del material empírico con el fin de interrelacionar procesos y objetos de estudio), bajo (conocimiento deficiente que se logra obtener a través de la practica en la cual el ser humano lo realiza cada día) ³⁵.

2.2.3 Inmunización

Según la OPS ³⁶, define la inmunización como un proceso por el cual un individuo se hace resistente a una enfermedad, tanto por el contacto con ciertas enfermedades, o mediante la administración de una vacuna. Las vacunas estimulan el sistema inmunitario del cuerpo para proteger a la persona contra infecciones o enfermedades.

Por otro lado, la Norma Técnica de Inmunización en el Perú NTS 884 — 2022, tiene como objetivo establecer un esquema de inmunización ordenado y cronológico de cumplimiento obligatorio para poder reducir las tasas de morbilidad infantil, debido a enfermedades inmunoprevenibles, para así lograr la eliminación, control y erradicación de las enfermedades ¹⁰.

2.2.3 Importancia de conocimiento de Inmunización

El conocimiento de la inmunización es definido como aquella información que obtiene la madre por medio de su experiencia o por la información que le es brindada por el personal de salud referente a la inmunización. Por otro lado, hace referencia a los conocimientos de la madre sobre las inmunizaciones y el rol de esta, para tener una participación en actividades que promueven el bienestar y salud del niño ¹⁵.

Además, el conocimiento de inmunización también se refiere al entendimiento de la madre referente a las vacunas y los efectos que la misma pueda tener en los menores, y mediante la información que la madre posea tome conciencia y lleve el cumplimiento del calendario de vacunación del niño con la finalidad de prevenir enfermedades ³⁷.

2.2.4 Rol de la enfermera en Inmunizaciones

Según la Norma Técnica de Inmunizaciones 2022¹⁰, el papel de las enfermeras en la vacunación es fundamental; además de administrar, gestionar y mantener las vacunas tienen que estar en permanente actualización sobre las evidencias que se generan en torno a ellas, para prestar unos cuidados de calidad, y eficientes. Por ello, la labor de promoción y prevención de salud es muy importante, ya que permite resolver las dudas, inquietudes o preocupaciones que pueden tener las madres sobre el tema, por lo tanto, las enfermeras son un apoyo para el bienestar de la Salud Pública.

2.2.6 Rol de las madres ante un efecto post vacunal

La madre cumple el rol importante como cuidadora principal del niño y por ello es necesario que tenga un nivel promedio de conocimiento sobre la identificación y cuidados frente los efectos post vacunales que pueden ser generados por la vacunación. Además, se puede destacar que los cuidados que se deben tener sobre la vacunación en este grupo vulnerable deben ser guiados por el personal sanitario apoyando a las madres en la salud del infante. Sin embargo, diversos estudios evidencian que las madres desconocen cuáles son los diferentes efectos post vacunales y la forma adecuada para cuidar a su hijo frente estos casos ³⁸.

2.2.5 Reacciones locales post vacunales

Las vacunas no representan una seguridad extrema, por lo cual al administrarse existe una tendencia a que estas produzcan efectos post vacunales en el cuerpo, esto radica tanto en la vacuna administrada como la vía de administración, donde las reacciones podrían ser desde leves, moderadas y graves, estas pueden llegar a ser de tipo local o sistemática. Se puede definir que las reacciones locales son aquellas que suelen afectar la zona de punción, estas se dividen en dos tipos: comunes y raras ³⁹.

Por lo tanto, la primera se caracteriza por la presencia de dolor, enrojecimiento y endurecimiento, además, estas causan un dolor e incomodidad, causando un malestar general en todo el cuerpo. Mientras, las reacciones locales raras son aquellas que provocan una excesiva picazón en la piel, acumulación de pus en una parte determinada del cuerpo e inflamación. Además, estas también se caracterizan por la hipersensibilidad ³⁹.

2.2.6 Reacciones sistemáticas post vacunales

Se encuentran divididas en dos grupos las reacciones sistemáticas: comunes y raras. El primero, resulta ser menos frecuentes que las reacciones locales, pueden presentar síntomas como fiebre, cefalea, irritabilidad, malestar general, dolor muscular, erupción cutánea, diarrea y vómitos ⁴⁰.

Por otro lado, las reacciones sistémicas raras son menos frecuentes que las comunes, estas presentan síntomas como: fiebre, palidez, hipotonía y disminución en el estado de conciencia, asimismo, la duración de estas reacciones puede llegar a ser de minutos u horas, desapareciendo sin dejar secuelas ⁴¹.

2.2.7 Posibles efectos post vacunales

Vacuna BCG: Es una vacuna viva atenuada, del Báculo de Caímotte-Guérin (BCG), que corresponde a una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. Sus posibles efectos son que días después de la vacunación puede desarrollarse un nódulo de induración en el sitio de la inyección, que disminuye gradualmente y es reemplazado por una lesión local que puede ulcerarse semanas más tarde, por ello no requiere tratamiento médico ¹⁰.

Vacuna Pentavalente: Es una vacuna inactivada, contiene células completas inactivadas de Bordetella pertussis, toxoide diftérico y tetánico, antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B, y el polisacárido conjugado de Haemophilus influenza tipo b. Sus posibles efectos son: locales (Dolor, enrojecimiento, induración en el lugar de la aplicación.) y sistemático (Se manifiestan en las 48 horas siguientes a la vacunación con llanto persistente, alza térmica, irritabilidad)¹⁰.

Vacuna Neumococo: Es una vacuna conjugada, que previene las infecciones invasivas graves, de los serotipos más comunes de *Streptococcus pneumoniae* o neumococo. Entre los posibles efectos locales se tiene como: Dolor, eritema, edema e induración en el sitio de la inyección y sistemático se presenta: Alza térmica, irritabilidad, somnolencia, pérdida de apetito, vómitos, diarreas, reacción cutánea ¹⁰.

Vacuna SPR: Es una vacuna viva atenuada, preparada por el virus del sarampión Edmonston-Zagreb. Usualmente entre los siete y catorce días se puede presentar: Por el componente sarampión: Alza térmica, exantema, tos, coriza, manchas de Koplik, purpura trombocitopenia, conjuntivitis del componente anti sarampión. Por el componente antirrubéolico: genera fiebre, exantema, además linfadenopatías y artralgias en menos de 0.5% de los casos. El componente antiparotídico puede producir en muy raras ocasiones (menos del 0.1%) fiebre, hipertrofia parotídea, entre el día 7 y 21 post vacunación¹⁰.

Vacuna Rotavirus: Es una vacuna de virus vivos atenuados, previene la enfermedad diarreica. Puede presentarse en muy pocos casos: Alza térmica, diarrea, vómitos, irritabilidad ¹⁰.

Vacuna Antiamarílica: Es una vacuna de virus vivos atenuados, cultivada en huevos de gallina cuyos virus han sido debilitados para que no produzcan la enfermedad. Entre las posibles reacciones locales se tiene: Dolor, eritema, edema e induración en el sitio de aplicación. Mientras, en las reacciones sistémicas: Cefalea, mialgias, malestar ¹⁰.

Vacuna DPT: Es una vacuna inactivada, mezcla de toxoide tetánico, diftérico y vacuna de células muertas o inactivadas de la bacteria *Bordetella pertussis*. Entre las posibles reacciones locales se tiene: Dolor, sensibilidad, enrojecimiento, edema e induración en el lugar de la aplicación de la vacuna. Por otro lado, las reacciones sistémicas se

pueden presentar: Alza térmica, malestar general, mialgias, cefalea e irritabilidad, episodio de llanto prolongado y convulsiones-episodios de hipotonía y reacciones anafilácticas ¹⁰.

2.2.8 Importancia de las vacunas en los primeros años de vida

Una acción fundamental durante el crecimiento de los seres humanos es la aplicación de vacunas en las primeras etapas de la vida como medida preventiva de enfermedades, de esta forma se garantiza un buen crecimiento y desarrollo. Con el único objetivo de que el receptor reciba inmunidad contra cualquier tipo de organismo estimulando así el mecanismo de defensa. ⁴².

Además de ello, la Norma Técnica de Inmunizaciones 2022 ¹⁰, define que las vacunas con el pasar del tiempo han logrado reducir los índices de morbilidad infantil. Además, de salvar vidas también la mejora y brinda la oportunidad de tener un óptimo crecimiento y de esa forma se desarrollará de forma óptima logrando una excelente calidad de vida.

2.2.9 Modelo de Promoción de la Salud

Según la autora Nola Pender, expone su modelo de promoción de la salud el cual ha sido empleado por los profesionales de Enfermería, debido a que está dirigido primordialmente a promover conductas saludables en los pacientes, logrando así

generar conductas que prevengan enfermedades inmunoprevenibles.

Asimismo, manifiesta en su teoría, que las conductas son motivadas por un deseo que posibilita el alcance del bienestar y del potencial humano, además, el modelo presenta aspectos que intervienen en las modificaciones de las conductas de las personas, actitudes y motivaciones dirigidas al accionar, lo cual promoverá la salud integral ⁴³.

Por ello, este modelo es muy importante porque permitirá reforzar la capacidad de cada una de las madres hacia el cuidado y la responsabilidad hacia el niño, las cuales son conductas que deben estar dirigidas a lograr el bienestar y brindar respuestas en la que se adoptan decisiones sobre el cuidado infantil.

2.2.10 ACTITUD

Las actitudes sobre la inmunización se refieren a la conducta que tienen las madres frente la relevancia y los beneficios que son otorgados mediante el cumplimiento de los esquemas de vacunación de los menores, teniendo conocimiento sobre las contraindicaciones y efectos secundarios de la misma ⁴⁴.

Otros estudios científicos la conceptualizan como la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien, y se manifiesta a través de sus pensamientos, comportamientos y emociones. Es una intención o propósito que conduce a un comportamiento en particular ⁴⁵.

Por otro lado, esto determinará la disposición de las madres para tener conductas

adecuadas vinculadas a la importancia que tiene la inmunización, basándose en una percepción de conocimientos y de creencias ⁴⁶.

DIMENSIONES DE ACTITUDES SOBRE INMUNIZACIÓN:

De acuerdo con Florencio⁴⁷, las dimensiones son las siguientes:

Actitud conductual

Consiste en la disposición de las personas para actuar o comportarse de una manera particular ya sea favorable o desfavorable en base a una dirección prevista. Además, se refiere a aquella parte de la actitud que refleja la intención de una persona a corto o largo plazo. En otras palabras, se basa en un registro sobre el cual el individuo dice que hará y lo que en realidad llega a hacer.

Actitud cognitiva

Son conceptualizadas como el conjunto de información que los individuos poseen sobre un objeto determinado, evento, personas, las creencias, percepciones o los estereotipos, en otras palabras, son las ideas o conocimiento que se tiene sobre determinado objeto. Por lo cual, para que pueda existir una actitud, es fundamental la existencia de una representación cognoscitiva sobre el objeto.

Se puede añadir que hace referencia a la información y a la percepción que uno tiene

acerca del objeto de actitud. Es decir, son las creencias, los valores, las opiniones, los conocimientos y las expectativas que llevan a uno a actuar de un modo concreto ante un objeto o situación.

Actitud afectiva

Se basa en los sentimientos de la persona que son generados por determinadas situaciones o decisiones, lo cual es experimentado en diversos momentos. Estas pueden ser positivas o negativas, en este caso acerca de los efectos post vacunales en la inmunización, las madres pueden experimentar diversos sentimientos al momento de decidir llevarlo a cabo o desistir de este proceso.

2.2.11 Importancia de la actitud de las madres frente las reacciones post vacunales

Las actitudes que las madres tienen frente a las reacciones post vacunales son fundamentales, en cuanto la adopción o la ejecución de los procesos de vacunación posibilitan la prevención de una gran cantidad de enfermedades, las cuales de no prevenirlas pueden llegar a afectar la salud, desarrollo y el crecimiento del menor, e incluso estas enfermedades pueden llegar a ser mortales.

Por lo tanto, las actitudes que tomaran las madres son esenciales para alcanzar niveles altos de inmunización, siendo guiadas por el personal de salud brindándoles toda la información necesaria para cuidar el bienestar infantil ⁴⁸.

2.3 Definición de términos básicos

Anticuerpo: Son moléculas de la inmunidad humoral específica cuya principal función es la defensa contra microorganismos y toxinas producidas por los distintos agentes microbianos. Estas moléculas que son proteínas (inmunoglobulinas), tienen la capacidad de unirse con el antígeno que ha producido su formación ¹⁰.

Antígeno: Sustancia o grupo de sustancias que son capaces de estimular la producción de una respuesta inmune, específicamente de anticuerpos¹⁰.

Barrido: Es una actividad complementaria de vacunación masiva, que se realiza con el objetivo de desarrollar una barrera sanitaria en un determinado ámbito geográfico en riesgo epidemiológico, por la presencia de un caso confirmado de una enfermedad sujeta a erradicación o eliminación o frente a la acumulación de susceptibles ¹⁰.

Brote: Es la aparición de más casos de una enfermedad que los esperados en un área dada en un período de tiempo establecido ¹⁰.

Anafilaxia: Reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal ¹⁰.

Dolor: En la zona de inyección es uno de los efectos secundarios más frecuentes. Normalmente es leve y se pasa en unas horas ⁴⁹.

Absceso: Es una colección de pus que viene precedida de una condición inflamatoria de la zona de inyección ⁵⁰.

Endurecimiento: Situación en la que el músculo donde se administra la vacuna tiende a endurecer después de este procedimiento. ⁵⁰.

Irritabilidad: Todas las vacunas causan un poco de irritabilidad. Esto suele ser debido a las molestias en el sitio de la inyección. Algunos niños duermen más de lo normal. También es normal que el niño tenga menos apetito y esté menos activo⁵⁰.

Enrojecimiento: Algunas de las sustancias que contienen las vacunas pueden provocar el enrojecimiento en la piel del niño. No es un efecto secundario muy habitual tras una vacuna, pero en algunos casos suele ocurrir ⁵¹.

Fiebre: No ocurre con todas las vacunas y tampoco en todos los niños, pero es posible que aparezca algo de fiebre con diferentes picos y en algunos casos se debe administrar antipirético, entre estas vacunas se tiene la pentavalente ⁵¹.

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal

Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y las actitudes de las madres de los niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Max Arias Schreiber, marzo 2024.

3.2 Variables y definición operacional

Variable independiente: Nivel de conocimiento (Anexo 1)

Variable dependiente: Actitud (Anexo 2)

Definición conceptual: El nivel de conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, que pueden ser precisos, claros, ordenados e inexactos. Por ello, permitirá que la madre cumpla con su rol logrando un beneficio y participando en las actividades que estén dirigidas a promover un óptimo estado de salud del niño ⁵².

Definición conceptual: Las actitudes de las madres ante la inmunización se refiere a la conducta frente la relevancia y los beneficios que son otorgados mediante el cumplimiento de los esquemas de vacunación de los menores, teniendo conocimiento

sobre las contraindicaciones y efectos secundarios de la misma esto ayudará a prevenir diferentes enfermedades, ayudando a que el infante logre un buen crecimiento y desarrollo ⁵³.

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Variable independiente: Nivel de conocimiento	Esta variable será medida por un cuestionario cuyo autor es Gutiérrez en el año 2019, se enfocará en la evaluación de los indicadores como: Reacciones locales post vacunales y reacciones sistemáticas post vacunales. Su valor final será: • Conoce • No conoce	Reacciones locales post vacunales	• Definición • Conocimiento sobre reacciones locales	Nominal
		Reacciones sistemáticas post vacunales	• Definición • Conocimiento sobre reacciones sistémicas	
Variable dependiente: Actitud	Esta variable será medida por un cuestionario de tipo Likert cuyo autor es Florencio en el año 2017, se enfocará en la evaluación de los indicadores como: actitud conductual, actitud cognitiva y actitud afectiva. Su valor final será: • Bueno • Regular • Malo	Actitud conductual	• Información sobre inmunización • Acciones • Cumplimiento con el esquema de vacunación	Ordinal
		Actitud cognitiva	• Conocimientos • Creencias	
		Actitud afectiva	• Emociones • Sentimientos	

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

El presente estudio será de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo correlacional, de corte transversal, prospectivo, no experimental.

4.2 Diseño muestral

4.2.1 Población

La población de estudio estará conformada por 80 madres de familia de los niños menores de 2 años que asisten al Centro de Salud "Max Arias Schreiber" - La Victoria.

Criterios de inclusión

- Madres de niños menores de 2 años.
- Madres que atienden a sus niños en el consultorio de Inmunizaciones del Centro de Salud Max Arias Schreiber.
- Madres con participación voluntaria en las actividades y firma de consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Madres analfabetas.
- Madres quechua - hablantes.
- Madres con limitaciones para comunicarse. (sordo y mudo).

4.3 Técnica de recolección de datos

En la presente investigación, se utilizará la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario (Anexo 1), titulado " Nivel de Conocimiento sobre reacciones post vacunales en madres de niños menores de 24 meses que asisten al centro de salud "Playa Rímac"- Callao, 2019". Presenta una confiabilidad de α de Cronbach = 0,875 y para su validez fue sometida a juicio de expertos, obteniendo una validez al 90%.

El instrumento tiene un formato tipo cuestionario, incluye 16 preguntas agrupadas en 3 dimensiones: conocimiento general sobre inmunizaciones con 4 preguntas, conocimiento sobre reacciones locales post vacunales con 6 preguntas y conocimiento sobre reacciones sistemáticas post vacunales con 6 preguntas. Teniendo en cuenta que la respuesta

correcta (1 punto) e incorrecta (0 puntos), serán evaluadas en tres escalas : No conoce (0 – 8 puntos) y Conoce (9 – 16 puntos)

Nivel de conocimiento	Puntaje
Conoce	9 a 16 puntos
No conoce	0 a 8 puntos

El siguiente instrumento que se utilizará en la presente investigación será un cuestionario de tipo Likert (Anexo 2), titulado “Cuestionario para evaluar actitudes sobre inmunizaciones” fue desarrollado por Florencio, en Perú 2017. Presenta una confiabilidad de α de Cronbach = 0,860. Para su validez fue sometido a juicio de expertos, obteniendo una validez al 100%.

El instrumento consta de 19 ítems, dividido en tres dimensiones: conductual (desde la pregunta 1 al 6), cognitiva (desde la pregunta 7 al 12) y afectiva (desde la pregunta 13 al 16) con una escala de Likert: (3) Siempre, (2) A veces y (1) Nunca. Los resultados serán evaluados bajo tres calificaciones, Bueno (45 a 47 puntos), Regular (32 a 44 puntos), Malo (19-31 puntos).

	General	D1- Nivel cognitivo	D2 - Nivel afectivo	D3 - Nivel conductual
Malo	19-31	6-9	7-11	6-9
Regular	32-44	10-13	12-16	10-13
Bueno	45-47	14-18	17-21	14-18

El instrumento se aplicará de forma presencial en el Centro de Salud Max Arias Schreiber los días 4 y 5 de marzo del 2024, se dará un tiempo de 10-20 minutos por madre para realizar la encuesta.

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

La información se procesará en el programa SPSS v. 26. Donde los resultados se expondrán en tablas de frecuencia y gráfico de barras, mediante la estadística inferencial. Por otro lado, para el análisis de la hipótesis se aplicará la prueba estadística Chi — cuadrado.

4.5 Aspectos éticos

El análisis será inspeccionado por el comité de ética del Centro de Salud Max Arias Schreiber, para obtener la autorización de ejecución. Asimismo, cabe señalar que la indagación aplicará los criterios de la declaración de Helsinki, en la cual se ha propuesto para orientar a los profesionales de salud en busca de promover el respeto a todos los seres humanos, para proteger su salud y sus derechos individuales⁵⁴. Asimismo, se contará con sus principios bioéticos:

Principio de autonomía: Las madres de los niños que se atienden en el C.S Max Arias Schreiber no estuvieron expuestas a experiencias de riesgo para su salud. Se tomó en cuenta la aceptación por medio del consentimiento informado ⁵⁵.

Principio de beneficencia: En el presente estudio a través de los resultados, se promovió identificar el nivel de conocimientos de las madres y así mejorar eficazmente la consejería de enfermería en el Centro de Salud “Max Arias Schreiber” ⁵⁵ .

Principio de justicia: En este estudio se brindó a cada madre el derecho a un trato justo, respetando sus ideas y opiniones, sin discriminación alguna que vaya a perjudicar su integridad física como emocional ⁵⁵.

Principio de no maleficencia: Se le explico a cada madre que en este estudio no se pondrá en riesgo su salud y se tomará en cuenta la discreción y el anonimato ⁵⁵.

CRONOGRAMA

N°	Actividades	2023 - 2024					
		Noviembre 2023	Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024
1	Identificación y formulación del problema	X					
2	Revisión de las fuentes de información	X					
3	Redacción de objetivos y operacionalización de las variables	X					
4	Determinación del diseño de investigación		X				
5	Determinación del marco muestral		X				
6	Selección de los estadígrafos a utilizar			X			
7	Recolección de datos			X			
8	Organización y procesamiento de los datos				X		
9	Análisis e interpretación de los resultados				X		
10	Redacción del informe					X	
11	Presentación del informe						X

PRESUPUESTO

Tipo	Servicios	Unidad	Costo unidad	Monto total
Recursos humanos	Investigador	2 tesistas	1.800	3600
	Personal para la tabulación	2 tesistas	150	300
	Análisis estadístico	2 programas	100	200
	Traducción del documento en ingles	1 hoja	80	80
	Sub total	7	2130	4260
Adquisición de bienes	Material de escritorio (hojas, tóner de impresión, lapicero)	170	100	100.00
	Incentivo para participantes	100	90	250
	Sub total	270	190	350
Servicios	Internet	2	140	800
	Impresión de cuestionarios y fotocopia de documentos	300	30	90
	Movilidad	2	16	48
	Sub total	304	186	938
TOTAL GENERAL				5548

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización mundial de la salud [Internet]. Ginebra; c2022. Vacunas e inmunización. [citado 9 de noviembre de 2023]. Disponible de: https://www.who.int/es/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1
2. Organización Panamericana de la salud [Internet]. Washington, DC: OPS ; c2022. Datos y estadísticas de inmunización. [citado 9 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://www.paho.org/es/temas/inmunizacion/datos-estadisticas-inmunizacion>
3. Organización mundial de la salud [Internet]. Ginebra; c2023. Cobertura de inmunización [citado 9 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage>

4. Centro de control y prevención de enfermedades [Internet]. EE. UU, Atlanta. c2023. Deciding to Vaccinate Your Child [citado 9 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/why-vaccinate/vaccine-decision.html>
5. Centro de control y prevención de enfermedades [Internet]. EE. UU, Atlanta; c2023 Vacunas para el niño a los 4-6 años [citado 9 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/by-age/years-4-6-sp.html>
6. Tian M, Yang J. Vaccine-Associated Neurological Adverse Events [Internet]. A Case Report and Literature Review. Curr Pharm Des; c2020 [citado 9 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31742492/>
7. Gidengil C, Goetz MB, Newberry S, et al. Safety of vaccines used for routine immunization in the United States [Internet] An updated systematic review and meta-analysis. Vaccine; c2021[citado 9 de noviembre de 2023].Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34049735/>
8. Spencer JP, Trondsen Pawlowski RH, Stephanie Thomas. Vaccine Adverse Events: Separating Myth from Reality [Internet]. c2020 [citado 9 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28671426/>

9. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. Perú; c2021. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [citado 9 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://proyectos.inei.gob.pe/endes/>

10. Ministerio de Salud [Internet]. Perú; c2022. Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación. Resolución Ministerial N° 884-2022-MINSA. [citado 9 de noviembre de 2023] Disponible de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3823311/Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Salud.pdf?v=1668009871>

11. Contreras M, López G, López G. Influencia del conocimiento en las actitudes en madres con niños menores de 5 años ante el esquema de vacunación. Medicina Forense [Internet]. 2022 [citado 9 de noviembre de 2023]; 7(1):39-55. Disponible de: <https://www.medigraphic.com/pdfs/forense/mmf-2022/mmf221b.pdf>

12. Bermeo E, Chamba R. Conocimientos y prácticas que tiene los padres de familia en la post vacunación en niños menores de 1 mes [Tesis de licenciatura en Internet]. Ecuador: Universidad de Cuenca, 2020. [citado 9 de noviembre de 2023]. 72p. Disponible de: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/12345678/29301/1/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf>

13. Melo K. Conocimiento y actitudes sobre inmunizaciones en adre de menores de 5 años AA.HH. los Cedros de Manchay [Tesis de licenciatura en Internet]. Perú: Universidad César Vallejo. Pachacamac, 2020. [citado 9 de noviembre de 2023]. 73p. Disponible de: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/60109/Melo_MKMSD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14. Huamán HP, Huangal SA, Victorio RM. Cuidados de los Padres de Familia frente a las reacciones post vacunación de sus niños menores de un año en el Servicio de Inmunización del Centro de Salud Materno Infantil Dr. Enrique Martín Altuna — Zapallal. [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Cayetano Heredia, 2020. [citado 9 de noviembre de 2023]. 49p. Disponible de: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/6590/Cuidados_HuamanHinostroza_Maria.pdf?sequence=1&isAllowed=y

15. Sánchez M. Conocimientos de las madres sobre la vacunación en niños menores de 2 años que asisten a un centro de salud de Lima. [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020. [citado 9 de noviembre de 2023]. 89p. Disponible de: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/15557>

16. Palomino KS. Nivel de conocimiento de madres de niños menores de 5 años sobre inmunizaciones en la I. E. I. Condevilla Señor II. [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Privada del Norte, 2020. [citado 9 de noviembre de 2023]. 78p. Disponible de: <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/23874>

17. Montenegro BM, Maribel J, Flor M, Llatas DH. Conocimientos de madres sobre reacciones adversas post-inmunizaciones en menores de 5 años del Centro de Salud Atusparias-2019. [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Señor de Sipán, 2020. [citado 9 de noviembre de 2023]. 75p. Disponible de: <http://repositorio.uss.edu.pe//handle/20.500.12802/7841>

18. Gutiérrez BK, Landauro QG. “Nivel de conocimiento sobre reacciones post vacunales en madres de niños menores de 24 meses que asisten al centro de salud Playa Rímac – Callao – 2019. [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Nacional del Callao, 2020. [citado 9 de noviembre de 2023]. 96p. Disponible de: <https://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/5569/TESIS%20LANDAURO%20QU%20c3%91ONES%20GUTIERREZ%20BARRETO-ENFERMERIA-FCS-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

19. Ponce M. Actitudes: definición, componentes, funciones, modelos, autores y teorías [Internet]. OPN; c2021. Disponible de: <https://oposicionespolicianacional.com/actitudes>

20. Bustamante C, Franco SN, Gómez QM. Promoción de la salud bajo la perspectiva de Nola Pender en una comunidad urbana de Pereira [Tesis de licenciatura en internet]. Colombia: Universidad del Areandina, 2023. [citado 14 de noviembre de 2023]. 76p. Disponible de: <https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/4967>

21. Aristizábal GP, Blanco Borjas DM, Sánchez Ramos A, Ostiguín Meléndez RM. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. Revista de enfermería [Internet]. 2020 [citado 14 de noviembre de 2023] 8(4): 16-23. Disponible de: <https://revista-enfermeria.unam.mx/ojs/index.php/enfermeriauniversitaria/article/view/248>

22. El Peruano [Internet]. Perú; c2023. Vacunación infantil bajó en Perú; 21 de abril 2023 [citado 17 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://www.elperuano.pe/noticia/210653-vacunacion-infantil-bajo-en-peru>

23. López G. Influencia del conocimiento en las actitudes en madres con niños menores de 5 años ante el esquema de vacunación. Medicina Forense. [Internet]. 2022 [citado 17 de noviembre de 2023]; 7(1):39-55. Disponible de: <https://www.medigraphic.com/pdfs/forense/mmf-2022/mmf221b.pdf>

24. Quichimbo C. Nivel de conocimiento sobre inmunizaciones en madres de menores de 2 años [Tesis de licenciatura en internet]. Ecuador: Universidad estatal del sur Manabí, 2021 [citado 17 de noviembre de 2023]. 74p. Disponible de : <https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/3328/1/QUICHIMBO%20CANCINO%20PAULINA.pdf>
25. Valero A, Ugalde J. Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres sobre nutrición e inmunización infantil de niños de 0 a 2 años pregrado [Tesis de licenciatura en internet]. Ecuador: Universidad de Cuenca. 2022 [citado 17 de noviembre de 2023]. 79p. Disponible de: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33980>
26. Adefolalu. Conocimiento, la actitud y el cumplimiento de las madres con respecto a la vacunación de niños menores de cinco años [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad politécnica de Amazonas, 2023 [citado 17 de noviembre de 2023]. 86p. Disponible de: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/33980/1/Proyecto%20de%20investigaci%3b3n.pdf>

27. Sánchez F. Conocimientos de madres sobre manejo de efectos adversos post vacunales en niños menores de dos años. Med.General Integral [Internet]. 2021 [citado 17 de noviembre de 2023]; 37(1) :14-23. Disponible de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252021000100015

28. Gutiérrez M. Nivel de conocimiento sobre inmunizaciones y el manejo de las reacciones post vacunales de las madres de niños menores de 5 años atendidos en el puesto de salud Miluchaca [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad nacional del Altiplano, 2023 [citado 17 de noviembre de 2023]. 75p. Disponible de: http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/21022/Velasquez_Maquera_Wendy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

29. Poma Y. Nivel de Conocimiento de las madres sobre reacciones adversas post vacunales en niños del Centro de Salud de Chilca [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2022 [citado 17 de noviembre de 2023]. 78p. Disponible de: <http://hdl.handle.net/20.500.14140/1116>

30. Antezano N, Mendoza R. Conocimiento y actitudes sobre inmunización en madres de niños menores de un año que acuden al centro de salud la Libertad [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Privada Franklin Roosevelt, 2022. [citado 17 de noviembre de 2023]. 49p. Disponible de: [https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/1114/TESI S%20ANTEZANO%20-%20MENDOZA.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/1114/TESI%20ANTEZANO%20-%20MENDOZA.pdf?sequence=4&isAllowed=y)

31. Condori N, Murgueito C, Mallque S. Conocimiento y actitudes sobre inmunización en madres de niños menores de un año que acuden al centro de salud Jesús María [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Autónoma de Ica, 2021 [citado 17 de noviembre de 2023]. 86p. Disponible de: [http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/1162/1/TESI S%20CONDORI%20-%20MALLQUE%20-%20MURGUEITO.pdf](http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/1162/1/TESI%20CONDORI%20-%20MALLQUE%20-%20MURGUEITO.pdf)

32. Gonzales Q. Nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones post vacunales en niños menores de 5 años. Centro de Salud Copallín Bagua [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2020 [citado 17 de noviembre de 2023]. 54p. Disponible de: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4872640>

33. Bunge M. La ciencia. Su método y su filosofía [Internet]. Filosofía y ciencia; c2020. [citado 19 de noviembre de 2023]. Disponible de: https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf.
34. Segundo J. Conocimiento [Internet]. Concepto de; c2023. [citado 19 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://concepto.de/conocimiento/#ixzz6nurauQb1>
35. Gonzales J. Los niveles del conocimiento. scielo [Internet]. 2020 [citado 19 de noviembre de 2023];14 (65): 133-141 Disponible de: [Los niveles de conocimiento. El Aleph en la innovación curricular \(redalyc.org\)](#)
36. Organización Panamericana de la salud [Internet]. Estados Unidos; c2020. Inmunización; 17 de junio de 2020 [citado 19 de noviembre de 2023] Disponible de: <https://www.paho.org/es/inmunizacion>

37. Figueroa R. Factores sociodemográficos y cumplimiento al control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años, Centro de Salud Urubamba Cusco 2020 [Tesis de licenciatura de internet]. Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2021 [citado 23 de noviembre de 2023]. 121p Disponible de: [http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2098/TESIS_RIN A FIGUEROA TINOCO.pdf?sequence=2&isAllowed=y](http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2098/TESIS_RIN_AFIGUEROA_TINOCO.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

38. Farias A, Freire N. Conocimiento de madres sobre manejo de efectos adversos post vacunales en niños menores de dos años. Rev. Cub med. [Internet]. 2021 [citado 23 de noviembre de 2023] ;37(1) : 40–45. Disponible de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252021000100015

39. Chávez Y. Factores que influyen en el abandono del calendario de vacunación en madres menores de 5 años [Tesis de especialización en Internet]. Perú: Universidad San Martín de Porres.; 2020 [citado 23 de noviembre de 2023]. 78p. Disponible de: http://200.37.11.68/bitstream/handle/usmp/2692/morillo_yc.pdf?sequence=3&isAllowed=y i 44

40. Saldaña A. Factores Obstétricos Y Perinatales Asociados Al Inicio Temprano De La Lactancia Materna. Hospital Regional Docente De Cajamarca. [Tesis de licenciatura en internet]. Perú: Universidad Nacional de Cajamarca, 2020 [citado 23 de noviembre de 2023]. 77p. Disponible de:
<https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/3713/tesis%20pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

41. Caizaluisa N, Calispa J. Conocimientos, actitudes, creencias y prácticas sobre vacunación en niños de 0 a 4 años de edad, en el Centro de Salud de Cotocollao del Cantón Quito, [Tesis de licenciatura en internet]. Ecuador: Universidad Central del Ecuador; 2020. [citado 23 de noviembre de 2023]. 85p. Disponible de:
<https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/b29b1d93-ff63-49c4-a765-388c6dccc626/content>

42. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Internet]. New York: UNICEF; c2020. Lo que debemos saber sobre las vacunas infantiles. [citado 23 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://www.unicef.org/parenting/es/salud/lo-que-debes-saber-sobre-vacunas-infantiles>

43. Delgado G. Intervención educativa para elevar los conocimientos en el cumplimiento de vacunas en madres de niños menores de un año, centro de salud Monsefú, [Tesis de licenciatura en Internet]. Perú: Universidad Señor de Sipán; 2020 [citado 23 de noviembre de 2023]. 92p. Disponible de:
[https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.1282/5024/Delgado Cabanillas Gladys Violeta.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.1282/5024/Delgado_Cabanillas_Gladys_Violeta.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
44. Pariona C. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre inmunizaciones que poseen las madres de niños menores de cinco años que asisten al Hospital de Huaycán, [Tesis de licenciatura en Internet]. Perú: Universidad Peruana Unión, 2020. 97p. Disponible de:
<https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/543>
45. Arellán M. Conocimientos y actitudes de madres con hijos menores de 5 años sobre vacunas. Investigación y Casos en Salud [Internet]. 2020 [citado 17 de diciembre de 2023]; 3(3): 130-137. Disponible de:
<https://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/article/view/83/84>

46. Valero A, Ugalde J. Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres sobre nutrición e inmunización infantil de niños de 0 a 2 años. Centro de Salud Parque Iberia Cuenca. [Tesis de licenciatura en Internet]. Ecuador. Universidad de Cuenca; 2020. [citado 17 de diciembre de 2023]. 79p. Disponible de: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/33980/1/Proyecto%20de%20investigaci%3%b3n.pdf>

47. Florencio M. Actitud frente a la inmunización según las características socio demográficas de las madres de niños menores de 5 años [Tesis de posgrado en internet]. Perú: Universidad César Vallejo; 2020 [Citado el 17 de diciembre del 2023].123p. Disponible de: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12863/Florencio_GMA.pdf?sequence=1

48. Olaya K, Posada C. Rol de enfermería en inmunización a niños menores de 5 años en un centro de salud de la ciudad de Guayaquil [Tesis de licenciatura en internet]. Ecuador: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2020 [citado 23 de noviembre de 2023]. 97p. Disponible de: <https://es.scribd.com/document/604648463/Rol-de-La-Enfermera-Comunitaria>

49. Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor H, Gibson S, et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain [Internet]. 2020 [citado 23 de noviembre de 2023]; 161(9):1976–82. Disponible de: https://journals.lww.com/pain/abstract/2020/09000/the_revised_international_association_for_the.6.aspx

50. Quiñones Loayza JB. Nivel de conocimiento sobre inmunización y manejo de las reacciones post vacunales en madres de niños (as) menores de 5 años atendidos en el puesto de salud Huyro - La convención. [Tesis de Licenciatura en Internet]. Perú: Universidad Andina del Cusco; 2020 [citado 23 de noviembre de 2023]. 108p. Disponible de: <https://hdl.handle.net/20.500.12557/1273>

51. Asociación Española de Pediatría [Internet]. Madrid; c2022. Decálogo de la fiebre; 21 de noviembre 2023 [citado 23 de noviembre de 2023]. Disponible de: <https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-laaep-2022>

52. Tarazona Ibarra, A. Conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de inmunizaciones en madres con hijos menores de un año. Hospital Antonio Caldas Domínguez Poma Bamba Huaraz. [Tesis de licenciatura en Internet]. Perú: Universidad Nacional Santiago Antonio de Mayolo, 2020. [citado 30 de noviembre de 2023]. 111p. Disponible de: <http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2485>
53. Pariona Anaya Catelin M. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre inmunizaciones que poseen las madres de niños menores de cinco años que asisten al Hospital de Huaycán [Tesis de licenciatura en Internet]. Perú: Universidad Peruana Unión, 2021. [citado 30 de noviembre de 2023]. 97p. Disponible de: http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/518/Catelin_Tesis_bachiller_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
54. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos [Internet]. 2020. [citado 30 de noviembre de 2023]; 6(1): 125-144 Disponible de: <https://www.redalyc.org/pdf/1892/189219032009.pdf>
55. Colegio de Enfermeras del Perú [Internet]. Lima: Colegio de Enfermeras del Perú Código de ética de deontológico del enfermero peruano; 14 de enero del 2020. [citado 30 de noviembre de 2023]. Disponible de: https://www.cep.org.pe/wpcontent/uploads/2021/10/codigo_etica_deontologia.pdf

ANEXOS

ANEXO A

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION: NIVEL DE CONOCIMIENTO

Título de la investigación: Nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y actitud de las madres de niños menores de 2 años en el centro de salud Max Arias Schreiber, marzo 2024.

Presentación: El presente cuestionario tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones post vacunales.

INSTRUCCIÓN: Leer cada pregunta y marcar una respuesta según corresponda.

REACCIONES ADVERSAS:

1. ¿Qué es una vacuna?

- a) Enfermedad contagiosa producida por la vacuna
- b) Efecto no deseado producido por la vacuna
- c) Sustancia que se aplica para proteger al niño
- d) Sustancia que se aplica para producir enfermedad

2. ¿Qué es una reacción adversa post vacuna?

- a) Enfermedad contagiosa producida por la vacuna
- b) Efecto no deseado producido por la vacuna
- c) Sustancia que se aplica para proteger al niño
- d) Sustancia que se aplica para producir enfermedad

3. ¿Cómo definiría usted las reacciones adversas que puede aparecer en el lugar de aplicación de una vacuna?

- a) Son reacciones como: inflamación, enrojecimiento, dolor, etc.
- b) Son reacciones como: fiebre, sueño, falta de apetito, vómitos, diarrea, etc.
- c) Son reacciones de origen desconocido
- d) Todas las anteriores

4. ¿Cómo definiría usted una reacción que se produce de manera general por la aplicación de una vacuna?

- a) Son reacciones como: fiebre, sueño, falta de apetito, vómitos, diarrea, etc.
- b) Son reacciones presentes en el lugar de vacunación como: inflamación, enrojecimiento, dolor.
- c) Son reacciones de origen desconocido
- d) Todas las anteriores

5. La vacuna BCG que se aplica en el brazo derecho del recién nacido para protegerlo contra la tuberculosis, puede presentar como reacción adversa:

- a) Fiebre
- b) Una ampolla roja que deja al sanar una cicatriz
- c) Puntos rojos en brazo, pecho y espalda
- d) Todas las anteriores

6. La vacuna contra la Hepatitis B que se aplica en el muslo del recién nacido, puede presentar como reacción adversa:

- a) Dolor en el lugar de aplicación
- b) Vómitos
- c) Diarrea
- d) Ninguna de las anteriores

7. La vacuna contra el Neumococo que protege contra las neumonías y que se aplica en el muslo del niño a los 2, 4 y 12 meses, puede presentar como reacción adversa:

- a) Fiebre
- b) Sueño
- c) Enrojecimiento e inflamación
- d) Todas las anteriores

8. La vacuna IPV que protege contra la poliomielitis aplicada en el muslo del niño a los 2 y 4 meses, puede presentar como reacción adversa:

- a) Dolor en el lugar de aplicación
- b) Convulsiones
- c) Infección en el lugar de aplicación

d) Ninguna de las anteriores

9. La vacuna Rotavirus que protege contra las diarreas que recibe el niño en la boca a los 2 y 4 meses puede producir como reacción adversa:

- a) Diarrea e irritabilidad
- b) Dolor y Urticaria
- c) Enrojecimiento de la piel
- d) Todas las anteriores

10. . La vacuna Pentavalente que protege contra 5 enfermedades y que es aplicada en el muslo del niño a los 2,4 y 6 meses puede producir como reacción adversa:

- a) Fiebre
- b) Malestar general
- c) Llanto prolongado
- d) Todas las anteriores

11. La vacuna APO que protege contra la poliomielitis aplicada vía oral en gotitas al niño a los 6 y 18 meses, puede producir como reacción adversa:

- a) Convulsiones b) Inflamación en zona de aplicación
- b) Puntos rojos en el brazo durante las primeras 24 horas
- c) Llanto prolongado
- d) Ninguna de las anteriores

12. La vacuna contra la Influenza aplicada en el muslo del niño a los 6 y 7 meses puede producir como reacción adversa:

- a) Convulsiones
- b) Dolor en el lugar de aplicación
- c) Puntos rojos en el brazo, pecho o espalda
- d) Vómitos

13. La vacuna SPR que protege contra la sarampión, paperas y rubeola es aplicada en el brazo del niño cuando cumple 1 año, puede producir como reacción adversa:

- a) Fiebre durante las primeras 24 horas
- b) Sarpullido o puntos rojos en los primeros 2 días
- c) Fiebre, puntos rojos y malestar entre el 7mo a 14vo día

d) Ninguna de las anteriores

14. La vacuna contra la Varicela que es aplicada a partir del año de edad en el brazo del niño puede producir como reacción adversa:

- a) Fiebre durante las primeras 48 horas
- b) Sarpullido o puntos rojos en las primeras horas
- c) Fiebre, puntos rojos e irritabilidad a partir del 5to a 30 días después de la vacuna
- d) Ninguna de las anteriores

15. La vacuna contra la Fiebre Amarilla aplicada a los 15 meses en el brazo del niño, puede producir como reacción adversa:

- a) Fiebre
- b) Dolor en la zona de aplicación
- c) Malestar
- d) Todas las anteriores

16. La vacuna DPT (Difteria, pertusis y tétano) es aplicada en el brazo del niño a los 18 meses y puede producir como reacción adversa:

- a) Llanto prolongado
- b) Fiebre
- c) Malestar general
- d) Todas las anteriores

ANEXO B
INTRUMENTO DE INVESTIGACION: ACTITUD

Título de la investigación: Nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y actitud de las madres de niños menores de 2 años en el centro de salud Max Arias Schreiber, marzo 2024.

Presentación: El presente cuestionario tiene como objetivo indagar acerca de las actitudes que usted tiene frente a las reacciones post vacunales en las inmunizaciones. **Instrucciones:** Leer cada pregunta y marcar con aspa (X) la alternativa que considere correcta. Siempre (3) A veces (2) Nunca (1).

N°	Ítems	Siempre	A veces	Nunca
Conductual				
1	Llevo a mi hijo a vacunar en la fecha establecida.			
2	Si tengo dudas pregunto sobre las molestias de las vacunas			
3	Tomo en cuenta los comentarios negativos de mis vecinas respecto a las vacunas			
4	Sugiero a otras madres que vacunen a sus hijos menores			
5	Estoy dispuesta a educarme sobre enfermedades que estoy protegiendo a mi hijo con las vacunas			
6	Estoy dispuesta a seguir las indicaciones después que vacunen a mi hijo.			
Cognitiva				
7	Conozco de qué enfermedades estoy protegiendo a mi hijo con las vacunas			
8	Mi hijo se puede enfermar por la falta de vacunas.			

9	Conozco las reacciones adversas que podría tener mi hijo al recibir la vacuna			
10	Creo que las vacunas producen más daño que salud a mi hijo			
11	Creo en los comentarios negativos de mis vecinos respecto a las vacunas.			
12	Creo que hay vacunas que pueden ocasionar problema de salud en mi hijo			
Afectiva				
13	Me desanima llevar a mi hijo a sus vacunas por el llanto y dolor que le produce			
14	Me da miedo la reacción que va tener mi hijo después que le colocan sus vacunas			
15	Me preocupo cuando mis hijos no reciben sus vacunas a tiempo			
16	Me gusta recibir información sobre las vacunas que necesita mi hijo.			
17	Me preocupan las molestias que podría tener mi hijo por recibir vacunas.			
18	Me desagrada que vacunen a mi hijo			
19	Me asusta que mi hijo tenga contacto con un niño enfermo			

ANEXO C: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

VARIBLE 1: NIVEL DE CONOCIMIENTO

JUICIO DE EXPERTOS

En esta investigación, lo primero que se realiza es obtener la información de los JUECES, luego se tabula esta información, con lo cual podremos ya trabajar en el programa SPSS.

Se trabajará a un nivel de significancia estadística de 0.05.

Es de nuestro conocimiento, que de acuerdo con Ruiz Bolívar (2002), contamos con la siguiente escala del grado de confiabilidad.

Rangos	Magnitud
0,61 a 1,00	Muy Alta
0,61 a 0,80	Alta
0,41 a 0,60	Moderada
0,21 a 0,40	Baja
0,01 a 0,20	Muy Baja

Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002).

Los resultados serán presentados en tablas.

Se tiene en cuenta también que para determinar el grado de confiabilidad y validez DEL JUICIO DE EXPERTOS se ha trabajado con un STAFF DE 8 EXPERTOS, de los cuales tenemos:

Ndelítem	EXPT1	EXPT2	EXPT3	EXPT4	EXPT5	EXPT6	EXPT7	EXPT8
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0
2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0
3	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
13	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
14	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15	3,0	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0
16	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Prueba binomial

		Categoría	N	Proporción observada	Prop. de prueba	p
EXPT2	Grupo 1	1,50	2	,13	,50	,004
	Grupo 2	3,00	14	,88		
	Total		16	1,00		
EXPT4	Grupo 1	1,50	2	,13	,50	,004
	Grupo 2	3,00	14	,88		
	Total		16	1,00		
EXPT6	Grupo 1	1,50	2	,13	,50	,004
	Grupo 2	3,00	14	,88		
	Total		16	1,00		
EXPT8	Grupo 1	1,50	2	,13	,50	,004
	Grupo 2	3,00	14	,88		
	Total		16	1,00		

Si $p < 0.05$ la concordancia es significativa

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Nº de EXPERTOS
,875	8

VARIBLE 2: ACTITUD

Título: CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE INMUNIZACIÓN EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD JESÚS MARÍA, LIMA - 2021

Duración: 20 minutos

Valoración: Para la presente investigación, se ha considerado la escala nominal de valoración

Confiabilidad del instrumento: La confiabilidad del presente instrumento, se ha encontrado determinado, por medio del Alfa de Cronbach, en el que una valoración mayor a 0.70, alcanzando un valor de 0.947

Profesionales validadores: -Dr. Edmundo Gonzáles Zavala / Dr. William Chu Estrada / Dr. Elio Javier Huaman Flores / MG. KELLY FARA VARGAS PRADO

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,910	19

Estadísticas de total de elemento				
	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
pre1	35,80	67,853	,284	,912
pre2	36,00	60,632	,759	,900
pre3	35,30	63,484	,557	,906
pre4	35,80	67,853	,284	,912
pre5	36,00	60,632	,759	,900
pre6	35,30	63,484	,557	,906
pre7	35,80	67,853	,284	,912
pre8	36,00	60,632	,759	,900
pre9	35,30	63,484	,557	,906
pre10	35,80	67,853	,284	,912
pre11	36,00	60,632	,759	,900
pre12	35,30	63,484	,557	,906
pre13	35,80	67,853	,284	,912
pre14	36,00	60,632	,759	,900
pre15	35,30	63,484	,557	,906
pre16	35,80	67,853	,284	,912
pre17	36,00	60,632	,759	,900
pre18	35,30	63,484	,557	,906
pre19	36,00	60,632	,759	,900

ANEXO D

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

El propósito de este protocolo es brindar a los y a las participantes en esta investigación, una explicación clara de la naturaleza de la misma, así como del rol que tienen en ella.

La meta de este estudio es realizar un cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento y actitud de las madres sobre las reacciones post vacunales.

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a una entrevista a profundidad lo que le tomará 20 minutos de su tiempo. La conversación será grabada, así el investigador o investigadora podrá transcribir las ideas que usted haya expresado.

Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.

En principio, las entrevistas serán totalmente confidencial, no se le pedirá identificación alguna.

Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo de la investigación, usted es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación en cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera incómoda o incómodo, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de la investigación y abstenerse de responder.

Muchas gracias por su participación.

Yo,.....doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.

He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.

Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física y mental o condición, y raza u origen étnico, puedan ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando.

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí.

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con **Gabriela Luna Jahuira y Grecia Palacios Benites**

Dentro de los beneficios está la contribución al desarrollo de la investigación, la cual servirá de aporte científico a la mejora continua con resultados que podrán extenderse a ámbitos nacionales.

Nombre completo del participante

Firma

Fecha

Nombre del Investigador

Firma

Fecha

ANEXO E: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS REACCIONES POST VACUNALES Y ACTITUD DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER, MARZO 2024.
AUTORAS: LOURDES GABRIELA LUNA JAHUIRA Y GRECIA NICHOLL PALACIOS BENITES

TIT.	PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS GENERAL	METODO	INSTRUMENTO
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS REACCIONES POST VACUNALES Y ACTITUD DE LA MADRES DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER . MARZO 2024	¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y las actitudes de las madres de los niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Max Arias Schreiber , marzo 2024?	GENERAL Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y las actitudes de las madres de los niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Max Arias Schreiber, marzo 2024. ESPECÍFICO - Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y las dimensiones de la actitud como: conductual, cognitiva y afectiva, de las madres. - Evaluar el nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales local y sistemáticas en los niños menores de 2 años - Evaluar la actitud sobre las reacciones post vacunales como: conductual, cognitiva y afectiva, de las madres.	Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre las reacciones post vacunales y las actitudes de las madres de los niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Max Arias Schreiber, marzo 2024.	VARIABLES - Nivel de conocimiento - Actitud TIPO Y DISEÑO - Enfoque cuantitativo - Tipo descriptivo correlacional - De corte transversal, prospectivo, - Diseño no experimental. POBLACIÓN La población de estudio estará conformada por 80 madres de familia de los niños menores de 2 años del Centro de Salud Max Arias Schreiber. MUESTRA - No aplica	Técnica: Encuesta Instrumento: 2 cuestionario