

CAPITULO 1**Glosario de Términos Clave**

Término	Definición
Amígdala	Estructura implicada en el procesamiento emocional y detector del temor que actúa antes de que uno tenga conciencia del miedo. Su volumen crece más en varones durante la infancia.
Área de Broca	Esencial para la producción del habla humana, localizada en el hemisferio izquierdo. Corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann e integra aspectos activadores, semánticos y de planificación motora del lenguaje.
Área de Wernicke	Esencial para la comprensión del habla humana, localizada en la región temporal posterior. Corresponde principalmente al área 22 de Brodmann y se encarga de transformar la información auditiva en significado.
Áreas de Brodmann	División de la corteza cerebral en 47 (o hasta 52) áreas, basada en la citoarquitectura (estructura y disposición de las células). Propuesta por Korbinian Brodmann en 1909, es la clasificación más utilizada para mapear el cerebro.
Cerebelo	Estructura encargada de la fluidez de los movimientos. Es aproximadamente un 8% más grande en los niños que en los adultos.
Conectoma	Término que se refiere al patrón de conexiones de la corteza cerebral, destacando que estas no son simétricas entre los hemisferios.
Corteza Prefrontal	Parte del lóbulo frontal (áreas 9, 10, 11, 46) vinculada a las funciones ejecutivas, planificación, memoria de trabajo, control de la conducta e inhibición.
Cuerpo Calloso	Estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales. El estrés temprano puede reducir el tamaño de sus porciones medias.
Densidad Sináptica	Medida de la cantidad de sinapsis (conexiones neuronales) en una superficie cerebral determinada. A los dos años, es un 50% superior a la de los adultos.
Disartria	Trastorno articulatorio del habla. Puede ser hipocinética (movimientos lentos o limitados) o hipercinética (movimientos involuntarios), asociada a los ganglios de la base, o atáxica (perturbación del ritmo), asociada al cerebelo.

Eje Hipotálamo-Hipófisis-Suprarrenal (HHS)	Sistema neuroendocrino crucial que regula la respuesta al estrés. El hipotálamo envía órdenes a la hipófisis, que a su vez estimula las glándulas suprarrenales para liberar cortisol.
Ganglios de la Base	Estructuras subcorticales que reciben influencias de la corteza y el tálamo, desempeñando un papel en la coordinación de actividades motoras. Su disfunción puede causar disartria.
Hipocampo	Estructura que participa en la consolidación de la memoria, descrita como el "CPU de la computadora". Su volumen aumenta más en las mujeres durante la infancia.
Líquido Cefalorraquídeo (LCR)	Líquido transparente que circula por el sistema nervioso central, actuando como amortiguador para proteger al cerebro contra golpes y mantener el metabolismo.
Lóbulo Frontal	Región del cerebro responsable del campo atencional, el lenguaje, las funciones ejecutivas y las funciones emocionales. Su desarrollo posnatal fue estudiado por Connell.
Mielinización	Proceso por el cual los axones de las neuronas son recubiertos por mielina (sustancia blanca), lo que aumenta la velocidad y precisión de la transmisión de mensajes. La vía piramidal se mieliniza a los dos años.
Poda Sináptica (Pruning)	Proceso de disminución o eliminación de sinapsis que sobran o son ineficientes. Ocurre después de los dos años y permite que el cerebro trabaje con mayor "precisión cualitativa".
Resonancia Magnética Funcional (RMF)	Técnica de neuroimagen que permite observar el cerebro en funcionamiento, mostrando la activación de neuronas en tiempo real al realizar una tarea.
Sinaptogénesis	Proceso de generación de nuevas sinapsis o conexiones neuronales.
Sustancia Blanca	Compuesta por la mielina, un lípido que recubre los axones para dar velocidad y precisión a los mensajes neuronales. Su volumen aumenta entre los 7 y 16 años.
Sustancia Gris	Compuesta por los cuerpos celulares de las neuronas, donde ocurre el procesamiento de la información. Su volumen disminuye entre la infancia y la adolescencia.
Vía Piramidal	Vía nerviosa responsable del movimiento voluntario. Su mielinización a los dos años permite la desaparición de los reflejos y el inicio de la motricidad voluntaria.