

CAPITULO 2

Glosario de Términos

I. Estructuras y Divisiones Cerebrales

Término	Definición basada en las Fuentes
Cerebro Anterior	División del cerebro que se relaciona con la motricidad [1].
Cerebro Posterior	División del cerebro que se relaciona con la sensibilidad [1]. Los lóbulos posteriores (parietales, occipitales y temporales), asociados a las emociones, maduran antes que el lóbulo frontal [1].
Cisura de Rolando	Un surco que históricamente dividía el cerebro anterior del cerebro posterior [1].
Corteza Anterior	La parte de la corteza relacionada con lo motor [2].
Corteza Posterior	La parte de la corteza relacionada con lo sensitivo [2].
Cuerpo caloso	Elemento que une los hemisferios cerebrales [3]. Al "virilizarse" (proceso que ocurre alrededor de los 8 años), permite que los dos hemisferios trabajen de manera interactiva [4].
Lóbulos Frontales (Logros frontales)	Juegan un papel fundamental en el procedimiento de respuestas emocionales [5]. Su rol central es establecer objetivos y crear planes de acción [6].
Lóbulos Parietales	Contienen los sistemas sensitivos y sensoriales [7]. Son funcionales antes del nacimiento [7] y su estimulación, como la natación, se centra en la cosa táctil [8].
Lóbulos Temporales	Juegan un papel importante en la percepción de las emociones [9]. Contienen una región anterior que entiende y recuerda el carácter de las expresiones faciales, y una región posterior que reconoce la expresión facial [10].
Órbita Frontal Derecho (en hombres)	El área del cerebro considerada el centro emocional, utilizada por los hombres al actuar o tomar decisiones [11].
Órbita Frontal Izquierdo (en mujeres)	El área del cerebro considerada la racional, utilizada por las mujeres al actuar o tomar decisiones [11].
Pálamo (Tálamo)	Órgano al que van todos los órganos sensoriales, excepto el olfato [12]. Cuando los estímulos llegan a este punto, se tienen sensaciones; cuando conecta con la corteza, se transforma en senso perceptual [13].
Piel	Algunas teorías sugieren que es el primer cerebro que se desarrolla en el ser humano [14, 15].

II. Funciones Emocionales y Maduración

Término	Definición basada en las Fuentes
Depresión	En niños y adultos, puede ser resultado de una hipoactivación de las regiones frontales o de una hiperactivación del hemisferio derecho [3].
Efecto de Modulación	Función que ejerce el hemisferio derecho, controlando al hemisferio izquierdo a medida que madura [5]. El hemisferio derecho le "baja o le sube el volumen" al izquierdo [3].
Funciones Ejecutivas	Procesos cognitivos, emocionales y de regulación de respuestas conductuales que coordinan capacidades frente a las diferentes demandas [6].
Hiperactivación (Hemisferio Derecho)	Una función exagerada del hemisferio derecho que limita la función del izquierdo, pudiendo causar depresión [3, 16].
Hipoactivación (Regiones Frontales)	Baja función de las regiones frontales que puede resultar en depresión [3].
Respuesta a Lesión (Hemisferio Derecho)	Reacciones emocionales inapropiadas, que pueden ser indiferencia o euforia [5].
Respuesta a Lesión (Hemisferio Izquierdo)	Provoca depresión y reacciones catastróficas [5].
Virilización del Cuerpo Calloso	Proceso de maduración de las conexiones del cuerpo calloso que permite la interacción de ambos hemisferios, lo cual ocurre a los 8 años [4].

III. Procesamiento Sensorial y Perceptivo

Término	Definición basada en las Fuentes
Aferencias / Eferencias	Componentes de la organización cortical; la funcionalidad del cerebro se define por recibir (aferencias), pensar y responder (eferencias) [17].
Áreas de Asociación (Terciarias)	Comprenden toda la corteza no especializada en función sensitiva o motora [18]. Son las que conectan todo [19].
Áreas Primarias (Corteza)	Los principales sistemas sensitivos o envíos de proyecciones motoras directas a los músculos (movimiento) [2, 19].
Áreas Secundarias (Corteza)	Áreas adyacentes a las primarias [2]. Participan en la elaboración de la información recibida de las áreas primarias o en el envío de órdenes (interconexión, como el audio con la vista) [18, 19].
Olfato	Sentido que no va al pálamo (tálamo), sino que va directamente a la corteza [12]. Por esta razón, puede tener un efecto inmediato de relajación (lavanda) o de contracción muscular (amoníaco) [12, 13].
Sensaciones	Lo que se tiene cuando los estímulos llegan al pálamo (tálamo) [13].

Sensitivo / Sensorial	Sistemas contenidos en los lóbulos parietales [7]. La corteza posterior es sensitiva [2].
Senso Perceptivo	Proceso mediante el cual se recibe información de estímulos sensoriales, la cual es codificada y procesada en el cerebro para generar una experiencia perceptiva [12].
Senso Perceptual	Lo que resulta cuando el pálamo (tálamo) conecta con la corteza [13].
Sensorio-Motor	El primer periodo del desarrollo de la inteligencia, según Piaget [1, 15].
Somato	Significa "cuerpo" [14].
Somatoestesia	Las sensaciones corporales [20]. Los sentidos somatoestésicos son los primeros en desarrollarse desde un punto de vista embrionario [14, 15]. A través de ella se desarrolla la somatognosia [20].
Somatognosia	Conocimiento del cuerpo [20].

IV. Autores y Conceptos de Comportamiento

Término	Definición basada en las Fuentes
Demorar la Recompensa	Habilidad estudiada por Walter Mischel, donde se compara obtener una recompensa inmediata (un caramelo) o esperar para recibir una mayor (dos caramelos) [21]. Esta habilidad comienza a los cuatro años y favorece la habilidad social en la adolescencia [21].
Masaje Hindú / Yantala	Masajes que activan el campo emocional, recomendados para el primer año de vida para que los niños crezcan con un comportamiento más regulado y tranquilo [8].
Piaget	Autor que señaló que el periodo sensorio-motor es el primer periodo del desarrollo de la inteligencia [1, 15].
Walter Mischel	Psicólogo que estudió la habilidad de demorar la recompensa [21].