

CHRIS BUMSTEAD (CBUM) - ULTIMATE CUTTING REHBERİ

Bu doküman, Chris Bumstead'in profesyonel vücut geliştirme kariyerinde Olympia formuna ulaşırken uyguladığı definisyon, kalori, makro, kardiyo ve toparlanma protokollerinin eksiksiz dökümüdür.

1. DEFINİSYONA GİRİŞ ZAMANI VE SÜRESİ

- Giriş Kriteri: Karın kasları (abs) belirginliğini kaybettiğinde bulk plato yapmış demektir. İnsülin duyarlılığını, sindirimi ve metabolizmayı sıfırlamak için cut başlatılmalıdır.
- Süre Sınırları: %10 vücut yağının altındaki agresif durumlar hormonal dengeyi bozabileceğinden 3-4 aydan uzun tutulmamalıdır. Ancak refeed günleri eklenerek, enerji korunarak ve güç düşürülmeden yapılan ılımlı definisyonlar kesintisiz sürdürülebilir.

2. KALORİ VE MAKROLARIN BELİRLENMESİ

- Baz Kaloriyi Bulma: En az 1-2 hafta boyunca yenen her lokma (soslar, içecekler, sebzeler dahil) tartılarak kilonun sabit kaldığı 'temel kalori' (baseline) bulunur.
- Protein Kuralı: Yağsız vücut kütesinin libresi (lbs) başına 1.0 - 1.5 gram protein. Kas kaybını önlemek ve sindirimde termik etkiyi maksimize etmek için günlük 300-350g seviyelerine çıkılabilir.
- Karb / Yağ Dengesi: Kalan kaloriler başlangıçta %70 Karbonhidrat / %30 Yağ olarak bölünür.
- Definisyonu Başlatma: Baz kaloriden sadece 200-300 kalori düşülür ve bu açık tamamen karbonhidrattan kesilir. Başlangıçta agresif kalori kısılmaz.

3. ÖĞÜN DÜZENİ VE BESİN KALİTESİ

- Öğün Planı (Meal Plan) Tercihi: 'If It Fits Your Macros' (IIFYM) sürekli karar verme yorgunluğuna (decision fatigue) ve kaçamaklara yol açar. En iyisi her gün aynı temiz öğünleri yemektir.
- Yalnızca 'Whole Foods': İşlenmiş gıdalar inflamasyonu ve kortizölü artırır, uykuyu bozar ve yağ yakımını kilitler. Kalori kaloriye eşit olsa bile hormon dengesi için temiz gıda şarttır.
- Öğün Frekansı: Kalori aynı kalsa bile 3 büyük öğün yerine 5-6 küçük öğüne bölmek sindirimi rahatlatır, enerjiyi yükseltir ve metabolizmayı canlı tutar.

4. KİLO KAYBI HIZI, PLATOLAR VE REFEED

- İdeal Düşüş Hızı: Ayda ortalama 3-4 lbs (haftada 1-2 lbs'den az). CBum 14 haftalık Olympia hazırlığında toplam 25 lbs vermektedir; acele etmek kas kaybına neden olur.
- Refeed Protokolü (Cheat Meal Yerine): Düşük kalorige tıkanan metabolizmayı uyarmak için 'çöp gıda' yerine temiz karbonhidrat patlaması yapılır (örneğin pirinci 100g'dan 300g'a çıkarmak ve avokado eklemek). Bu öğün mutlaka ağır bacak antrenmanından önceki geceye denk getirilir.
- Karb Döngüsü (Carb Cycling): Sürekli açlık modunda kalan vücudun metabolik hızını canlandırmak ve ağır antrenmanları beslemek için yüksek karb/düşük karb günleri dönüşümlü uygulanır.

5. SOS KULLANIMI VE GİZLİ KALORİLER

- Güvenli Soslar: Düşük şekerli Whole Foods Bal Hardalı, Sriracha ve Hindistan Cevizi Aminoları (Coconut Aminos).

CBum Notu / Prensip: Diyete soslarla başladıysan süreç boyunca sabit tut; eğer başta yoksa yarışa/hedefe haftalar kala aniden ekleme. Badem ezmesi veya sosları mutlaka hassas tartıyla tart, kaşık hesabı aldatır.

6. CUT DÖNEMİ TAKVİYE PROTOKOLÜ

- Termojenik yağ yakıcılar yerine organ sağlığı, kas koruma ve toparlanmaya odaklanılır.
- Multivitamin & Omega-3: Kısıtlı kalorige mikronutrient eksikliğini ve sistemik inflamasyonu önlemek için.
- Whey İzole: Düşük kalorige sindirimi kolay, en saf protein kaynağı. Dışarı çıkarken tokluk sağlamak için acil durum aracı olarak kullanılabilir.
- Amino Asitler (EAA/BCAA): Öğün aralarında kas yıkımını önlemek için.
- Zihinsel Odak & Nootropikler: Düşük enerjide beyin sisi ve odak kaybını çözmek için Alpha-GPC, Cognizin, L-Tirozin.

7. KARDİYO METODOLOJİSİ: LISS VS HIIT

- Minimum Effective Dose: Kası korumak için gereken en az kardiyo yapılmalıdır. Başlangıç: Haftada 5 gün, 20 dakika.
- Zamanlama Kuralı: Kardiyo asla ağırlık antrenmanından hemen önce yapılmaz; enerjiyi çalmaması için sabah aç karnına veya antrenmandan hemen sonraya konur.

- LISS (Eğimli Yürüyüş): Maksimum kas koruması ve düşük eklem stresi için eğimli koşu bandında nabız ~120 bpm hedeflenir.
- Adım Sayısı Alternatifi: Ek kardiyo yapmadan günlük adımı 5k -> 7k -> 10k seviyelerine çıkarmak eklem yormadan kalori açığı yaratır.

8. ANTRENMAN VE BESİN ZAMANLAMASI

- Ağırlıkları Düşürmeme Kuralı: 'Definisyon yapıyorum, ağırlığı düşürüp 20 tekrar yapayım' mantığı yanlıştır; kası tutan şey mekanik gerilimdir. Güç tükenene kadar ağırlıklar korunmalıdır.
- Karb Zamanlaması: Günlük 50g gibi aşırı düşük karbonhidrat kalsa bile bunun 20g'ı antrenman öncesine, 30g'ı antrenman sonrasına yerleştirilmelidir.
- Carb Backloading: Gece gelen açlık krizleri uykuyu bozuyorsa, karbonhidratın büyük kısmı akşam öğününe saklanarak kortizol düşürülür.

9. İŞTAH VE SİNDİRİM YÖNETİMİ

- Yemek Sonrası 10 Dakika Yürüyüş: Her ana öğünden sonra 10 dakika hafif yürümek kan şekeri dengeler (Metformin benzeri etki), kortizöl düşürür ve sindirimi hızlandırır.
- Bilinçli Çiğneme: Telefon başında hızlıca yutulan yemekler sindirimi bozar, gaz yapar ve kortizöl fırlatır. Sindirim enzimleri ve Betaine HCl desteği kullanılabilir.
- Krizlerin Sebebi: Kronik açlık krizleri genellikle yüksek kortizöl, ekran ışığı ve uyku eksikliğinden kaynaklanır.