

METSTOP

Metarhizium spp.

$5,0 \times 10^{10}$ – $1,0 \times 10^{11}$ esporas por envase

**BASE BIOLÓGICA**

Hongo

FORMULACIÓN

Polvo

APLICACIÓN

suelo · foliar

REGISTRO

Agrocalidad · Ecuador

CERTIFICACIÓN

Kiwa BCS Öko-Garantie

COMPOSICIÓN

Producto sólido de origen biológico, compuesto de varias cepas de *Metarhizium spp.* El producto tiene una concentración de $5,0 \times 10^{10}$ a $1,0 \times 10^{11}$ esporas por envase.

DOSIS Y FRECUENCIA

- 1 a 2 frascos por hectárea.
- La frecuencia de aplicación va en función de la incidencia de larvas o ninfas de insectos y ácaros.

MECANISMO DE ACCIÓN

Las cepas de Metstop actúan por contacto con larvas y adultos de insectos plaga y ácaros, realizando el control mediante la producción de toxinas, ácidos orgánicos y enzimas ocasionando la muerte del insecto.

FORMA DE USO

- Para las aplicaciones al suelo, utilizar sistema de riego o drench.
- Para las aplicaciones en la parte aérea utilizar un equipo de fumigación que permita obtener una cobertura completa de la planta.
- Es obligatorio el uso de dispersantes para mejorar la cobertura del producto.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- No aplicar fungicidas al menos 5 días antes y 5 días después de la aplicación.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA, LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 3 meses.