

BALUS

Streptomyces spp.

1×10⁹ ufc/L



COMPOSICIÓN

Producto de origen biológico, compuesto de cepas de *Streptomyces spp.* El producto tiene una concentración de 1×10⁹ unidades formadoras de colonias por litro (ufc/L).

DOSIS Y FRECUENCIA

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Crucíferas (brócoli, coliflor, col, romanesco)	1,5 litros/Ha	Crecimiento vegetativo — semana 1, 3 y 5 de la siembra	Aplicación edáfica o foliar
Rosáceas (rosa, mora, fresa)	1 litro/Ha	Producción — cada semana	Aplicación edáfica o foliar
Musáceas (banano, plátano)	1 litro/Ha	Aplicación abierta — cada 3 meses	Aplicación edáfica o foliar

MECANISMO DE ACCIÓN

Los metabolitos secundarios producidos por *Streptomyces spp.* actúan hidrolizando fosfolípidos de la membrana celular de patógenos, de esta manera se evita la colonización y por ende la esporulación. Al entrar en contacto con el patógeno promueve el antagonismo, brindando a la planta protección frente a enfermedades.

FORMA DE USO

- Agítese antes de usar.
- Para las aplicaciones al suelo, utilizar sistema de riego o drench.
- Usar la cantidad de agua necesaria para que el producto penetre en el suelo y llegue a la rizósfera superior de las plantas.
- Para las aplicaciones en la parte aérea utilizar un equipo de fumigación que permita obtener una cobertura completa de la planta.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 3 meses.