

BIOBIK

Paecilomyces sp. · *Lecanicillium lecanii* · *Metarhizium anisopliae* · *Beauveria sp.*

$1,5 \times 10^{11}$ – $4,5 \times 10^{11}$ esporas por envase (ufc/L)



COMPOSICIÓN

- Producto sólido de origen biológico, compuesto de varias especies de hongos entomopatógenos pertenecientes a los géneros *Paecilomyces spp.*, *Lecanicillium lecanii*, *Metarhizium anisopliae* y *Beauveria sp.*
- El producto tiene una concentración de $1,5 \times 10^{11}$ a $4,5 \times 10^{11}$ esporas por envase (ufc/L).

DOSIS Y FRECUENCIA

- 1 a 2 envases por hectárea.
- La frecuencia de aplicación va en función de la incidencia de la plaga.

MECANISMO DE ACCIÓN

Los microorganismos de BIO-BIK se adhieren a los insectos y huevos de insectos plaga, penetran la cutícula con ayuda de enzimas que descomponen el tejido e hidrolizan la capa exterior. De esta manera, facilitan la entrada de la espora, provocando la infección, deshidratación y muerte de los mismos.

FORMA DE USO

- Para las aplicaciones al suelo, utilizar sistema de riego o drench.
- Para las aplicaciones en la parte aérea utilizar un equipo de fumigación que permita obtener una cobertura completa de la planta.
- Es obligatorio el uso de dispersantes para mejorar la cobertura del producto.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- No aplicar fungicidas al menos 5 días antes y 5 días después de la aplicación.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 3 meses.