

TRICOMIX / TRICOMIX PM

Trichoderma viride · *Trichoderma harzianum*

5×10^{10} – 1×10^{11} esporas por envase



Presentación líquida

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN

Producto líquido de origen biológico, compuesto por las especies de *Trichoderma viride* y *Trichoderma harzianum*. El producto tiene una concentración de 5×10^{10} a 1×10^{11} esporas por envase.

DOSIS Y FRECUENCIA

CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA
Rosas y flores de verano	1–2 lt/Ha	Quincenal
Cultivos hortícolas	1 lt/Ha	Quincenal o mensual
Brócoli	1–3 lt/Ha	Quincenal, semana 1, 3 y 5
Papa	1–2 lt/Ha	Después de cada fertilización
Fresa y mora	1–3 lt/Ha	Quincenal o mensual

* Se recomienda aplicar el producto para optimizar fertilizaciones edáficas; o después de aplicaciones de plaguicidas químicos, para recuperar y repoblar la diversidad microbiana del suelo.

MECANISMO DE ACCIÓN

Trichoderma viride y *Trichoderma harzianum* son hongos del suelo que poseen características únicas para ser utilizados como un bioproducto: producen tanto ácidos orgánicos que permiten solubilizar nutrientes en la solución del suelo, como, enzimas extracelulares que transforman la materia orgánica. Además, debido a su alta velocidad de crecimiento, pueden colonizar la rizósfera, protegiendo de manera indirecta a la planta del ataque de varios hongos fitopatógenos. El resultado final es una rizósfera sana y abundante que permite el crecimiento óptimo de la planta.

FORMA DE USO

- Agítese antes de usar.
- Usar la cantidad de agua necesaria para que el producto penetre en el suelo y llegue a la rizósfera superior de las plantas.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- No es compatible con ningún fungicida.

ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 3 meses.

Presentación en polvo mojable (PM)

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN

Producto sólido de origen biológico, compuesto por las especies de *Trichoderma viride* y *Trichoderma harzianum*. El producto tiene una concentración de 5×10^{10} a 1×10^{11} esporas por envase.

DOSIS Y FRECUENCIA

CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA
Rosas y flores de verano	1–2 frascos/Ha	Quincenal
Cultivos hortícolas	1 frasco/Ha	Quincenal o mensual
Brócoli	1–3 frascos/Ha	Quincenal, semana 1, 3 y 5
Papa	1–2 frascos/Ha	Después de cada fertilización
Fresa y mora	1–3 frascos/Ha	Quincenal o mensual

* Se recomienda aplicar el producto para optimizar fertilizaciones edáficas; o después de aplicaciones de plaguicidas químicos, para recuperar y repoblar la diversidad microbiana del suelo.

MECANISMO DE ACCIÓN

Trichoderma viride y *Trichoderma harzianum* son hongos del suelo que poseen características únicas para ser utilizados como un bioproducto: producen tanto ácidos orgánicos que permiten solubilizar nutrientes en la solución del suelo, como, enzimas extracelulares que transforman la materia orgánica. Además, debido a su alta velocidad de crecimiento, pueden colonizar la rizósfera, protegiendo de manera indirecta a la planta del ataque de varios hongos fitopatógenos. El resultado final es una rizósfera sana y abundante que permite el crecimiento óptimo de la planta.

FORMA DE USO

- Usar la cantidad de agua necesaria para que las células y/o esporas lleguen a la rizósfera de la planta. Se debe aplicar por sistema de riego o drench.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- No es compatible con ningún fungicida.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 6 meses.