

BIOBIK

BIOINSECTICIDA

Paecilomyces sp. · *Lecanicillium lecanii* · *Metarhizium anisopliae***BASE BIOLÓGICA**
Hongo**FORMULACIÓN**
Polvo**APLICACIÓN**
suelo · foliar**REGISTRO**
Agrocalidad · Ecuador**CERTIFICACIÓN**
Kiwa BCS Öko-Garantie

COMPOSICIÓN

- Producto sólido de origen biológico, compuesto de varias especies de hongos entomopatógenos pertenecientes a los géneros *Paecilomyces sp.*, *Lecanicillium lecanii* y *Metarhizium anisopliae*.
- El producto tiene una concentración de $1,5 \times 10^8$ a 3×10^8 esporas por envase (ufc/L).

DOSIS Y FRECUENCIA

- 1 a 2 envases por hectárea.
- La frecuencia de aplicación va en función de la incidencia de la plaga.

MECANISMO DE ACCIÓN

Los microorganismos de BIO-BIK se adhieren a los insectos, penetran la cutícula con ayuda de enzimas, descomponen el tejido y facilitan la entrada de la espóra, provocando la infección y muerte del insecto plaga.

FORMA DE USO

- Para las aplicaciones al suelo, utilizar sistema de riego o drench.
- Para las aplicaciones en la parte aérea utilizar un equipo de fumigación que permita obtener una cobertura completa de la planta.
- Es obligatorio el uso de dispersantes para mejorar la cobertura del producto.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- No aplicar fungicidas al menos 5 días antes y 5 días después de la aplicación.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 3 meses.