

# BIORIZ / BIORIZ PM

BIOESTIMULANTE RADICULAR

*Paecilomyces spp.* $5 \times 10^{10}$  –  $1,2 \times 10^{11}$  esporas por envase**BASE BIOLÓGICA**

Hongo

**FORMULACIÓN**

Ambos

**APLICACIÓN**

suelo

**REGISTRO**

Agrocalidad · Ecuador

**CERTIFICACIÓN**

Kiwa BCS Öko-Garantie

## Presentación líquida

**COMPOSICIÓN**

Producto líquido de origen biológico, compuesto de varias cepas de *Paecilomyces*, productoras de compuestos que estimulan el crecimiento radicular de las plantas. El producto tiene una concentración de  $5 \times 10^{10}$  a  $1,2 \times 10^{11}$  esporas por envase.

**MECANISMO DE ACCIÓN**

*Paecilomyces* produce enzimas extracelulares que transforman la materia orgánica del suelo, movilizandolos nutrientes que provocan un incremento en la masa radicular, lo que se traduce en una mayor absorción de nutrientes para la planta.

**FORMA DE USO**

- Agítese antes de usar.
- Usar la cantidad de agua necesaria para que el producto penetre en el suelo y llegue a la rizósfera superior de las plantas.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- No es compatible con ningún fungicida.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 3 meses.

## Presentación en polvo mojable (PM)

**COMPOSICIÓN**

---

## DOSIS Y FRECUENCIA SEGÚN LA REGIÓN

- Costa
- Sierra

---

## MECANISMOS DE ACCIÓN

Paecilomyces produce enzimas extracelulares que transforman la materia orgánica del suelo, movilizand o nutrientes que provocan un incremento en la masa radicular, lo que se traduce en una mayor absorción de nutrientes para la planta.

---

## FORMAS DE USO

- Usar la cantidad de agua necesaria para que las células y/o esporas lleguen a la rizósfera de la planta. Se debe aplicar por sistema de riego o drench.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- No es compatible con ningún fungicida.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

---

## ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 6 meses.