

CRIBAC

BIOINSECTICIDA

Bacillus thuringiensis (cepas nativas) 1×10^{10} ufc/L**BASE BIOLÓGICA**

Bacteria

FORMULACIÓN

Líquido

APLICACIÓN

foliar

REGISTRO

Agrocalidad · Ecuador

CERTIFICACIÓN

Kiwa BCS Öko-Garantie

COMPOSICIÓN

Bacterias nativas obtenidas del suelo pertenecientes a la bacteria *Bacillus thuringiensis*. El producto tiene una concentración de 1×10^{10} unidades formadoras de colonias por litro (ufc/L).

DOSIS Y FRECUENCIA

- 2 a 4 litros por hectárea.
- La frecuencia de aplicación va en función de la incidencia de la plaga ó el tipo de cultivo.

MECANISMO DE ACCIÓN

Los microorganismos de CRIBAC pertenecen a varias razas de *Bacillus thuringiensis*, eficientes en el biocontrol de diferentes grupos de insectos y ácaros debido a la producción de metabolitos que al ser ingeridos por las plagas provocan su muerte. Las bacterias de CRIBAC no necesitan activación previa y pueden ser usados directamente en campo.

FORMA DE USO

- Agítese antes de usar.
- Usar la cantidad de agua necesaria para que el producto cubra eficientemente las superficies de hojas, tallos y flores y cualquier otra parte de la planta, que pueda servir como medio de consumo de las plagas.
- Es obligatorio el uso de dispersantes para mejorar la cobertura del producto.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 3 meses.