

Aturan Penjumlahan Pembahasan Soal

defantri.com
13 Apr 2026

Matematika SD

Matematika SMP

Matematika SMA

Bank Soal



The good student, kita belajar matematika tentang Kaidah Pencacahan bagian Aturan Penjumlahan dan Aturan Perkalian atau yang sering juga disebut dengan aturan pengisian tempat yang tersedia. Catatan ini menjadi dasar kita untuk memahami kaidah pencacahan bagian permutasi atau kombinasi.

KAIDAH PENCACAHAN

Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyak kemungkinan atau susunan suatu kejadian atau objek tanpa harus merinci setiap kemungkinan satu per satu. Dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah.

Terdapat beberapa aturan dalam mencacah, yakni, aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan permutasi dan aturan kombinasi. Untuk diskusi pada catatan ini kita batasi pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian (aturan pengisian tempat yang tersedia).

ATURAN PENJUMLAHAN

Apabila kegiatan 1, kegiatan 2, sampai kegiatan ke- n adalah kegiatan-kegiatan yang saling lepas atau semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan bersamaan, dan misalkan kegiatan 1 terjadi dengan n_1 cara, kegiatan 2 terjadi dengan n_2 dan kegiatan ke- n terjadi dengan n_k cara, maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak $n_1 + n_2 + \dots + n_k$.


Anggiat memiliki 4 sepeda motor, 2 mobil, dan 3 sepeda. Berapa cara Anggiat dapat ke kantor dengan kendaraannya?

Banyak kemungkinan cara Anggiat dapat ke kantor dengan kendaraannya adalah $4 + 2 + 3 = 9$ cara.

ATURAN PERKALIAN

Apabila kegiatan 1, kegiatan 2, sampai kegiatan ke- n adalah kegiatan-kegiatan yang tidak saling lepas atau semua kegiatan tersebut dapat dilakukan bersamaan, dan misalkan kegiatan 1 terjadi dengan n_1 cara, kegiatan 2 terjadi dengan n_2 dan kegiatan ke- n terjadi dengan n_k cara, maka banyak kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.

Like



Buku Sekolah
33 Soal TKA Bahasa Indonesia (Wajib)
SMA/SMK Tahun 2025 dan Kunci



Jel B)



Soal TKA Matematika
SAINTEK UTBK-SBMPTN
2019 dan Pembahasan (46-90)



25 Paket Soal TKA Bahasa
Inggris (Wajib) SMA/SMK
2025 + Kunci Jawaban
(Model B)



25 Soal TKA Matematika
Wajib SMA Tahun 2025 +
Kunci Jawaban Lengkap (B)



25 Soal TKA Fisika
SMA/SMK Tahun 2025 dan
Kunci Jawaban (Model B)



Kumpulan Soal KSM/OMI
Madrasah Tsanawiyah
(MTs) Terlengkap



Kumpulan Soal OMI/KSM
Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Terlengkap

Anggiat memiliki 4 sepeda motor, 2 mobil, dan 3 sepeda. Jika ke kantor Anggiat perlu menggunakan mobil, sepeda motor, dan sepeda. Berapa cara yang dapat dipilih Anggiat untuk pergi ke kantornya. Banyak kemungkinan cara Anggiat pergi ke kantor dengan menggunakan ketiga kendaraannya adalah $4 \times 2 \times 3 = 24$ cara.

Untuk menunjukkan semua hasil dari aturan perkalian dapat disajikan dalam tiga cara, yaitu:

- Menggunakan Tabel,
- Menggunakan Diagram Pohon atau Diagram Cabang,
- Menggunakan Pasangan Terurut.

• • •

DEFINISI FAKTORIAL

Faktorial dilambangkan dengan tanda seru "!" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1808 oleh Christian Kramo (1760-1826) di Strasbourg, Prancis. Beliau mengunakan simbol ini untuk menghindari kesulitan pencetakan yang disebabkan simbol yang digunakan sebelumnya.

$n!$ dibaca " n faktorial" didefinisikan:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 1$$

dimana n adalah bilangan asli dan $0! = 1$.

Sebagai contoh cara menyajikan hasil aturan perkalian di atas dapat kita lihat pada contoh-contoh soal berikut ini:

1. Contoh Soal Aturan Penjumlahan-Perkalian

Seseorang mempunyai tiga pasang sepatu dan lima pasang kaus kaki. Tentukanlah banyaknya cara orang tersebut dalam mengenakan sepatu dan kaus kaki adalah...

Jika dengan menggunakan aturan perkalian:

Sepatu	Kaus kaki
3	5

Banyak kemungkinan pasangan sepatu dan kaus kaki adalah $3 \times 5 = 15$

Banyak pasangan sepatu dan kaus kaki dengan Menggunakan Tabel. Jika sepatu kita misalkan S_1, S_2, S_3 dan kaus kaki K_1, K_2, K_3, K_4, K_5 maka banyak pasangan sepatu dan kaus kaki adalah:

K	K₁	K₂	K₃	K₄	K₅
S					



WhatsApp

Telegram



S₂	(S ₂ K ₁)	(S ₂ K ₂)	(S ₂ K ₃)	(S ₂ K ₄)	(S ₂ K ₅)
S₃	(S ₃ K ₁)	(S ₃ K ₂)	(S ₃ K ₃)	(S ₃ K ₄)	(S ₃ K ₅)

Banyak pasangan sepatu dan kaus kaki yang mungkin dengan Menggunakan Pasangan Terurut. Jika

sepatu kita misalkan $S : S_1, S_2, S_3$ dan kaus kaki $K : K_1, K_2, K_3, K_4, K_5$ maka banyak pasangan sepatu dan kaus kaki adalah $S \times K$ yaitu $\{(S_1, K_1), (S_1, K_2), (S_1, K_3), (S_1, K_4), (S_1, K_5), (S_2, K_1), (S_2, K_2), (S_2, K_3), (S_2, K_4), (S_2, K_5), (S_3, K_1), (S_3, K_2), (S_3, K_3), (S_3, K_4), (S_3, K_5)\}$.

2. Contoh Soal Aturan Penjumlahan-Perkalian

Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS di suatu SMA, sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon bendahara, serta Yuli dan Susi adalah calon sekretaris. Tentukanlah banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS di SMA tersebut...


Dengan menggunakan aturan perkalian maka kita peroleh:

Ketua	Bendahara	sekretaris
2	3	2

Banyak kemungkinan susunan pengurus adalah $2 \times 3 \times 2 = 12$

Susunan pengurus OSIS yang mungkin kita sajikan dengan **Menggunakan Diagram Pohon atau Diagram**


Cabang. Jika calon ketua kita misalkan A, B, calon bendahara kita misalkan M, C, G dan calon sekretaris kita misalkan Y, S maka banyak susunan pengurus OSIS adalah:



3. Contoh Soal Aturan Penjumlahan-Perkalian

Terdapat empat jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q , tiga jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R serta tiga jalan dari kota R ke kota S . Tentukanlah banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S

Jika kita gambarkan jalan yang menghubungkan kota P, Q, R, S dapat seperti berikut ini:




$P \text{ ke } Q$	$Q \text{ ke } R$	$R \text{ ke } S$
4	3	3

Banyak kemungkinan rute dari P ke S yang menjadi pilihan adalah $4 \times 3 \times 3 = 36$

4. Contoh Soal Aturan Penjumlahan-Perkalian

Gambar di bawah ini adalah peta rute perjalanan ditiga kota A, B , dan C . Tentukanlah banyaknya rute perjalanan dari kota A ke kota C .



Banyak rute dari kota A ke kota C ada dua pilihan jalan yaitu:

- Pertama, dari A langsung ke B , banyak kemungkinan rute yang menjadi pilihan adalah 3
- Kedua, dari A ke B melalui C

$A \text{ ke } C$	$C \text{ ke } B$
3	2

Banyak kemungkinan rute dari A ke B melalui C yang menjadi pilihan adalah $3 \times 2 = 6$

- Banyak pilihan kemungkinan pertama tidak mempengaruhi banyak pilihan kemungkinan kedua atau dua kejadian yang saling lepas (aturan penjumlahan), sehingga banyak kemungkinan pilihan rute keseluruhan adalah jumlah banyak kemungkinan pertama dan kedua yaitu $6 + 3 = 9$

5. Contoh Soal Aturan Penjumlahan-Perkalian

Tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas tiga angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7 jika:

- angka-angkanya tidak boleh muncul berulang
- angka-angkanya boleh muncul berulang

(a). Banyak bilangan yang terdiri atas tiga angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7 dengan angka-angkanya tidak boleh muncul berulang.

Ratusan	Puluhan	Satuan
5	4	3
(3, 4, 5, 6, 7)	(3, 4, 5, 6, 7)	(3, 4, 5, 6, 7)

- Banyak angka yang mungkin jadi ratusan ada sebanyak 5 angka yaitu (3, 4, 5, 6, 7).
- Banyak angka yang mungkin jadi puluhan ada sebanyak 5 angka yaitu (3, 4, 5, 6, 7), tetapi satu angka sudah dipakai untuk jadi ratusan sehingga angka yang mungkin untuk jadi puluhan hanya ada 4.
- Banyak angka yang mungkin jadi satuan ada sebanyak 5 angka yaitu (3, 4, 5, 6, 7), tetapi dua angka sudah dipakai untuk jadi ratusan dan puluhan sehingga angka yang mungkin untuk jadi satuan hanya ada 3.
- Total banyak bilangan yang mungkin yang terdiri atas tiga angka dan tidak ada angka berulang adalah $5 \times 4 \times 3 = 60$ bilangan.

(b). Banyak bilangan yang terdiri atas tiga angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7 dengan angka-angkanya boleh muncul berulang.

Ratusan	Puluhan	Satuan
5	5	5
(3, 4, 5, 6, 7)	(3, 4, 5, 6, 7)	(3, 4, 5, 6, 7)

- Banyak angka yang mungkin jadi ratusan ada sebanyak 5 angka yaitu (3, 4, 5, 6, 7).
- Banyak angka yang mungkin jadi puluhan ada sebanyak 5 angka yaitu (3, 4, 5, 6, 7).
- Banyak angka yang mungkin jadi satuan ada sebanyak 5 angka yaitu (3, 4, 5, 6, 7).
- Total banyak bilangan yang mungkin yang terdiri atas tiga angka dan angka boleh berulang adalah $5 \times 5 \times 5 = 125$ bilangan.

6. Contoh Soal Aturan Penjumlahan-Perkalian

Tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas tiga angka berlainan yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6 jika bilangan itu nilainya harus:

- Genap
- Ganjil

(a). Banyak bilangan genap yang terdiri atas tiga angka yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6 dengan angka-angkanya tidak boleh muncul berulang.

Ratusan	Puluhan	Satuan
3	4	3
(2, 3, 4, 5, 6)	(2, 3, 4, 5, 6)	(2, 4, 6)

- Sebuah bilangan kita ketahui merupakan bilangan genap, dapat kita perhatikan satuan bilangan tersebut. Sehingga untuk soal seperti ini kita mulai bekerja dari satuan. Banyak angka yang mungkin jadi satuan agar bilangan itu genap ada sebanyak 3 angka yaitu (2, 4, 6).
- Banyak angka yang mungkin jadi puluhan ada sebanyak 5 angka yaitu (2, 3, 4, 5, 6), tetapi satu angka sudah dipakai untuk jadi satuan sehingga angka yang mungkin untuk jadi puluhan hanya ada 4.

- Banyak angka yang mungkin jadi ratusan ada sebanyak 5 angka yaitu (2, 3, 4, 5, 6), tetapi dua angka sudah dipakai untuk jadi satuan dan puluhan sehingga angka yang mungkin untuk jadi ratusan hanya ada 3.
- Total banyak bilangan yang mungkin yang terdiri atas tiga angka dan tidak ada angka berulang adalah $3 \times 4 \times 3 = 36$ bilangan.

(b). Banyak bilangan ganjil yang terdiri atas tiga angka yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6 dengan angka-angkanya tidak boleh muncul berulang.

Ratusan	Puluhan	Satuan
3	4	2
(2, 3, 4, 5, 6)	(2, 3, 4, 5, 6)	(3, 5)

- Sebuah bilangan kita ketahui merupakan bilangan ganjil, dapat kita perhatikan satuan bilangan tersebut. Sehingga untuk soal seperti ini kita mulai bekerja dari satuan. Banyak angka yang mungkin jadi satuan agar bilangan itu ganjil ada sebanyak 2 angka yaitu (3, 5).
- Banyak angka yang mungkin jadi puluhan ada sebanyak 5 angka yaitu (2, 3, 4, 5, 6), tetapi satu angka sudah dipakai untuk jadi satuan sehingga angka yang mungkin untuk jadi puluhan hanya ada 4.
- Banyak angka yang mungkin jadi ratusan ada sebanyak 5 angka yaitu (2, 3, 4, 5, 6), tetapi dua angka sudah dipakai untuk jadi satuan dan puluhan sehingga angka yang mungkin untuk jadi ratusan hanya ada 3.
- Total banyak bilangan yang mungkin yang terdiri atas tiga angka dan tidak ada angka berulang adalah $3 \times 4 \times 2 = 24$ bilangan.

7. Contoh Soal Aturan Penjumlahan-Perkalian

Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika bilangan itu nilainya:

- (a). lebih dari 2.000
(b). kurang dari 3.000

(a). Banyak bilangan ribuan lebih dari 2.000, sehingga bilangan tersebut terdiri atas empat angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan angka-angkanya tidak boleh muncul berulang.

Ribuan	Ratusan	Puluhan	Satuan
4	4	3	2
(2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)

- Sebuah bilangan kita ketahui merupakan bilangan lebih dari 2.000, dapat kita perhatikan ribuan bilangan tersebut. Sehingga untuk soal seperti ini kita mulai bekerja dari ribuan. Banyak angka yang mungkin jadi ribuan agar bilangan lebih dari 2.000 ada sebanyak 4 angka yaitu (2, 3, 4, 5).
- Banyak angka yang mungkin jadi ratusan ada sebanyak 5 angka yaitu (1, 2, 3, 4, 5), tetapi satu angka sudah dipakai untuk jadi ribuan sehingga angka yang mungkin untuk jadi ratusan hanya ada 4.
- Banyak angka yang mungkin jadi puluhan ada sebanyak 5 angka yaitu (1, 2, 3, 4, 5), tetapi dua angka sudah dipakai untuk jadi ribuan dan ratusan sehingga angka yang mungkin untuk jadi ratusan hanya ada 3.
- Banyak angka yang mungkin jadi satuan ada sebanyak 5 angka yaitu (1, 2, 3, 4, 5), tetapi tiga angka sudah dipakai untuk jadi ribuan, ratusan dan puluhan sehingga angka yang mungkin untuk jadi satuan hanya ada 2.
- Total banyak bilangan yang mungkin yang lebih dari 2.000 dan tidak ada angka berulang adalah $4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$ bilangan.

Jika angka boleh berulang:

Banyak bilangan ribuan lebih dari 2.000, sehingga bilangan tersebut terdiri atas empat angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan angka-angkanya boleh muncul berulang.

Ribuan	Ratusan	Puluhan	Satuan
4	5	5	5
(2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)

Total banyak bilangan yang mungkin yang lebih dari 2.000 dan angka boleh berulang adalah $4 \times 5 \times 5 \times 5 = 500$ bilangan

(b). Banyak bilangan ribuan kurang dari 3.000, sehingga bilangan tersebut terdiri atas empat angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan angka-angkanya tidak boleh muncul berulang.

Ribuan	Ratusan	Puluhan	Satuan
2	4	3	2
(1, 2)	(1, 2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)

- Sebuah bilangan kita ketahui merupakan bilangan kurang dari 3000, dapat kita perhatikan ribuan bilangan tersebut. Sehingga untuk soal seperti ini kita mulai bekerja dari ribuan. Banyak angka yang mungkin jadi ribuan agar bilangan kurang dari 3.000 ada sebanyak 2 angka yaitu (1, 2).
- Banyak angka yang mungkin jadi ratusan ada sebanyak 5 angka yaitu (1, 2, 3, 4, 5), tetapi satu angka sudah dipakai untuk jadi ribuan sehingga angka yang mungkin untuk jadi ratusan hanya ada 4.
- Banyak angka yang mungkin jadi puluhan ada sebanyak 5 angka yaitu (1, 2, 3, 4, 5), tetapi dua angka sudah dipakai untuk jadi ribuan dan ratusan sehingga angka yang mungkin untuk jadi ratusan hanya ada 3.
- Banyak angka yang mungkin jadi satuan ada sebanyak 5 angka yaitu (1, 2, 3, 4, 5), tetapi tiga angka sudah dipakai untuk jadi ribuan, ratusan dan puluhan sehingga angka yang mungkin untuk jadi satuan hanya ada 2.
- Total banyak bilangan yang mungkin yang kurang dari 3.000 dan tidak ada angka berulang adalah $2 \times 4 \times 3 \times 2 = 48$ bilangan.

Jika angka boleh berulang:

Banyak bilangan ribuan kurang dari 3.000, sehingga bilangan tersebut terdiri atas empat angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan angka-angkanya boleh muncul berulang.

Ribuan	Ratusan	Puluhan	Satuan
2	5	5	5
(1, 2)	(1, 2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)

Total banyak bilangan yang mungkin yang kurang dari 3.000 dan angka boleh berulang adalah

$$2 \times 5 \times 5 \times 5 = 250 \text{ bilangan}$$

• • •

SOAL LATIHAN dan PEMBAHASAN ATURAN PENJUMLAHAN dan ATURAN PERKALIAN

Jika tertarik untuk membahas soal-soal kaidah pencacahan yang sudah pernah diujikan pada Ujian Nasional matematika SMA atau soal seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan secara nasional atau mandiri silahkan disimak pada Soal dan Pembahasan Matematika Dasar SMA Kaidah Pencacahan.

Untuk menambah pengetahuan kita terkait **aturan penjumlahan atau aturan perkalian** mari kita lihat beberapa soal latihan berikut. Soal latihan ini kita pilih dari Modul Matematika SMA Kaidah Pencacahan, Aturan Penjumlahan dan Aturan Perkalian atau soal-soal yang ditanyakan pada media sosial.

Silahkan dikerjakan terlebih dahulu secara mandiri sebelum membuka buku atau sumber lain untuk melihat pembahasan soal. Setelah selesai silakan  **Evaluasi Jawaban** dan jika hasilnya belum memuaskan, pilih  **Ulangi Tes** untuk tes ulang. **Ayo Tunjukkan Kemampuan Terbaikmu!**

Aturan Penjumlahan dan Aturan Perkalian

Nama Peserta	: Isi Nama Disini
Tanggal Tes	: Rabu, 2 September 2026
Jumlah Soal	: 16 soal
Sisa Waktu	: 93:50

Petunjuk Pengerjaan Soal:

Bentuk soal pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling tepat di antara pilihan jawaban yang tersedia.

Jawaban soal **Benar skor +4**, **Salah skor -1**, dan **Kosong skor 0**.

1. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Seseorang mempunyai tiga jenis baju dan empat celana. Banyaknya cara (pasangan baju-celana) yang dapat dikenakan orang tersebut dalam berpakaian adalah...

- ☐ (A) 8
- ☐ (B) 10
- ☐ (C) 12
- ☐ (D) 14
- ☐ (E) 16

Alternatif Pembahasan:

Open

2. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Terdapat tiga jalan yang menghubungkan kota A dan kota B , dua jalan yang menghubungkan kota B ke kota C serta empat jalan yang menghubungkan kota C ke kota D . Jika seseorang ingin bepergian dari kota A ke kota D maka banyaknya rute perjalanan yang mungkin ditempuhnya adalah...rute

- ☐ (A) 16
- ☐ (B) 24
- ☐ (C) 26
- ☐ (D) 30
- ☐ (E) 34

Alternatif Pembahasan:

Open

3. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

A, B, C adalah calon ketua. M, L adalah calon sekretaris dan P, Q adalah calon bendahara suatu yayasan. Banyaknya cara menyusun pengurus yayasan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yang mungkin dibentuk adalah...

- ☐ (A) 12 cara
- ☐ (B) 18 cara
- ☐ (C) 20 cara
- ☐ (D) 24 cara
- ☐ (E) 12 cara

Alternatif Pembahasan:

Open

4. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Terdapat tiga jalan yang menghubungkan kota A dan kota B , dan empat jalan yang menghubungkan kota B ke kota C . Jika seseorang ingin bepergian dari kota A ke kota C dan kembali ke kota A , maka banyaknya kemungkinan rute perjalanan orang tersebut adalah...

- ☐ (A) 84 rute
- ☐ (B) 96 rute
- ☐ (C) 122 rute
- ☐ (D) 132 rute
- ☐ (E) 144 rute

Alternatif Pembahasan:

Open

5. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Terdapat tiga jalan yang menghubungkan kota A dan kota B , dan empat jalan yang menghubungkan kota B ke kota C . Jika seseorang ingin bepergian dari kota A ke kota C dan kembali ke kota A , maka banyaknya kemungkinan rute perjalanan orang tersebut jika rute pergi (A ke C) tidak boleh sama dengan rute kembali (C ke A) adalah...

☐ (A) 84 rute☐ (B) 96 rute☐ (C) 122 rute☐ (D) 132 rute☐ (E) 144 rute

Alternatif Pembahasan:

Open

6. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Banyaknya bilangan yang terdiri atas tiga angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, dan 6 jika angka-angka tersebut tidak boleh muncul berulang adalah...

☐ (A) 24 bilangan☐ (B) 28 bilangan☐ (C) 32 bilangan☐ (D) 36 bilangan☐ (E) 40 bilangan

Alternatif Pembahasan:

Open

7. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Banyaknya bilangan yang terdiri atas tiga angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, dan 6 jika angka-angka tersebut boleh muncul berulang adalah...

☐ (A) 24 bilangan☐ (B) 32 bilangan☐ (C) 38 bilangan☐ (D) 48 bilangan☐ (E) 64 bilangan

Alternatif Pembahasan:

Open

8. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Banyaknya bilangan ratusan yang dapat disusun dari angka-angka 4, 5, 6, 7, dan 8 jika angka-angka tersebut tidak boleh muncul berulang adalah...

☐ (A) 48 bilangan☐ (B) 56 bilangan☐ (C) 60 bilangan

☐ (D) 72 bilangan☐ (E) 80 bilangan

Alternatif Pembahasan:

Open

9. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Banyaknya susunan huruf yang terdiri atas tiga huruf berbeda, yang dapat disusun dari huruf-huruf B, E, S, A, R jika huruf pertama harus konsonan adalah...

☐ (A) 30 susunan☐ (B) 36 susunan☐ (C) 38 susunan☐ (D) 42 susunan☐ (E) 44 susunan

Alternatif Pembahasan:

Open

10. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Banyaknya bilangan asli yang terdiri dari empat angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 jika bilangan tersebut nilainya lebih dari 3.000 adalah...

☐ (A) 96 bilangan☐ (B) 122 bilangan☐ (C) 164 bilangan☐ (D) 180 bilangan☐ (E) 196 bilangan

Alternatif Pembahasan:

Open

11. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Banyaknya bilangan asli yang terdiri dari tiga angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika bilangan tersebut harus bernilai genap adalah...

☐ (A) 6 bilangan☐ (B) 8 bilangan☐ (C) 12 bilangan☐ (D) 24 bilangan☐ (E) 60 bilangan

Alternatif Pembahasan:

Open

12. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Banyaknya bilangan dengan angka-angka berlainan antara 400 dan 700 yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 7 adalah...

☐ (A) 36 bilangan☐ (B) 28 bilangan

☐ (C) 24 bilangan☐ (D) 15 bilangan☐ (E) 12 bilangan

Alternatif Pembahasan:

Open

13. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan disusun suatu kode PIN yang terdiri dari 4 digit. Jika tidak boleh muncul angka-angka yang semuanya sama dalam kode PIN tersebut, maka banyaknya kode PIN yang dapat disusun adalah...

☐ (A) 30 kode☐ (B) 200 kode☐ (C) 5.030 kode☐ (D) 9.990 kode☐ (E) 10.000 kode

Alternatif Pembahasan:

Open

14. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa lelaki dan 13 siswa perempuan, banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris dan bendahara jika bendahara haruslah perempuan adalah...

☐ (A) 5.278 cara☐ (B) 2.436 cara☐ (C) 2.700 cara☐ (D) 1.092 cara☐ (E) 10.556 cara

Alternatif Pembahasan:

Open

15. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Ditoko buah "Kurnia" Ami ingin membeli 8 buah yang terdiri atas mangga, nenas dan pepaya. Jika Ani membeli paling sedikit 2 buah untuk masing-masing jenis, maka komposisi banyak buah yang mungkin dibeli adalah...

☐ (A) 2☐ (B) 4☐ (C) 6☐ (D) 8☐ (E) 10

Alternatif Pembahasan:

Open

16. Soal Latihan Aturan Penjumlahan-Perkalian

Banyaknya bilangan ganjil yang lebih besar dari 60.000 yang dapat dibentuk dari angka-angka 5, 6, 7, 8, 9, 0 jika tidak ada angka berulang adalah...

☐ (A) 458☐ (B) 528☐ (C) 6778☐ (D) 688☐ (E) 788

Alternatif Pembahasan:

Open

💡 Evaluasi Jawaban

Catatan Belajar Kaidah Pencacahan, Aturan Penjumlahan dan Aturan Perkalian di atas sifatnya "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki atau diperbaharui sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Catatan tambahan dari Anda untuk admin diharapkan dapat meningkatkan kualitas catatan ini 🙏

CMIIW.

JADIKAN HARI INI LUAR BIASA!
Ayo Share (Berbagi) Satu Hal Baik.

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.

— Mohammad Hatta —

[# Aturan Perkalian](#)[# Kaidah Pencacahan](#)[# Soal Permutasi](#)[# Teori Peluang](#)[< Sebelumnya](#)[Selanjutnya >](#)

20 Soal TPS Pemahaman Bacaan dan Menulis (PBM)
UTBK SNBT 2025 dan Kunci Jawaban (B)

20 Soal TPS Pemahaman Bacaan dan Menulis (PBM)
UTBK SNBT 2025 dan Kunci Jawaban (C)

Related Posts



Teori Peluang Suatu Kejadian Tunggal (Kejadian Sederhana) dan Pembahasan Soal Latihan (1-23)



Soal Aturan Perkalian, Permutasi, Kombinasi Matematika SMA dan Pembahasan (81-121)



Teorema Binomial Newton dan Pembahasan Soal Latihan



Definisi Faktorial dan Pembahasan Soal Latihan



Soal Teori Peluang Matematika SMA dan Pembahasan (121-152)



Soal Teori Peluang Matematika SMA dan Pembahasan (41-80)