Tentukanlah nilai dari :

(a) cos 112,5^0 (b) tan 22,5^0

$\cos\frac{1}{2}(225) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos(225)}{2}}$

$\cos\frac{1}{2}(225) = -\sqrt{\frac{1-\frac{1}{2}\sqrt{2}}{2}}$

$\cos\frac{1}{2}(225) = -\sqrt{\frac{\frac{2}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{2}}{2}}$

$\cos\frac{1}{2}(225) = -\sqrt{\frac{\frac{2-\sqrt{2}}{2}}{2}}$

$= -\sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}}$

$= -\sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{4}}$

$= -\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$

$\tan\frac{1}{2}(45) = \frac{\sin 45^0}{1+\cos 45}$

$= \frac{\frac{1}{2}\sqrt{2}}{1+\frac{1}{2}\sqrt{2}}$

$= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{2+\sqrt{2}}{2}}$

$= \frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{2}{2+\sqrt{2}}$

$= \frac{\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}\times\frac{2-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}-2}{4-2} = \frac{2\sqrt{2}-2}{2} = \sqrt{2}-1$

[HASIL AKHIR]

$$\sin\frac{1}{2}\alpha = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$$

[HASIL AKHIR]

$$\cos\frac{1}{2}\alpha = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\tan\frac{1}{2}\alpha = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$$

...ya penyebut di PSF haberman 5, kita juga mendapatkan 2 rumus alternatif yang ""tatlen akar""!

Alternatif A

$$\tan\frac{1}{2}\alpha = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

Alternatif B

$$\tan\frac{1}{2}\alpha = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$$

Kuadran	Rentang $\frac{1}{2}\alpha$	Nilai Sin	Nilai Cos
I	$0^\circ - 90^\circ$	+	+
II	$90^\circ - 180^\circ$	+	−
III	$180^\circ - 270^\circ$	−	−
IV	$270^\circ - 360^\circ$	−	+

Kuadran	Rentang Sudut	Tanda $\tan(\frac{1}{2}\alpha)$
I	$0^\circ < \frac{1}{2}\alpha < 90^\circ$	+
II	$90^\circ < \frac{1}{2}\alpha < 180^\circ$	−
III	$180^\circ < \frac{1}{2}\alpha < 270^\circ$	+
IV	$270^\circ < \frac{1}{2}\alpha < 360^\circ$	−

Jika cos α = 7/25 dan 270^0 < α < 360^0 maka tentukanlah nilai tan ½ α = …

$\sin\alpha = -\frac{24}{25}$

$\tan\frac{1}{2}\alpha = \frac{-\frac{24}{25}}{1+\frac{7}{25}}$

$= \frac{-\frac{24}{25}}{\frac{25}{25}+\frac{7}{25}}$

$= \frac{-\frac{24}{25}}{\frac{32}{25}}$

$= -\frac{24}{32}$

$= -\frac{3}{4}$

Nilai dari 12.sin 22½^0.cos 22½^0. = …

A. 3$\sqrt{2}$ B. 4$\sqrt{2}$ C. 3$\sqrt{3}$

D. 2$\sqrt{3}$ E. 2$\sqrt{2}$

[HASIL AKHIR]

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$= 6.2\sin 22{,}5.\cos 22{,}5$

$= 6\sin 2(22{,}5)$

$= 6.\frac{1}{2}\sqrt{2}$

$= 3\sqrt{2}$

Nilai dari 6 – 12.sin$^2\frac{\pi}{12}$ = …

A. 3$\sqrt{2}$ B. 4$\sqrt{2}$ C. 3$\sqrt{3}$

D. 2$\sqrt{3}$ E. 2$\sqrt{2}$

VARIASI 2 (SUDUT)

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$$

$= 6\left(1-2.\sin^2\frac{\pi}{12}\right)$

$= 6(\cos 2\frac{\pi}{12})$

$= 6(\cos\frac{180}{6})$

$= 6(\cos 30)$

$= 6(\frac{1}{2}\sqrt{3})$

$= 3\sqrt{3}$

Nilai dari 4 – 8.cos$^2\frac{3\pi}{8}$ = …

A. 3$\sqrt{2}$ B. 4$\sqrt{2}$ C. 3$\sqrt{3}$

D. 2$\sqrt{3}$ E. 2$\sqrt{2}$

VARIASI 3 (SUDUT)

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

$= 4\left(1-2.\cos^2\frac{3\pi}{8}\right)$

$= -4\left(-1+2\cos^2\frac{3\pi}{8}\right)$

$= -4\left(2.\cos^2\frac{3\pi}{8}-1\right)$

$= -4(\cos 2\frac{3\pi}{8})$

$= -4(\cos\frac{3\pi}{4})$

$= -4(\cos 135)$

$= -4(-\frac{1}{2}\sqrt{2})$

$= 2\sqrt{2}$

Nilai dari $\frac{2.\tan 112{,}5^0}{1-\tan^2 112{,}5^0}$ = …

A. 1 B. 3/2 C. 1/2

D. $\sqrt{2}$ E. 2$\sqrt{3}$

[HASIL AKHIR]

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$

$\tan 2(112{,}5) = \tan 225$

$= 1$

Jika tan B = 1/2 dan B sudut pada kuadran III maka nilai cos 2B = …

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{5}$

$\cos 2B = 2\cos^2 B - 1$

$\cos 2B = 2\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 - 1$

$= 2.\frac{4}{5} - 1$

$= \frac{8}{5} - 1$

$= \frac{8}{5} - \frac{5}{5}$

$= \frac{3}{5}$

Nilai dari cos 72^0 + sin 72^0. tan 36^0 = …

A. 3 B. 3$\sqrt{2}$ C. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

D. $\frac{1}{2}$ E. 1

$\cos 2(36) + \sin 2(36)\tan 36$

$1 - 2\sin^2(36) + 2\sin(36)\cos(36).\frac{\sin(36)}{\cos(36)}$

$1 - 2\sin^2(36) + 2\sin^2(36)$

1