

Schnellreferenz: Sprechstundenbedarf und Impfen

Praxisleitfaden für MFA in Bayern (KVB)

Quelle: KVB Online-Seminar 05.05.2026, V1.7 · Aktualitätscheck: 05.05.2026 · Geltungsbereich: AOK Bayern (Kostenträger 108310400)

Aktualitätsstand und Update-Hinweise (Stand 05.05.2026)

Das KVB-Seminar V1.7 vom April 2026 ist auf dem aktuellen Stand. Drei Punkte verdienen aber besondere Aufmerksamkeit, da sich hier 2025/2026 etwas geändert hat oder gerade bewegt.

STIKO-Empfehlungen 2026 (Epi Bull 4/2026) Veröffentlicht am 22.01.2026. Wesentliche Änderungen betreffen Meningokokken, Pneumokokken, Herpes zoster, RSV, Influenza, Hib, Mpox und Chikungunya. Das Seminar berücksichtigt diese Änderungen bereits korrekt.

Lieferengpass Influenza 2025/2026 Influvac wird mit italienischer Kennzeichnung („Influvac S“) bis 30.04.2026 in Verkehr gebracht (Ausnahmegestattung des PEI). Ab Saison 2026/2027 normaler Bezug. Vor Vorbestellung ab Saison 2026/2027 bis Ende Februar 2026 prüfen.

Inhaltlich aktuell und unverändert SSB-Vereinbarung Anlage Stand 01.01.2026, Schutzimpfungs-Richtlinie aktuell, Lauer-Taxe-Preise Stand 01.02.2026.

Was du regelmäßig (1x pro Quartal) prüfen solltest

- PEI-Lieferengpassliste: pei.de/lieferengpaesse
- STIKO-Updates und Epi Bull: rki.de/impfkalender
- KVB Verordnungs-Service-Schreiben: kvb.de/mitglieder/verordnungen
- SSB-Anlagen-Update (jährlich Januar): KVB-Broschüre prüfen

Sprechstundenbedarf: Die 7 Grundregeln

- Nur für Produkte und Produktgruppen, die bei **mehr als einer berechtigten Person** angewendet werden.
- Einzeldosen ausschließlich für **Notfälle**.
- Bestellung grundsätzlich **kalendervierteljährlich** als Ersatz für tatsächlich verbrauchte Produkte oder verfallene Notfallarzneimittel.
- Keine Rabattverträge.
- Keine Verordnung bei **Berufs- oder Wegeunfällen** (Unfallversicherungsträger), BVFG, PKV-Mitgliedern, Selbstzahlern oder IGeL.
- Bei Praxis-Neugründung oder Übernahme: **Sperrfrist 3 Monate** für die erste Ersatzbeschaffung.
- Ausnahme von der Sperrfrist: **Impfstoffe**.

Vollständige SSB-Vereinbarung der KVB Allgemeiner Teil: KVB-Broschüre SSB-Vereinbarung Juli 2022
Aktualisierte Anlage Januar 2026: KVB-Broschüre SSB Januar 2026

Muster 16a bay: Rezept richtig ausfüllen

Feld	Inhalt
Kostenträger	108310400 - AOK Bayern (immer, auch wenn Patient woanders versichert ist)
Statusfeld	Ziffer „9“ für SSB allgemein. Bei Impfstoffen Ziffer „8“ und „9“. Impfstoffe immer auf separates Rezept.
Verordnungsfeld	Maximal 7 SSB-Artikel pro Rezept (Arznei-, Hilfs- und Verbandmittel oder Impfstoffe). Betäubungsmittel separat auf BtM-Rezept mit Ziffer „9“.
Unterschrift	Vorderseite des Ordnungsblatts
Vertragsarztstempel	Rückseite des Ordnungsblatts. Vor- und Nachname plus Berufsbezeichnung müssen erkennbar sein.

Häufiger Fehler Mehr als 7 Positionen, vergessene Unterschrift oder falsches Statusfeld bei Impfstoff-SSB. Vor Abgabe immer Sichtkontrolle.

Verordnungsfähigkeit: Schnelltablette nach Produktgruppen

Arzneimittel (Auswahl)

Produkt	SSB?	Erläuterung
Analgetika nicht-retardiert	☐ JA	Z. B. Novalgin Tropfen, Tilidin Tropfen. Oral, parenteral, rektal (bei Kindern), topisch zur Akut- und Notfallbehandlung.
Analgetika retardiert	☐ NEIN	Z. B. Diclofenac retard, Tilidin retard. Auch keine TTS, Pflanzliche Präparate, Arthrosemittel.
Adrenalin (Notfall)	☐ JA	Adrenalin-Ampullen/Durchstechflaschen, Infectokrupp Inhalationslösung.
Adrenalin-Komplettbestecke	☐ NEIN	Patientenanwendung: Fastjekt, Anapen, Jext, Epipen, Emerade. Diese auf Patientennamen verordnen.
Antiasthmatika (Notfall)	☐ JA	Nur für Notfall: Beclometason für Rauchgasintoxikation, Fenoterol, Ipratropiumbromid, Salbutamol, Terbutalin, Theophyllin.
Kortisonhaltige Dosieraerosole	☐ NEIN	Nicht für akute Asthmaanfälle geeignet. Ausnahme: Ventolair und Junik 100 µg als Antidot bei Rauchgasvergiftung.
Antiallergika/Antihistaminika	☐ JA	Akut/Notfall in sofort verfügbarer Form (Injektion, oral, nicht kortikoidhaltig). Tropfen/Saft nur Kinder zur Allergietestung.
Neuroleptika oral/parenteral	☐ JA	Akut- und Notfälle in parenteraler Form, oral als Tropfen: Haloperidol, Levomepromazin, Promethazin, Risperidon.
Depot-Neuroleptika	☐ NEIN	Z. B. Xeplion, Imap, Risperdal consta. Auf Patientennamen verordnen.
Antiemetika (Aloxi, Emend)	☐ NEIN	Auch nicht als Serienbehandlung zur Prävention bei Chemotherapie.
Vitamine	☐ NEIN	Ausnahme: Vitamin K für Neugeborene und als Notfallmittel bei Cumarin-Überdosierung.
Eisenpräparate	☐ NEIN	Auf Patientennamen verordnen.
Rivanol	☐ NEIN	—

Desinfektion, Reinigung, Pflege

Produkt	SSB?	Erläuterung
Desinfektion am Patienten (Haut, Schleimhaut, Wunden)	☐ JA	Nur am Patienten anzuwenden.
Hände-, Geräte-, Flächen-, Instrumenten-, Raumdesinfektion	☐ NEIN	Praxisbedarf, kein SSB.
Aceton, Brennspritus, Chloroform, Ethylalkohol	☐ NEIN	—
Aether/Ether	☐ JA	—
Alkoholtupfer	☐ NEIN	Ausnahme: für den Notfallkoffer.
Hautreinigungsmittel (Seifen, Syndets, Emulsionen)	☐ NEIN	—
Glasoptik-Mittel (Antibeslag, Pflege)	☐ NEIN	—

Einmalbedarf zur Infusion, Injektion, Drainage, Entnahme

Produkt	SSB?	Erläuterung
Infusionsbestecke inkl. Zubehör	☐ JA	Außer für Kontrastmittel, Zytostatika-Mischung, Dialyse, parenterale Ernährung.
Infusionsfilter, Injektionsfilter	☐ NEIN	Ausnahme: in-line-Filter $\leq 0,22 \mu\text{m}$ für Paclitaxel oder bei Therapien laut Fachinfo.
Infusionskanülen, Infusionskatheter	☐ JA	Auch Intraossärkanülen.
Infusionskanülen für Blutabnahme/Eigenbluttherapie/Injektionszwecke	☐ NEIN	—
Infusionspumpen (auch Einmalartikel)	☐ NEIN	—
Injektionsbestecke, -kanülen, -spritzen (auch Einmal, mit Zubehör)	☐ NEIN	Praxisbedarf, kein SSB.

Verband-, Kompressions- und OP-Material

Produkt	SSB?	Erläuterung
Wundauflagen zur Erstversorgung	☐ JA	Nur Erstversorgung. Folgeverordnung auf Patientennamen. Hydrokolloid, Hydrogel, Alginat, Schaumstoff, Aktivkohle, Salbengaze.
Silberhaltige Wundauflagen	☐ NEIN	Auch nicht mit Aktivkohle.
Spezial-Wundprodukte (Honig, Hyalo, Sprays, Granulate)	☐ NEIN	Wound EL, Granulox, Tensospray, Anosteralyth, Quractiv, Suprasorb P+PHMB usw.
Wunddistanzgitter mit Silikonbeschichtung	☐ NEIN	Mepitel One, Adaptic Touch, Dracotüll Silikon.

Teststreifen

Produkt	SSB?	Erläuterung
Urinteststreifen 4-fach (Glucose, pH, Eiweiß, Ascorbinsäure)	☐ JA	Combur 3, Medi-Test Combi 3A, Meditrol 3.
Urinteststreifen mit weiteren Testzonen	☐ NEIN	Combur 4, 5, 6, 9, 10, Micral II.
Urinteststreifen für Diabetikerschulungen	☐ NEIN	—
Teststreifen für Vorsorgeuntersuchungen	☐ NEIN	—
Blutzucker- und Blutgerinnungsteststreifen	☐ NEIN	—

Toleranz-Tests

Produkt	SSB?	Beispiel
Glucose-Toleranztest 75 g (oGTT)	☐ JA	82,5 g Glucose-Monohydrat als Pulver in Portionen.
Glucose-Test 50 g (Gestationsdiabetes-Screening)	☐ JA	55 g Glucose-Monohydrat als Pulver in Portionen.
Fertigprodukte (z. B. Gluco 50, Gluco 75)	☐ NEIN	Glucose-Toleranztest 25 g/100 ml Lösung, Glucosetest oGTT InfectoPharm.
Rezepturen für trinkfertige Lösungen	☐ NEIN	NRF-Rezeptur Glucose-Lösung für oGTT.

Regress-Fallen: 6 typische Fehler

1. Falsche Packungsgröße

Flammazine Topf 500 g: ☐ NEIN (Einzelpatient). Flammazine Tube 80 g: ☐ JA (mehrere Patienten).

2. Importe

Grundsätzlich nicht, nur bei Lieferengpass mit ausdrücklicher Genehmigung der AOK Bayern.

3. AM-RL Anlage III missachtet

Verordnungseinschränkungen beachten: Otobacid, Ambene, Arthotec, Dolomo TN.

4. Topische Antibiotika mit Kortikoiden

Außerhalb HNO/Derma/Päd/Phlebologie: max. 1x kleinste OP pro Quartal. Beispiele: Diprogenta, Fucicort.

5. Antimykotika

Nur zur unmittelbaren Anwendung im Gehörgang. Keine Mitgabe an Patienten. Lotricomb, Ciclopirox Creme.

6. Aknemittel

Aureomycin und Mupirocin sind Ausnahmen vom Antibiotika-SSB. Diese sind ☐ NEIN.

Otologika (verordnungsfähig zur unmittelbaren Anwendung)


- Antibiotika und Kortikosteroide auch in Kombination, z. B. Infectospectran HC Ohrensalbe
- Lokalanästhetika bei operativen Eingriffen
- Ohrenschmalzerweichende Mittel
- Clotrimazol Ohrentropfen, z. B. Otomyk (NEU)

Impfungen: Rechtliche Grundlagen

Die Schutzimpfungs-Richtlinie (G-BA) regelt den Anspruch der Versicherten und die Leistungspflicht der GKV. Sie folgt den STIKO-Empfehlungen, ist aber nicht automatisch identisch.


Merksatz: STIKO-Empfehlung ist nicht gleich Kassenleistung Eine STIKO-Empfehlung wird erst dann zur GKV-Leistung, wenn die Schutzimpfungs-Richtlinie geändert ist und in Kraft getreten ist (Veröffentlichung im Bundesanzeiger). Dazwischen muss das BMG zustimmen und die regionale Impfvereinbarung angepasst werden.

Prozess (vereinfacht)



Bezugsweg: SSB oder eRezept? (Entscheidungsdiagramm)

Falscher Bezugsweg ist die häufigste Regressquelle bei Impfstoffen. Diese Entscheidung muss vor jeder Bestellung sitzen.



Liste der Impfstoffe nach Bezugsweg

Sprechstundenbedarf (Statusfeld 9 + 8)

FSME, Hep B Kinder (bis 15), Herpes zoster, HPV, Influenza, Meningokokken ACWY NEU 2026, Meningokokken B, Pneumokokken, Poliomyelitis, Rotavirus, RSV (Erwachsene), Tetanus, Varizellen, MMR, MMRV, Tdap, Tdap-IPV, Sechsfach, Anti-D-Prophylaxe, Tetanus-Immunglobulin (Erstversorgung)

eRezept patientenbezogen (Statusfeld 8)

Cholera, Chikungunya, Dengue, Gelbfieber, Hib (nur Import), Hepatitis A, Hep A+B, Hep B Erwachsene (ab 16), Influenza nasal, Japanische Enzephalitis, Mpox, Tollwut, Typhus

Nicht mehr GKV-Leistung Meningokokken C im Alter von 12 Monaten (entfällt seit STIKO 2026). Wird durch MenACWY im Alter 12-14 Jahre ersetzt.

COVID-19-Impfung (Sonderweg) Wöchentliche Bestellung auf Muster 16, zu Lasten des Bundesamts für Soziale Sicherung, sowohl für privat als auch gesetzlich Versicherte. Impfstoff-spezifische Dokumentationsziffern beachten.

Impfstoff-Schnellübersicht (häufige Fälle)

Hepatitis B

Grundimmunisierung	3 Impfdosen Säuglinge mit Sechsfach-Kombi (DTaP-IPV-Hib-HepB), 4 Dosen für Frühgeborene. Mindestabstand 6 Monate zwischen vorletzter und letzter Dosis.
Wiederholung	Nach Säuglingsimpfung nicht generell empfohlen. Bei neuem Risiko und unbekanntem Anti-HBs: weitere Dosis.
Nachholung	Bis zum 18. Geburtstag möglich.
Indikation	HIV-Positive, Hepatitis-C-Positive, Dialyse, HBsAg-Kontakt, Sexualverhalten mit hohem Risiko, Drogenkonsum, Strafgefangene, ggf. Psychiatrie.
Berufliche Indikation	Medizin (inkl. Labor, Reinigung), Sanitäts-/Rettungsdienst, Polizei, Gefängnisse, Asylbewerberheime. Betriebliche Ersthelfer in der Regel NICHT.
Reiseimpfung	Nur bei beruflichem oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt GKV-Leistung. Privater Urlaub = Selbstzahler.

Masern (MMR/MMRV)

Grundimmunisierung	2 Impfdosen, Nachholung bis vollendetes 18. Lebensjahr.
Standardimpfung	Nach 1970 geborene Personen ≥ 18 Jahre, ungeimpft, einmal geimpft oder unklarer Status: einmalige MMR.
Berufliche Indikation	Nach 1970 Geborene in: medizinische Einrichtungen, Pflege, Gemeinschaftseinrichtungen, Asylbewerberheime, Fach-/Berufs-/Hochschulen. Insgesamt zweimalige Impfung MMR/MMRV.

Pneumokokken UPDATE 2026

Grundimmunisierung Säuglinge	Vaxneuvance oder Prevenar 13.
Standardimpfung ab 60 J.	Prevenar 20. Bei früherer Pneumovax-Impfung: Prevenar 20 nach Mindestabstand 6 Jahre. Keine Wiederholung empfohlen.
Indikation 2-17 J.	NEU: Prevenar 20 (PCV20). Pneumovax 23 entfällt vollständig.
Indikation ≥ 18 J.	Prevenar 20 (PCV20). Keine Wiederholung empfohlen.
Nicht verordnungsfähig	Prevenar 20 zur Säuglings-Grundimmunisierung, Pneumovax 23, Capvaxive, Synflorix.

Meningokokken UPDATE 2026

MenB	Im Alter 2, 4 und 12 Monaten. Nachholung bis 4 Jahre. Ab 24 Monate nur 2 Dosen.
MenC	ENTFÄLLT – nicht mehr GKV-Leistung.
MenACWY	Standardimpfung Jugendliche 12-14 Jahre, Nachholung bis 24 Jahre. Bezug seit 2026 als Sprechstundenbedarf .
Indikation	Komplement-/Properdindefekt, C5-Inhibitor-Therapie (Eculizumab, Ravulizumab), Hypogammaglobulinämie, Asplenie. Impfung gegen ACWY und/oder B.

MenACWY-Impfstoff-Wirtschaftlichkeit (Lauer-Taxe 01.02.2026)

Impfstoff	Hersteller	Zulassung ab	1er-Pack	10er-Pack
Menquadfi	Sanofi	12 Monate	54,94 €	447,51 €
Menveo	GSK	2 Jahre	78,43 €	682,54 €
Nimenrix	Pfizer	6 Wochen	61,23 €	510,34 €

Bei Wirtschaftlichkeit: Menquadfi ist im Erwachsenen-/Jugendlichenbereich aktuell günstigste Option.

Herpes zoster UPDATE 2026

Standardimpfung	Personen ab 60 Jahre.
Indikation NEU	Bereits ab 18 Jahren bei Immundefizienz oder schwerer chronischer Grunderkrankung.
Beispiele	Immunsuppressive Therapie (Rituximab, JAK-Inhibitoren, Chemo), HIV-Infektion, rheumatoide Arthritis, CED (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa), COPD oder Asthma (schwer), Diabetes mellitus (schwer), HSZT.
Schema	Zweimalige Impfung mit Shingrix im Abstand 2-6 Monate.
Achtung	Leichte oder gut kontrollierte chronische Erkrankungen unter 60 Jahre = keine Indikation.

HPV

Standardimpfung	Mädchen und Jungen 9-14 Jahre. 2-Dosen-Schema im Abstand 6 bzw. 5-13 Monate.
Nachholung	Bis vollendetes 18. Lebensjahr. 1. Impfung muss vor 18. Geburtstag erfolgen, dann zeitnahe Abschluss noch GKV-Leistung.
3-Dosen-Schema	Bei Beginn nach 14 J. oder Abstand < 5 Monate zwischen 1. und 2. Dosis.

Pertussis in der Schwangerschaft

- Ab 28. SSW (beste Wirkung im frühen 3. Trimenon)
- Im 2. Trimenon bei erhöhter Frühgeburts-Wahrscheinlichkeit
- Unabhängig vom Abstand zu vorherigen Impfungen, in jeder Schwangerschaft
- Postpartum innerhalb erster Tage, wenn keine Impfung in SS und letzte ≥ 10 Jahre her
- 3-fach-Impfstoff (Tdap), kein Tetanus-Einzelpfstoff zugelassen
- Enge Haushaltskontakte und Betreuende: Impfung bis 4 Wochen vor Geburt, wenn letzte ≥ 10 Jahre her

Influenza Saison 2026/2027

Vorbestellung	Bis Ende Februar (Menge an Impfleistungen Vorsaison orientieren).
Unter 60 Jahre	Flucelvax (13,75 €), Influsplit (14,21 €), Influvac (14,10 €), Vaxigrip (13,81 €), Xanaflu (14,10 €).
Ab 60 Jahre	Hochdosis-Impfstoff Efluelda oder adjuvantierter Fluad.
Ausnahmen ab 60	Lieferengpass, medizinische Gabe nicht möglich.

Aktueller Lieferengpass-Hinweis (Stand 05.05.2026) Influvac wird in italienischer Kennzeichnung („Influvac S“) bis 30.04.2026 nach PEI-Ausnahmegestattung in Verkehr gebracht. Pharmazeutisch identisch. Saison 2026/2027 frühzeitig planen.

RSV-Impfung Erwachsene

Standardimpfung	Personen ≥ 75 Jahre.
Indikation	60-74 Jahre mit schweren Grunderkrankungen, Pflegeheimbewohner ab 60.
Impfstoffe	Abrysvo, Arexvy, mResvia NEU mRNA seit 2026.
Achtung	Von Zulassung abweichende Altersgrenzen beachten. Schwangeren-Impfung zum passiven Schutz des Säuglings ist KEINE GKV-Leistung.

RSV-Prophylaxe Säuglinge (Beyfortus / Nirsevimab)

Geltungsbereich	Alle Kinder im 1. Lebensjahr. RSV-Saison meist Oktober bis März.
Geburt April-September	Prophylaxe September bis November (vor 1. RSV-Saison).
Geburt Oktober-März	Möglichst rasch nach Geburt.
Bestimmte Erkrankungen	Bis Vollendung 2. Lebensjahr GKV-Leistung möglich (G-BA Therapiehinweis).
Bezugsweg	KEIN SSB – patientenbezogene Verordnung.

Nachhol- und Vervollständigungsimpfungen

Personengruppe	Nachholung möglich	Ausnahmen / Fristen
Jugendliche bis vollendetes 18. LJ	Alle Impfungen § 11 Abs. 2 Schutzimpfungs-RL	Hib bei Asplenie: bis 60. Lebensmonat. Pneumokokken Indikation: bis 24. LM (Bayern: 27. LM). Rotavirus: bis 24. bzw. 32. LW. MenB: bis 4 Jahre. MenACWY: bis 24 Jahre.
Erwachsene	Tetanus, Diphtherie, Polio	Pertussis einmalig als Tdap oder Tdap-IPV.

Lieferengpass-Alternativen (Anlage 3 Schutzimpfungs-RL)

Lieferengpass	Alternative
Hepatitis B	HepA+B Kombi
MMR	MMR-V Kombi
Tetanus, Diphtherie, Pertussis	Tdap-IPV
PCV20	Verschiebung des Impftermins (keine Alternative)
Herpes zoster	Verschiebung des Impftermins (keine Alternative)

Abrechnungsziffern Hepatitis B (Beispiel)

Die Buchstaben in der Ziffer zeigen die Indikation an: **A** = erste/unvollständige Dosen, **B** = letzte Dosis/abgeschlossen, **R** = Auffrischung, **V/W/X** = berufliche/Reise-Indikation.

Indikation	Erste Dosen	Letzte Dosis	Auffrischung	Bezugsweg
Standardimpfung Säuglinge/Kinder/Jugendliche bis 17 J.	89106A	89106B	—	SSB Kinder
Sonstige Indikationen	89107A	89107B	89107R	eRezept Erw.
Berufliche oder Reise-Indikation (§ 11 Abs. 3)	89107V	89107W	89107X	eRezept Erw.
Dialysepatienten	89108A	89108B	89108R	eRezept

Komplette Liste aller Abrechnungsziffern kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen

KVB Kontakte: Wo anrufen wenn Fragen?

Kurze Frage am Telefon

KVB Servicecenter

089 57093 - 40010

Mo-Do 7:30-17:30 · Fr 7:30-16:00

eTec Support

089 57093 - 40040

Online-Abrechnung, TI, Meine KVB

Umfangreich, mit Termin

Beratungscenter Verordnung

Mo-Do 8:00-16:00 · Fr 8:00-13:00

Beratungscenter nach Region

Region	Telefon	E-Mail
BC Augsburg (Schwaben)	0821 3256 - 399	bc-augsburg@kvb.de
BC Bayreuth (Oberfranken)	0921 292 - 499	bc-bayreuth@kvb.de
BC München	089 57093 - 2499	bc-muenchen@kvb.de
BC Nürnberg (Mittelfranken)	0911 94667 - 399	bc-nuernberg@kvb.de
BC Oberbayern	089 57093 - 2599	bc-oberbayern@kvb.de
BC Regensburg (Oberpfalz)	0941 3963 - 499	bc-regensburg@kvb.de
BC Straubing (Niederbayern)	09421 8009 - 499	bc-straubing@kvb.de
BC Würzburg (Unterfranken)	0931 307 - 499	bc-wuerzburg@kvb.de

Wichtige Online-Quellen

- STIKO Impfkalender: [rki.de/impfkalender](https://www.rki.de/impfkalender)
- PEI Lieferengpässe: [pei.de/lieferengpaesse](https://www.pei.de/lieferengpaesse)
- G-BA Schutzimpfungs-Richtlinie: [g-ba.de/richtlinien/60](https://www.g-ba.de/richtlinien/60)
- KVB Verordnungen: [kvb.de/mitglieder/verordnungen](https://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen)
- KVB Impfungen: [kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen](https://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen)
- KVB Sprechstundenbedarf: [kvb.de/mitglieder/verordnungen/sprechstundenbedarf](https://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/sprechstundenbedarf)