



Blood Transfusion

نقل الدم

المحاضرة 2 • 2 LECTURE 2

معايير التبرع بالدم — بنك الأسئلة

Criteria of blood donation — Exam & Questions

نظري وعملي • Theory & Practical

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

LEC
2

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN

The major goal of transfusion medicine is to:

Q1

س1. الهدف الرئيس لطب نقل الدم هو:

AR

- (A) Increase the number of transfusions زيادة عدد عمليات النقل
- (B) Reduce the risk of transfusion-transmitted infection تقليل خطر العدوى المنتقلة بنقل الدم
- (C) Collect blood from paid donors جمع الدم من متبرعين مأجورين
- (D) Shorten donation time تقصير وقت التبرع

EN

The window period is the interval between:

Q2

س2. فترة النافذة هي المدة بين:

AR

- (A) Donation and transfusion التبرع والنقل
- (B) Two donations تبرعين
- (C) Initial exposure to a pathogen and reliable detection by a test التعرض الأول للممرض والكشف الموثوق بالفحص
- (D) Collection and storage الجمع والتخزين

EN

During the window period a test may give:

Q3

س3. خلال فترة النافذة قد يعطي الفحص:

AR

- (A) A false positive result نتيجة موجبة كاذبة
- (B) A false negative result نتيجة سلبية كاذبة
- (C) Always a correct result نتيجة صحيحة دائماً
- (D) No result لا نتيجة

EN The window period can range from:

Q4

AR س4. قد تتراوح فترة النافذة من:

A A few days to several weeks

بضعة أيام إلى عدة أسابيع

B Minutes to hours

دقائق إلى ساعات

C 5 to 10 years

5 إلى 10 سنوات

D Exactly one month

شهر واحد بالضبط

EN Donor selection is based on:

Q5

AR س5. يعتمد اختيار المتبرع على:

A Blood group only

فصيلة الدم فقط

B Age only

العمر فقط

C The donor's wish only

رغبة المتبرع فقط

D Medical history and physical examination on the day of donation

التاريخ المرضي والفحص البدني في يوم التبرع

EN The approximate volume of a whole blood donation is:

Q6

AR س6. الحجم التقريبي لتبرع الدم الكامل هو:

A 250 mL

250 مل

B 450 mL

450 مل

C 1000 mL

1000 مل

D 100 mL

100 مل

EN The accepted age range for blood donors is:

Q7

AR س7. مدى العمر المقبول للمتبرعين:

A 17-70 years (maximum 65 at first donation)

17-70 سنة (65 حداً أقصى عند أول تبرع)

B 12-60 years

12-60 سنة

C 18-50 years

18-50 سنة

D 21-80 years

21-80 سنة

EN The minimum weight for a blood donor is:

Q8

AR س8. الوزن الأدنى للمتبرع:

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| ☐ A 40 kg | 40 كغم | ☐ B 45 kg | 45 كغم |
| ☐ C 50 kg | 50 كغم | ☐ D 70 kg | 70 كغم |

EN The minimum Hb for female donors is:

Q9

AR س9. الحد الأدنى للهيموغلوبين للمتبرعات:

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| ☐ A 10 g/dL | 10 غ/دل | ☐ B 11 g/dL | 11 غ/دل |
| ☐ C 13 g/dL | 13 غ/دل | ☐ D 12 g/dL | 12 غ/دل |

EN The minimum interval between whole blood donations is:

Q10

AR س10. أقل فاصل بين تبرعات الدم الكامل:

- | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------|
| ☐ A 4 weeks | 4 أسابيع | ☐ B 12 weeks | 12 أسبوعاً |
| ☐ C 1 year | سنة | ☐ D 2 weeks | أسبوعان |

EN The maximum number of whole blood donations per year is:

Q11

AR س11. الحد الأقصى لتبرعات الدم الكامل في السنة:

- | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|
| ☐ A Three | ثلاثة | ☐ B Six | ستة |
| ☐ C Twelve | اثنا عشر | ☐ D Twenty-four | أربعة وعشرون |

EN Apheresis for platelets or plasma is allowed up to:

Q12

AR س12. يُسمح بفصادة الصفائح أو البلازما حتى:

- | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ☐ A 3 times in 12 months | 3 مرات في 12 شهراً | ☐ B 6 times in 12 months | 6 مرات في 12 شهراً |
| ☐ C 24 times in 12 months | 24 مرة في 12 شهراً | ☐ D Once a year | مرة في السنة |

EN Persons with HBV, HCV or HIV infection are:

Q13

AR س13. الأشخاص المصابون بعدوى HBV أو HCV أو HIV:

- (A) Deferred 1 year يؤجلون سنة (B) Deferred 6 months يؤجلون 6 أشهر
(C) Accepted after treatment يُقبلون بعد العلاج (D) Permanently deferred يؤجلون نهائياً

EN A donor with a history of syphilis is accepted:

Q14

AR س14. يُقبل المتبرع الذي لديه تاريخ زهري:

- (A) 12 months after completion of therapy بعد 12 شهراً من إكمال العلاج
(B) Immediately فوراً (C) After 2 years بعد سنتين
(D) Never أبداً

EN Confirmed brucellosis: the donor is rejected for at least:

Q15

AR س15. داء البروسيلات المؤكّد: يُرفض المتبرع مدة لا تقل عن:

- (A) One week أسبوع (B) Two years after full recovery سنتين بعد الشفاء التام
(C) Three months ثلاثة أشهر (D) Six months ستة أشهر

EN Malaria: the donor is deferred until symptom-free and off treatment for:

Q16

AR س16. الملاريا: يؤجل المتبرع حتى يكون بلا أعراض ومنقطعاً عن العلاج مدة:

- (A) 3 weeks 3 أسابيع (B) 6 months 6 أشهر
(C) 3 years 3 سنوات (D) 1 year سنة

EN After dental extraction, a donor can donate after:

Q17

AR س17. بعد قلع الأسنان، يستطيع المتبرع التبرع بعد:

- (A) One week أسبوع (B) Two weeks أسبوعين
(C) Three weeks ثلاثة أسابيع (D) Three months ثلاثة أشهر

EN A resident from Africa is deferred for:

Q18

AR س18. المقيم القادم من أفريقيا يؤجل:

- (A) 1 week أسبوعاً (B) 2 weeks أسبوعين
(C) 1 year سنة (D) 3 months 3 أشهر

EN A history of jaundice defers the donor up to:

Q19

AR س19. تاريخ اليرقان يؤجل المتبرع حتى:

- (A) 8 weeks 8 أسابيع (B) 1 year سنة
(C) 3 years 3 سنوات (D) Permanently نهائياً

EN Measles, mumps or chicken pox: the donor is deferred for:

Q20

AR س20. الحصبة أو النكاف أو جدري الماء: يؤجل المتبرع:

- (A) 1 week أسبوعاً (B) 1 year سنة
(C) 8 weeks 8 أسابيع (D) 6 months 6 أشهر

EN After a major operation, donors are accepted:

Q21

AR س21. بعد عملية كبرى، يُقبل المتبرعون:

- (A) One year after recovery بعد سنة من الشفاء
(B) Six months after recovery بعد ستة أشهر من الشفاء
(C) One month after recovery بعد شهر من الشفاء
(D) Immediately فوراً

EN Tattooing and acupuncture are treated like minor operations, so the deferral is: Q22

س22. يُعامل الوشم والوخز بالإبر معاملة العمليات الصغرى، لذا يكون التأجيل:

- | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| ☐ A One week | أسبوعاً | ☐ B One year | سنة |
| ☐ C Six months | ستة أشهر | ☐ D Permanent | نهائياً |

EN A donor who received a blood transfusion is deferred for: Q23

س23. المتبرع الذي تلقى نقل دم يؤجل:

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| ☐ A 3 days | 3 أيام | ☐ B 12 months | 12 شهراً |
| ☐ C 8 weeks | 8 أسابيع | ☐ D 3 years | 3 سنوات |

EN Aspirin within three days before donation prevents using the donor as a source of: Q24

س24. تناول الأسبرين خلال ثلاثة أيام قبل التبرع يمنع استعمال المتبرع مصدراً لـ:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| ☐ A Plasma | البلازما | ☐ B Red cells | الكريات الحمر |
| ☐ C Whole blood | الدم الكامل | ☐ D Platelets | الصفائح الدموية |

EN The donor's temperature must not exceed: Q25

س25. يجب ألا تتجاوز حرارة المتبرع:

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| ☐ A 37.5 °C | 37.5 °م | ☐ B 38.5 °C | 38.5 °م |
| ☐ C 36.0 °C | 36.0 °م | ☐ D 39 °C | 39 °م |

EN The donor's pulse should be between: Q26

س26. يجب أن يكون نبض المتبرع بين:

- | | | | |
|---|----------------------|--|---------------------|
| ☐ A 40 and 60 beats/min | 40 و 60 نبضة/دقيقة | ☐ B 50 and 100 beats/min | 50 و 100 نبضة/دقيقة |
| ☐ C 100 and 120 beats/min | 100 و 120 نبضة/دقيقة | ☐ D 30 and 50 beats/min | 30 و 50 نبضة/دقيقة |

2

True / False

صح أو خطأ

EN Appropriate donor selection procedures reduce transfusion-transmitted infection. 1

True • صح

False • خطأ

AR إجراءات اختيار المتبرع المناسبة تقلل العدوى المنتقلة بالدم.

EN During the window period, tests always detect the infection. 2

True • صح

False • خطأ

AR خلال فترة النافذة تكشف الفحوص العدوى دائماً.

EN Donor selection is done on the day of donation. 3

True • صح

False • خطأ

AR يُجرى اختيار المتبرع في يوم التبرع.

EN Lactating women are excluded because of high iron requirements. 4

True • صح

False • خطأ

AR تُستبعد المرضعات بسبب حاجتهن العالية إلى الحديد.

EN Tuberculosis patients may be accepted two years after cure. 5

True • صح

False • خطأ

AR قد يُقبل مرضى السل بعد سنتين من الشفاء.

EN Diphtheria and typhoid require a deferral of three months. 6

True • صح

False • خطأ

AR يتطلب الخناق والتيفوئيد تأجيلًا ثلاثة أشهر.

EN Persons who received killed vaccines are acceptable if symptom-free and afebrile. 7

True • صح

False • خطأ

AR يُقبل الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مقتولة إذا كانوا بلا أعراض وبلا حمى.

EN Menstruation is a cause for deferral. 8

True • صح

False • خطأ

AR الحيض سبب للتأجيل.

EN After a 2nd or 3rd trimester abortion, donation is deferred 6 months. 9

True • صح

False • خطأ

AR بعد الإجهاض في الثلث الثاني أو الثالث يؤجل التبرع 6 أشهر.

EN Repeat donors may be required to show an ID card. 10

True • صح

False • خطأ

AR قد يُطلب من المتبرعين المتكررين إبراز بطاقة الهوية.

EN A donor who appears to be under the influence of alcohol should be accepted. 11

True • صح

False • خطأ

AR يجب قبول المتبرع الذي يبدو تحت تأثير الكحول.

EN The minimum weight of a donor is 40 kg. 12

True • صح

False • خطأ

AR الوزن الأدنى للمتبرع 40 كغم.

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

AR اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Syphilis and brucellosis have the same deferral period. Correct? 1

AR للزهري وداء البروسيلات مدة التأجيل نفسها. هل هذا صحيح؟

EN Malaria and tuberculosis are both deferred for two years. Correct? 2

AR تؤجل الملاريا والسل كلاهما سنتين. هل هذا صحيح؟

EN Jaundice and measles share the same deferral. Correct? 3

AR لليرقان والحصبة التأجيل نفسه. هل هذا صحيح؟

EN Major and minor operations both defer the donor for one year. Correct?

4

AR العمليات الكبرى والصغرى كلاهما تؤجل المتبرع سنة. هل هذا صحيح؟

EN Aspirin excludes the donor from all blood donation. Correct?

5

AR الأسبرين يمنع المتبرع من كل أنواع التبرع. هل هذا صحيح؟

EN The Hb limit is the same for men and women. Correct?

6

AR حد الهيموغلوبين واحد للرجال والنساء. هل هذا صحيح؟

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define the window period and explain its importance.

1

AR عرّف فترة النافذة وشرح أهميتها.

EN What two questions do the medical history and physical examination answer?

2

AR ما السؤالان اللذان يجيب عنهما التاريخ المرضي والفحص البدني؟

EN List the donor selection criteria (age, weight, Hb, interval).

3

AR عدّد معايير اختيار المتبرع (العمر، الوزن، الهيموغلوبين، الفاصل).

AR

EN List the temporary deferrals and their periods.

4

AR عدّد حالات التأجيل المؤقت ومددها.

AR

EN What does the physical examination of the donor include?

5

AR ماذا يشمل الفحص البدني للمتبرع؟

AR

5

Answer Key

الاحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 B	4 A	5 D	6 B	7 A	8 C
9 D	10 B	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 A	18 D	19 B	20 C	21 A	22 C	23 B	24 D
25 A	26 B						

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True

2 False

3 True

4 True

5 True

6 False

7 True

8 False

9 True

10 True

11 False

12 False

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN No. Syphilis → accepted **12 months** after therapy; brucellosis → rejected at least **two years** after recovery. 1

AR لا. الزهري ← يُقبل بعد **12 شهراً** من العلاج؛ البروسيلات ← يُرفض **سنتين** على الأقل بعد الشفاء.

EN No. Tuberculosis → **two years** after cure; malaria → **3 years** symptom-free and off treatment. 2

AR لا. السل ← **سنتين** بعد الشفاء؛ الملاريا ← **3 سنوات** بلا أعراض ومن دون علاج.

EN No. Jaundice → up to **1 year**; measles / mumps / chicken pox → **8 weeks**. 3

AR لا. اليرقان ← حتى **سنة**؛ الحصبة/النكاف/جدري الماء ← **8 أسابيع**.

EN No. Major → **one year**; minor (including acupuncture, tattooing) → **six months**. 4

AR لا. الكبرى ← **سنة**؛ الصغرى (ومنها الوخز بالإبر والوشم) ← **ستة أشهر**.

EN No. It only precludes use of the donor as a source of **platelet** preparation (within three days). 5

AR لا. يمنع فقط استعمال المتبرع مصدراً لتحضير **الصفائح** (خلال ثلاثة أيام).

EN No. Men > **13 g/dL**; women > **12 g/dL**. 6

AR لا. الرجال أكثر من **13 غ/دل**؛ النساء أكثر من **12 غ/دل**.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Define the window period and explain its importance.

1

The interval between initial exposure to a pathogen and the time a test can reliably detect the infection (few days to several weeks). A test may give a false negative result though the infection is present, so donor screening must identify potentially infectious donors in this period.

AR المدة بين التعرض الأول للممرض ووقت إمكان كشف العدوى بالفحص بصورة موثوقة (من أيام إلى أسابيع). قد يعطي الفحص نتيجة سلبية كاذبة مع وجود العدوى، لذا يجب أن يكشف تحري المتبرعين المعدن المحتملين في هذه المدة.

EN What two questions do the medical history and physical examination answer?

2

- (1) Will a donation of approximately 450 mL of whole blood be harmful to the donor?
- (2) Could blood drawn from this donor at this time potentially transmit a disease to the recipient?

AR (1) هل سيضرّ التبرع بنحو 450 مل من الدم الكامل بالمتبرع؟ (2) هل يمكن أن ينقل الدم المسحوب من هذا المتبرع الآن مرضاً إلى المستلم؟

EN List the donor selection criteria (age, weight, Hb, interval).

3

Age 17–70 (max 65 at first donation); weight > 50 kg; Hb > 13 g/dL men, > 12 g/dL women; interval 12 weeks (16 advised), max three donations per year; apheresis up to 24 times in 12 months.

AR العمر 17–70 (65 حداً أقصى أول مرة)؛ الوزن أكثر من 50 كغم؛ الهيموغلوبين أكثر من 13 للرجال و12 للنساء؛ الفاصل 12 أسبوعاً (يُنصح بـ 16)، وثلاثة تبرعات سنوياً حداً أقصى؛ الفصادة حتى 24 مرة في 12 شهراً.

EN

List the temporary deferrals and their periods.

4

Dental extraction 1 week; diphtheria & typhoid 2 weeks; viral or bacterial infection 3 weeks; resident from Africa 3 months; measles/mumps/chicken pox 8 weeks; jaundice up to 1 year; transfusion 12 months; minor surgery 6 months; major surgery 1 year.

AR قلع الأسنان أسبوع؛ الخناق والتيفوئيد أسبوعان؛ العدوى الفيروسية أو البكتيرية 3 أسابيع؛ المقيم من أفريقيا 3 أشهر؛ الحصبة/النكاف/جدري الماء 8 أسابيع؛ اليرقان حتى سنة؛ نقل الدم 12 شهراً؛ الجراحة الصغرى 6 أشهر؛ الكبرى سنة.

EN

What does the physical examination of the donor include?

5

General appearance and skin lesions; temperature $\leq 37.5^{\circ}\text{C}$; pulse 50–100 beats/min with no pathologic irregularity; blood pressure within normal; weight ≥ 50 kg; Hb > 13.0 g/dl males and > 12.0 g/dl females.

AR المظهر العام والآفات الجلدية؛ الحرارة لا تتجاوز 37.5°C ؛ النبض 50–100 نبضة/دقيقة بلا عدم انتظام مرضي؛ ضغط الدم طبيعي؛ الوزن 50 كغم على الأقل؛ الهيموغلوبين أكثر من 13.0 للذكور و12.0 للإناث.