Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 5 · المحاضرة 5

داء بهجت — بنك الأسئلة

Behcet's Disease — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

LEC 5

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and etiology — التعريف والسببيات

Q1 EN **Behcet's disease is a form of:**

AR س1. داء بهجت شكل من:

A Vasculitis — التهاب الأوعية
B Arthritis only — التهاب المفاصل فقط
C Nephritis — التهاب الكلية
D Hepatitis — التهاب الكبد

Q2 EN **The triad of Behcet's disease includes all EXCEPT:**

AR س2. يشمل ثالوث داء بهجت كل ما يأتي عدا:

A Oral aphthous ulcers — قرح فموية قلاعية
B Genital ulcers — قرح تناسلية
C Dry mouth — جفاف الفم
D Uveitis — التهاب العنبية

Q3 EN **Behcet's disease is associated with:**

AR س3. يرتبط داء بهجت بـ:

A HLA-B27
B HLA-B51
C HLA-DR4
D HLA-DQ2

Q4 EN **A rare manifestation of Behcet's disease is:**

AR س4. من المظاهر النادرة لداء بهجت:

A Oral ulcers — قرح الفم
B Uveitis — التهاب العنبية
C Genital ulcers — القرح التناسلية
D Vasculitis of the pulmonary vessels — التهاب الأوعية الرئوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the pathogenesis figure, the inflammatory cytokines secreted are:** Q5

AR س5. في شكل الإمراضية تكون السيتوكينات الالتهابية المفرزة:

A IL8 and TNF-α — IL8 وTNF-α
B IL-4 and IL-5 — IL-4 وIL-5
C IL-10 and TGF-β — IL-10 وTGF-β
D IFN-α

Risk factors — عوامل الخطورة

EN **Behcet's disease most commonly affects people in their:** Q6

AR س6. يصيب داء بهجت غالبًا من هم في:

A Childhood — الطفولة
B 60s and 70s — الستينيات والسبعينيات
C 20s, 30s and 40s — العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات
D Infancy — الرضاعة

EN **When Behcet's occurs at an earlier age, it tends to be:** Q7

AR س7. عندما يحدث بهجت في سن مبكرة يميل إلى أن يكون:

A Milder — أخف
B Self-limited — محدودًا ذاتيًا
C Asymptomatic — بلا أعراض
D More severe — أشد

EN **Behcet's disease is usually more severe in:** Q8

AR س8. داء بهجت عادةً أشد عند:

A Women — النساء
B Men — الرجال
C Children — الأطفال
D Elderly women — المسنّات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which country is mentioned among those with higher risk:** Q9

AR س9. أي بلد ذُكر ضمن الأعلى خطورة:

A Iraq العراق
B Brazil البرازيل
C Canada كندا
D Australia أستراليا

Clinical features المظاهر السريرية

EN **The most common sign of Behcet's disease is:** Q10

AR س10. أكثر علامات داء بهجت شيوعًا:

A Uveitis التهاب العنبية
B Painful mouth sores قرح فموية مؤلمة
C Knee swelling تورّم الركبة
D Stroke السكتة

EN **Mouth sores in Behcet's usually heal in:** Q11

AR س11. تلتئم قرح الفم في بهجت عادةً خلال:

A 1–2 days 1–2 يوم
B 2 months شهرين
C 7 to 21 days 7 إلى 21 يومًا
D They never heal لا تلتئم

EN **Skin lesions in Behcet's may include:** Q12

AR س12. قد تشمل الآفات الجلدية في بهجت:

A Vitiligo البهاق
B Butterfly rash طفحًا فراشيًا
C Psoriatic plaques لويحات صدفية
D Acne-like sores and nodules on the lower legs قرحًا شبيهة بحب الشباب وعقيدات على الساقين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Genital sores in Behcet's most commonly occur on:** Q13

AR س13. تحدث القرح التناسلية في بهجت غالبًا على:

A The penis shaft جسم القضيب
B The scrotum or the vulva الصفن أو الفرج
C The cervix عنق الرحم
D The urethra الإحليل

EN **The eye involvement in Behcet's disease is called:** Q14

AR س14. إصابة العين في داء بهجت تُسمّى:

A Keratitis التهاب القرنية
B Cataract الساد
C Uveitis التهاب العنبية
D Glaucoma الزرق

EN **The joint most commonly affected in Behcet's disease is the:** Q15

AR س15. المفصل الأكثر إصابة في داء بهجت:

A Knee الركبة
B Hip الورك
C Shoulder الكتف
D Wrist الرسغ

Diagnosis التشخيص

EN **The diagnosis of Behcet's disease is:** Q16

AR س16. تشخيص داء بهجت:

A By a specific serological test بفحص مصلي نوعي
B By HLA typing only بتحديد HLA فقط
C By biopsy only بالخزعة فقط
D Entirely clinical سريري بالكامل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **During an acute attack, all of the following may be elevated EXCEPT:** Q17

AR س17. خلال النوبة الحادة قد يرتفع كل ما يأتي عدا:

A CRP

B ESR

C A specific Behcet autoantibody ضد ذاتي نوعي لبهجت

D Leukocyte count عدد الكريات البيض

EN **The required major criterion is recurrent oral ulceration at least:** Q18

AR س18. المعيار الرئيس المطلوب تقرّح فموي متكرّر على الأقل:

A Three times in one year ثلاث مرات في السنة

B Once a year مرة في السنة

C Monthly شهريًا

D Twice in a lifetime مرتين في العمر

EN **In addition to oral ulcers, patients must present:** Q19

AR س19. إضافةً إلى قرح الفم يجب أن يُظهر المريض:

A Any one criterion معيارًا واحدًا

B Any two of the other criteria اثنين من المعايير الأخرى

C All other criteria كل المعايير الأخرى

D A positive ANA ANA موجبًا

EN **The pathergy test is read:** Q20

AR س20. يُقرأ اختبار الباثيرجي:

A Immediately فورًا

B After 2 hours بعد ساعتين

C After one week بعد أسبوع

D Two days later بعد يومين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A positive pathergy test shows:** Q21

AR س21. يُظهر اختبار الباثيرجي الموجب:

A No change لا تغيير

B A small red bump where the needle was inserted نتوءة حمراء صغيرة مكان الإبرة

C Bleeding نزفًا

D A blister far from the site فقاعة بعيدة عن الموضع

EN **Eye lesions as a criterion must be observed by:** Q22

AR س22. يجب أن يلاحظ الآفات العينية بوصفها معيارًا:

A An ophthalmologist طبيب العيون

B The patient المريض

C A dermatologist طبيب الجلدية

D A nurse ممرض

2 True / False صح أو خطأ

EN Behcet's disease is a rare, chronic, lifelong disorder. 1

AR داء بهجت اضطراب نادر مزمن يدوم مدى الحياة. True · صح False · خطأ

EN Behcet's disease affects women slightly more than men. 2

AR يصيب داء بهجت النساء أكثر قليلًا من الرجال. True · صح False · خطأ

EN The etiology of Behcet's disease is well known. 3

AR سبب داء بهجت معروف جيدًا. True · صح False · خطأ

EN HLA-B51 is associated with a higher risk of Behcet's. 4

AR يرتبط HLA-B51 بخطر أعلى لداء بهجت. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Children and older adults cannot develop Behcet's disease.
AR لا يمكن أن يصاب الأطفال وكبار السن بداء بهجت.
True · صح False · خطأ

6
EN Mouth sores in Behcet's recur.
AR تتكرّر قرح الفم في بهجت.
True · صح False · خطأ

7
EN Uveitis may cause redness, pain and blurred vision.
AR قد يسبّب التهاب العنبية الاحمرار والألم وتشوّش الرؤية.
True · صح False · خطأ

8
EN Behcet's disease may cause stroke.
AR قد يسبّب داء بهجت السكتة الدماغية.
True · صح False · خطأ

9
EN There is a specific diagnostic laboratory test for Behcet's disease.
AR يوجد فحص مختبري تشخيصي نوعي لداء بهجت.
True · صح False · خطأ

10
EN Laboratory findings in Behcet's are nonspecific.
AR الموجودات المختبرية في بهجت غير نوعية.
True · صح False · خطأ

11
EN A positive pathergy test indicates an immune overreaction to minor injury.
AR يدل اختبار الباثيرجي الموجب على فرط تفاعل مناعي مع إصابة بسيطة.
True · صح False · خطأ

12
EN Recurrent genital ulceration is the mandatory major criterion.
AR التقرّح التناسلي المتكرّر هو المعيار الرئيس الإلزامي.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Which criterion is mandatory?
AR أي معيار إلزامي؟

2
EN More common or more severe in men?
AR أكثر شيوعًا أم أشد عند الرجال؟

3
EN Earlier age — milder or more severe?
AR سن مبكرة — أخف أم أشد؟

4
EN HLA-B51 or HLA-B27?
AR HLA-B51 أم HLA-B27؟

5
EN When is the pathergy test read?
AR متى يُقرأ اختبار الباثيرجي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define Behcet's disease and its triad of symptoms.

AR عرّف داء بهجت وثالوث أعراضه.

2 EN List the risk factors for Behcet's disease.

AR عدّد عوامل خطورة داء بهجت.

3 EN List the clinical features of Behcet's disease.

AR عدّد المظاهر السريرية لداء بهجت.

4 EN State the International Clinical Criteria for Behcet's disease.

AR اذكر المعايير السريرية الدولية لداء بهجت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the pathergy test. 5

AR صف اختبار الباثيرجي.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 B	4 D	5 A	6 C	7 D	8 B
9 A	10 B	11 C	12 D	13 B	14 C	15 A	16 D
17 C	18 A	19 B	20 D	21 B	22 A		

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 True	9 False	10 True	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN Recurrent oral ulceration at least 3 times in one year — plus any two of: genital ulcers, eye lesions, skin lesions, positive pathergy test. 1

AR التقرّح الفموي المتكرّر 3 مرات على الأقل في السنة — مع أي اثنين من: القرح التناسلية، الآفات العينية، الآفات الجلدية، الباثيرجي الموجب.

EN Both in this lecture: slightly more men are affected, and the disease is usually more severe in men. 2

AR كلاهما في المحاضرة: يصيب الرجال أكثر قليلًا، وهو عادةً أشد عندهم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN More severe. 3

AR أشد.

EN Behcet's disease is associated with HLA-B51. 4

AR يرتبط داء بهجت بـHLA-B51.

EN Two days after inserting a sterile needle; a small red bump = positive. 5

AR بعد يومين من إدخال إبرة معقّمة؛ والنتوءة الحمراء الصغيرة = موجب.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define Behcet's disease and its triad of symptoms.** 1
A rare, chronic, lifelong vasculitis with inflammation of blood vessels throughout the body; triad: aphthous ulceration of the oral mucous membranes and genitalia, and uveitis; associated with HLA-B51.

AR التهاب أوعية نادر مزمن مدى الحياة يصيب الأوعية في أنحاء الجسم؛ ثالوثه: تقرّح قلاعي للمخاطية الفموية والأعضاء التناسلية والتهاب العنبية؛ ويرتبط بـHLA-B51.

EN **List the risk factors for Behcet's disease.** 2
Age (20s–40s; earlier onset is more severe), geography (Middle East and Asia: Turkey, Iran, Iraq, Japan, China), sex (more severe in men), genes (HLA-B51).

AR العمر (20–40؛ البدء المبكر أشد)، الجغرافيا (الشرق الأوسط وآسيا: تركيا وإيران والعراق واليابان والصين)، الجنس (أشد عند الرجال)، الجينات (HLA-B51).

EN **List the clinical features of Behcet's disease.** 3
Mouth (painful sores, most common, heal in 7–21 days and recur), skin (acne-like sores, leg nodules), genitals (scrotum, vulva), eyes (uveitis), joints (knee), vascular (veins and large arteries, clots), digestive (pain, diarrhea, bleeding), brain (headache, fever, disorientation, poor balance, stroke).

AR الفم (قرح مؤلمة، الأكثر شيوعًا)، الجلد، الأعضاء التناسلية، العينان (التهاب العنبية)، المفاصل (الركبة)، الأوعية (خثرات)، الجهاز الهضمي، الدماغ (صداع، حمّى، توهان، سكتة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **State the International Clinical Criteria for Behcet's disease.** 4

Recurrent oral ulcerations (aphthous or herpetiform) at least three times in one year, plus any two of: recurrent genital ulcerations, eye lesions (uveitis or retinal vasculitis) seen by an ophthalmologist, skin lesions, positive pathergy test.

AR تقرّحات فموية متكرّرة (قلاعية أو شبيهة بالهربس) 3 مرات على الأقل في السنة، مع أي اثنين من: تقرّحات تناسلية متكرّرة، آفات عينية يلاحظها طبيب العيون، آفات جلدية، اختبار باثيرجي موجب.

EN **Describe the pathergy test.** 5

A sterile needle is inserted into the skin and the area is examined two days later; a small red bump at the site is positive, indicating an immune overreaction to minor injury.

AR تُدخل إبرة معقّمة في الجلد وتُفحص المنطقة بعد يومين؛ والنتوءة الحمراء الصغيرة موجبة، وتدل على فرط تفاعل مناعي مع إصابة بسيطة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t