Blood Transfusion
نقل الدم

LECTURE 4 · المحاضرة 4

إجراءات الفحص لحماية المتلقّين والمطابقة التصالبية

Screening Measures to Protect Recipients & Cross Matching

المرحلة الرابعة

Theory & Practical · نظري وعملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 4

Screening Measures to Protect Recipients & Cross Matching

إجراءات الفحص لحماية المتلقّين والمطابقة التصالبية

1 Screening Measures to protect recipients — إجراءات الفحص لحماية المتلقّين



Figure 1. Lec. 4 Screening Measures to protect recipients — blood bags

الشكل 1. المحاضرة 4: إجراءات الفحص لحماية المتلقّين — أكياس الدم

EN **Screening Measures to protect recipients includes :**

AR تشمل إجراءات الفحص لحماية المتلقّين:

1. **Donor selection** by taking medical history and physical examination to ensure good health state of donor

   اختيار المتبرّع بأخذ التاريخ المرضي والفحص البدني للتأكّد من حالته الصحية الجيدة

2. **Donor deferral** — تأجيل (استبعاد) المتبرّع
3. **Safest possible sources** of donor — أكثر مصادر المتبرّعين أمانًا
4. **Stringent arm cleaning** — التنظيف الصارم للذراع
5. **Diversion of the first 20-30 ml** of blood collected

   تحويل أول 20–30 مل من الدم المجموع (عدم إدخاله في الكيس)

EN **6. Laboratory testing of donated blood** which includes :

AR 6. الفحص المختبري للدم المتبرَّع به ويشمل:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Microbiological testing** (HIV, HBsAg, HCV Ab, syphilis)

الفحوص الميكروبيولوجية (HBsAg ،HIV، أضداد HCV، الزهري)

2. **Immunohematological testing** of donations.

الفحوص المناعية الدموية للتبرّعات.

EN **7. Post collection Blood component processing** which includes :

AR **7. معالجة مكوّنات الدم بعد الجمع** وتشمل:

1. **Leukodepletion** of cellular products by removing white blood cells to reduced risk of **alloimmunization and CMV Transmission**.

إزالة الكريات البيض من المنتجات الخلوية لتقليل خطر **التمنيع الخيفي (التحسّس المناعي) ونقل فيروس CMV**.

2. **Pathogen inactivation technologies** used for **platelets and plasma** like **UV light, photosensitization** to inactivate virus and bacteria.

تقنيات تعطيل الممرضات للصفائح والبلازما مثل **الأشعة فوق البنفسجية والتحسيس الضوئي** لتعطيل الفيروسات والبكتيريا.

EN **8. Blood typing and cross-matching** by doing :

AR **8. تحديد فصيلة الدم والمطابقة التصالبية** بإجراء:

1. **ABO & Rh typing** to prevent hemolytic reactions

تحديد فصيلة ABO وRh لمنع التفاعلات الانحلالية

2. **Antibody screening** detects unexpected antibodies that may cause reaction

تحرّي الأضداد يكشف الأضداد غير المتوقّعة التي قد تسبّب تفاعلًا

3. **Cross matching** : test the compatibility between donor & recipient blood.

المطابقة التصالبية: فحص التوافق بين دم المتبرّع ودم المتلقّي.

EN **9. Monitoring and testing for bacterial contamination**

AR **9. مراقبة التلوّث البكتيري وفحصه**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

We should know that : يجب أن نعرف:

Paid donor is risky because they may hiding medical history for payment.

المتبرّع المدفوع الأجر خطِر لأنه قد يخفي تاريخه المرضي من أجل المال.

The microbiological safety of donations from **paid donors (remunerated)** is **inferior**, and stringent post donation testing and viral inactivation, are required.

السلامة الميكروبيولوجية لتبرّعات **المتبرّعين المدفوعي الأجر أدنى**، ويلزم فحص صارم بعد التبرّع وتعطيل للفيروسات.

EN **Methods of viral inactivation :**

AR **طرائق تعطيل الفيروسات:**

1. **Heat Treatment :** Prolonged heat treatment by heating the plasma product at **60 °C for 10 hr**.

   المعالجة الحرارية: معالجة حرارية مطوّلة بتسخين منتج البلازما بدرجة **60 مْ لمدة 10 ساعات.**

2. **Solvent/ Detergent treatment:** Viral inactivation methods of plasma by adding products like **methylene blue, solvent-detergent** are effective means of protecting **hemophiliacs** from infection

   المعالجة بالمذيب/المنظّف: طرائق تعطيل الفيروسات في البلازما بإضافة منتجات مثل **أزرق المثيلين والمذيب-المنظّف** وسيلة فعّالة لحماية **مرضى الناعور (الهيموفيليا)** من العدوى.

3. **Ultraviolet (UV) light irradiation.** **التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية.**

In short باختصار

Recipient protection: donor selection, deferral, safest sources, arm cleaning, **diversion of first 20–30 ml**, lab testing, processing, typing & cross match, bacterial monitoring.

حماية المتلقّي: اختيار المتبرّع، التأجيل، أأمن المصادر، تنظيف الذراع، **تحويل أول 20–30 مل**، الفحص المختبري، المعالجة، الفصيلة والمطابقة، مراقبة التلوّث.

Microbiology: **HIV, HBsAg, HCV Ab, syphilis**; **paid donors are risky**.

الفحوص الميكروبيولوجية: **HIV وHBsAg وأضداد HCV والزهري**؛ **المتبرّع المدفوع خطِر.**

Leukodepletion ↓ alloimmunization and CMV; viral inactivation: **heat 60 °C/10 h**, solvent/detergent, methylene blue, UV.

إزالة البيض تقلّل التمنيع الخيفي وCMV؛ تعطيل الفيروسات: **حرارة 60 مْ/10 ساعات**، المذيب/المنظّف، أزرق المثيلين، الأشعة فوق البنفسجية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Risk of long incubation period viruses خطر الفيروسات ذات فترة الحضانة الطويلة

EN **Viruses** that pose the **greatest potential risk** for transmission by transfusion are those that have **long incubation periods** (often causing subclinical infection), and especially those that may be carried by a symptomatic individuals for many years, or even lifelong.

AR **الفيروسات** الأكثر خطورة في الانتقال بنقل الدم هي ذات **فترات الحضانة الطويلة** (وغالبًا تسبّب عدوى تحت سريرية)، ولا سيما التي قد يحملها أفراد بلا أعراض سنوات طويلة أو مدى الحياة.

EN More rarely, a few viruses causing **acute infection** can be transmitted in the short **pre-symptomatic viremia phase**.

AR وبصورة أندر، قد تنتقل بعض الفيروسات المسبّبة لـ**عدوى حادة** في **طور التفيرس القصير الذي يسبق الأعراض**.

Such agents pose a risk only if recipients have not been previously infected and donors have become infected during an **epidemic period (e.g. parvovirus B19)** or after visiting **endemic countries (e.g. hepatitis A)**.

ولا تشكّل هذه العوامل خطرًا إلا إذا لم يُصب المتلقّون سابقًا، وأُصيب المتبرّعون خلال **فترة وباء (مثل البارفوفيروس B19)** أو بعد زيارة **بلدان متوطّنة (مثل التهاب الكبد A)**.

Theoretically, **influenza** and **severe acute respiratory syndrome (SARS)** may also pose a potential risk.

ونظريًا قد تشكّل **الإنفلونزا** و**المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS)** خطرًا محتملًا أيضًا.

EN **Bacteria**, especially **skin contaminants** and **blood-borne parasites**, are also potentially transmissible by blood transfusion.

AR و**البكتيريا**، ولا سيما **ملوّثات الجلد**، و**الطفيليات المنقولة بالدم** قابلة أيضًا للانتقال بنقل الدم.

In short باختصار

Greatest risk: viruses with **long incubation**; acute ones only in **pre-symptomatic viremia** (parvovirus B19, hepatitis A).

أكبر خطر: فيروسات **الحضانة الطويلة**؛ والحادة فقط في **طور التفيرس قبل الأعراض** (B19، التهاب الكبد A).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Recipients' blood specimen testing فحص عيّنة دم المتلقّي

1. Evaluation of specimen for testing suitability تقييم صلاحية العيّنة للفحص
2. ABO group . فصيلة ABO.
3. Rh type . نوع Rh.
4. Screening for unexpected antibodies to red cell antigens
   تحرّي الأضداد غير المتوقّعة ضد مستضدات الكريات الحمر
5. Antibody identification if unexpected antibodies are detected
   تحديد هوية الضد إذا كُشفت أضداد غير متوقّعة
6. Comparison of current and previous test results, and any discrepancies shall be investigated and appropriate action taken before a unit is issued for transfusion
   مقارنة نتائج الفحص الحالية بالسابقة، والتحقيق في أي اختلاف واتخاذ الإجراء المناسب قبل صرف الوحدة للنقل

EN **Donor Blood unit testing:**

AR **فحص وحدة دم المتبرّع:**

1. **ABO group confirmation** and **Rh type confirmation** .
   تأكيد فصيلة ABO وتأكيد نوع Rh.
2. Donor red blood cell unit selected as ABO group and Rh type that are **compatible** with the transfusion recipient.
   اختيار وحدة كريات حمر من متبرّع بفصيلة ABO ونوع Rh **متوافقين** مع المتلقّي.
3. **Compatibility testing (cross match)** **فحص التوافق (المطابقة التصالبية)**
4. **Labeling** of blood or blood components with the recipient's identifying information and issue
   وضع ملصق على الدم أو مكوّناته بمعلومات هوية المتلقّي ثم صرفه



Figure 2. Donor blood unit
الشكل 2. وحدة دم المتبرّع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

How to avoid misidentification ?
كيف نتجنّب الخطأ في تحديد الهوية؟

EN In order to prevent **patient misidentification** and administration failures, most institutions require patients to wear a **facility-generated ID wristband** upon admission until discharge.

AR لمنع **الخطأ في تحديد هوية المريض** وأخطاء الإعطاء، تشترط معظم المؤسسات أن يرتدي المريض **سوار تعريف تصدره المؤسسة** من الدخول حتى الخروج.

This wristband must contain **two unique identifiers**, typically the patient's **first and last names** and **date of birth or medical record number**

ويجب أن يحتوي **مُعرِّفين فريدين**، عادةً **الاسم الأول والأخير** و**تاريخ الميلاد أو رقم السجل الطبي**.



Figure 3. ID wristband
الشكل 3. سوار التعريف

In short باختصار

ID wristband: **two unique identifiers** (name + date of birth or record number).

سوار التعريف: **مُعرِّفان فريدان** (الاسم + تاريخ الميلاد أو رقم السجل).

4 What to be expected if incompatibility occur to recipient ?? ماذا نتوقّع إذا حدث عدم توافق للمتلقّي؟

What to be expected if : ABO incompatibility occur to recipient ?? ماذا نتوقّع إذا حدث عدم توافق ABO للمتلقّي؟

EN **Recipient antibodies attack the donor RBC**

AR تهاجم أضداد المتلقّي كريات المتبرّع الحمر

1. Cause: ABO incompatibility — السبب: **عدم توافق ABO**
2. Occur inside the circulation (Intravascular hemolysis) — يحدث **داخل الدوران** (**انحلال داخل الأوعية**)
3. It is usually sever . — وهو عادةً **شديد**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The antibodies of the recipient (**IgM**) are very strong and call the complements to complete the reaction (Massive activation of complement can cause shock) with signs of hemolysis which manifested by:

AR أضداد المتلقّي (IgM) قوية جدًا وتستدعي **المتمّمة** لإكمال التفاعل (**والتنشيط الهائل للمتمّمة قد يسبّب صدمة**) مع علامات انحلال تظهر بـ:

1. Low Hb, High Reticulocytes count . — انخفاض Hb، وارتفاع عدد **الخلايا الشبكية**.
2. Hemoglobinuria, Hemoglobinemia . — **بيلة هيموغلوبينية**، و**تدمّي هيموغلوبيني** (هيموغلوبين في الدم).
3. Increase bilirubin, Low Haptoglobin — ارتفاع **البيليروبين**، وانخفاض **الهابتوغلوبين**

What to be expected if : Rh incompatibility occur to recipient ?? **ماذا نتوقّع إذا حدث عدم توافق Rh للمتلقّي؟**

EN **Recipient antibodies attack the donor RBC**

AR **تهاجم أضداد المتلقّي كريات المتبرّع الحمر**

1. Cause: Rh incompatibility — السبب: **عدم توافق Rh**
2. Occur outside the circulation (Extravascular hemolysis) in the liver and spleen (the donor RBCs are removed from the circulation by macrophages in the spleen and liver.

   يحدث **خارج الدوران** (**انحلال خارج الأوعية**) في **الكبد والطحال** (تُزال كريات المتبرّع من الدوران بواسطة **البلاعم في الطحال والكبد**.

   The macrophages destroy the red blood cells inside these organs.)

   وتدمّر البلاعم الكريات الحمر داخل هذين العضوين.)
3. It is not sever case — **ليست حالة شديدة**
4. The recipient antibodies are weak (IgG) — أضداد المتلقّي **ضعيفة (IgG)**
5. No signs of hemolysis — **لا علامات انحلال**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ABO vs Rh incompatibility عدم توافق ABO مقابل Rh

	ABO incompatibility عدم توافق ABO	Rh incompatibility عدم توافق Rh
Site الموقع	Inside the circulation (Intravascular hemolysis) داخل الدوران (انحلال داخل الأوعية)	Outside the circulation (Extravascular hemolysis) in the liver and spleen خارج الدوران (انحلال خارج الأوعية) في الكبد والطحال
Severity الشدّة	It is usually sever شديد عادةً	It is not sever case ليس حالة شديدة
Antibodies الأضداد	IgM — very strong, call the complements (massive activation can cause shock) IgM — قوية جدًا، تستدعي المتمّمة (تنشيطها الهائل قد يسبّب صدمة)	IgG — weak IgG — ضعيفة
Signs of hemolysis علامات الانحلال	Low Hb, High Reticulocytes; Hemoglobinuria, Hemoglobinemia; Increase bilirubin, Low Haptoglobin انخفاض Hb وارتفاع الشبكيات؛ بيلة هيموغلوبينية وتدمّي الهيموغلوبين؛ ارتفاع البيليروبين وانخفاض الهابتوغلوبين	No signs of hemolysis لا علامات انحلال

In short باختصار

ABO incompatibility: intravascular, severe, **IgM** + complement; **Rh**: extravascular (liver, spleen), mild, **IgG**.

عدم توافق ABO: داخل الأوعية، شديد، IgM + متمّمة؛ وRh: خارج الأوعية (الكبد والطحال)، خفيف، IgG.

5 Practical Blood Transfusion 4 — Cross matching and pre-transfusion testing نقل الدم العملي 4 — المطابقة التصالبية وفحوص ما قبل النقل

EN **Cross matching: In vitro** demonstration of **serological compatibility** between the recipients (patients) **serum** and donors **red cells**.

AR **المطابقة التصالبية:** إثبات **التوافق المصلي** خارج الجسم بين **مصل** المتلقّي (المريض) و**كريات** المتبرّع الحمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The aim** is the prevention of **hemolytic transfusion reaction** caused by the administration of incompatible blood.

AR **الهدف** منع **تفاعل النقل الانحلالي** الناتج عن إعطاء دم غير متوافق.

Compatibility testing should be carried out **within 48 hours** before administration of blood to the patient.

ويجب إجراء فحص التوافق **خلال 48 ساعة** قبل إعطاء الدم للمريض.

STEPS IN PRETRANSFUSION TESTING RELEVANT STANDARD(S) خطوات فحوص ما قبل النقل والمعايير ذات الصلة

1. Request for transfusion
1. طلب النقل

→

2. Identification and blood sample collection of transfusion recipient .
2. تحديد هوية المتلقّي وجمع عيّنة دمه.

→

3. Testing of transfusion recipient's blood specimen: ABO group and Rh type • Antibody detection testing • Antibody identification • Comparison of current and previous test results
3. فحص عيّنة دم المتلقّي: فصيلة ABO ونوع Rh • كشف الأضداد • تحديد هوية الأضداد • مقارنة النتائج الحالية بالسابقة

→

4. Donor RBC unit testing: ABO & Rh type group unit confirmation .
4. فحص وحدة كريات المتبرّع: تأكيد فصيلة ABO ونوع Rh للوحدة.

→

5. Donor red cell unit selection: components of ABO group and Rh type compatible with the recipient and with any unexpected allogeneic antibodies
5. اختيار وحدة كريات المتبرّع: مكوّنات بفصيلة ABO ونوع Rh متوافقين مع المتلقّي ومع أي أضداد خيفية غير متوقّعة

→

6. Cross match testing : Serologic • Computer or electronic
6. فحص المطابقة التصالبية: مصلي • حاسوبي أو إلكتروني

→

7. Labeling of blood or blood components with the recipient's identifying information and issue.
7. وضع الملصق على الدم أو مكوّناته بمعلومات هوية المتلقّي ثم صرفه.

Note ملاحظة

In general, recipient should receive **ABO compatible** blood type

عمومًا يجب أن يتلقّى المتلقّي دمًا **متوافقًا في ABO**.

In general, **Rh + recipient should receive Rh+** blood and **Rh -ve recipient must receive Rh –ve** blood.

عمومًا **المتلقّي Rh+ يتلقّى دمًا Rh+**، **والمتلقّي Rh– يجب أن يتلقّى دمًا Rh–**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Suggested ABO Group Selection Order for Transfusion of RBCs الترتيب المقترح لاختيار فصيلة ABO عند نقل الكريات الحمر

Recipient ABO group فصيلة المتلقّي	1st choice الخيار الأول	2nd choice الخيار الثاني	3rd choice الخيار الثالث	4th choice الخيار الرابع
AB	AB	A	B	O
A	A	O		
B	B	O		
O	O			

Principle of the cross matching technique — مبدأ تقنية المطابقة التصالبية

EN The test includes **Major cross matching**, and **Minor cross matching**

AR يتضمّن الفحص **المطابقة التصالبية الكبرى** و**المطابقة التصالبية الصغرى**.

EN **Major cross match:** It involves testing the **donor's red cells with recipient's serum** to determine the presence of any antibody which may cause hemolysis or agglutination of donor red cells.

AR **المطابقة الكبرى:** فحص **كريات المتبرّع الحمر مع مصل المتلقّي** لتحديد وجود أي ضد قد يسبّب انحلال كريات المتبرّع أو تلازنها.

This is **more important than minor cross match**

وهي **أهم من المطابقة الصغرى**.

EN A **control**, recipient's own serum and red cells are also incubated.

AR يُحضَن أيضًا **شاهد** من مصل المتلقّي وكرياته نفسها.

The absence of agglutination in both tests indicated no gross error in the ABO grouping of the recipient and donor has been made and that the presence of allo-or autoantibodies in the recipient serum is unlikely.

وغياب التلازن في الفحصين يدل على عدم وجود خطأ كبير في تحديد فصيلة ABO للمتلقّي والمتبرّع، وعلى أن وجود أضداد خيفية أو ذاتية في مصل المتلقّي غير مرجّح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The donor's and recipient's cells prepared as **5% suspension in saline** at room temperature.

AR تُحضَّر كريات المتبرّع والمتلقّي **معلّقًا بتركيز 5% في المحلول الملحي** بدرجة حرارة الغرفة.




Figure 4. Major cross match: recipient's serum + donor's RBCs

الشكل 4. المطابقة الكبرى: مصل المتلقّي + كريات المتبرّع

Procedure

طريقة العمل

EN The compatibility test is divided into **3 phases**; the **room temperature phase**, the **incubation phase** and the **antiglobulin phase**.

AR يُقسم فحص التوافق إلى **3 أطوار**: **طور حرارة الغرفة**، **وطور الحضن**، **وطور مضاد الغلوبيولين**.

1. The test commences with the addition of the patient's serum to **four tubes (Tube I, II, III and Tube VI)**.

   يبدأ الفحص بإضافة مصل المريض إلى **أربعة أنابيب (I وII وIII وVI)**.

2. Two of these tubes considered as **own control (I&II)**, other tubes **(III&VI)** considered as **test**.

   يُعدّ اثنان منها **شاهدًا ذاتيًا (I وII)**، والآخران (III وVI) **فحصًا**.

3. Add to each of own (I, II) tubes the **recipient's red cell suspension** (5% in normal saline), **two volumes of serum to one volume RBC suspension**.

   أضف إلى كل من أنبوبي الشاهد (I وII) **معلّق كريات المتلقّي** (5% في محلول ملحي فسيولوجي)، **حجمان من المصل إلى حجم واحد من المعلّق**.

4. Add to each of test (III, VI) tubes the **donor's red cell suspension** (5% in normal saline), two volumes of serum to one volume RBC suspension.

   أضف إلى كل من أنبوبي الفحص (III وVI) **معلّق كريات المتبرّع** (5% في محلول ملحي فسيولوجي)، حجمان من المصل إلى حجم من المعلّق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **1. The room temperature phase:** One of the each test and own tube **(Tube I & III)**, kept at **RT, for 30 min**.

AR **1. طور حرارة الغرفة:** يُحفظ أنبوب من كل من الفحص والشاهد (I وIII) **بدرجة حرارة الغرفة 30 دقيقة.**

Then content of each tube are mixed, centrifuged **(1000rpm/30 sec)** and examined for agglutination or haemolysis **macroscopically and microscopically**.

ثم يُمزج محتوى كل أنبوب ويُنبذ **(1000 دورة/دقيقة لمدة 30 ثانية)** ويُفحص للتلازن أو الانحلال **بالعين المجردة وبالمجهر.**

The results should be recorded.

تُسجَّل النتائج.

2

EN **2- The incubation phase:** Add **3 drops of enhancement reagent (Albumin)** to other two tubes **(II, VI)** and incubate at **37°C** water bath or incubator for **30 minutes**.

AR **2- طور الحضن:** أضف **3 قطرات من الكاشف المعزّز (الألبومين)** إلى الأنبوبين الآخرين (II وVI) واحضنهما بدرجة **37 مْ** في حمّام مائي أو حاضنة **30 دقيقة.**

Both tubes are removed after this time and centrifuged and examined macroscopically and microscopically for agglutination and haemolysis.

يُخرج الأنبوبان بعد ذلك ويُنبذان ويُفحصان بالعين المجردة وبالمجهر للتلازن والانحلال.

The results should be recorded

وتُسجَّل النتائج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **3 -The antiglobulin phase:** The antiglobulin phase continues with tubes **(II & VI)**, the contents of this tube are **washed three times (3000rpm/3min)** in large volumes of saline.

AR 3- **طور مضاد الغلوبيولين:** يستمر بالأنبوبين (II وVI)، ويُغسل محتواهما **ثلاث مرات (3000 دورة/دقيقة لمدة 3 دقائق)** بكميات كبيرة من المحلول الملحي.

At the end of the last washing the saline is decanted completely.

في نهاية الغسلة الأخيرة يُسكب المحلول الملحي كليًا.

AHG Serum is added to the sedimented cells.

ويُضاف **مصل مضاد الغلوبيولين البشري (AHG)** إلى الكريات المترسّبة.

The tube is shaken to mix the contents and then centrifuged (reading step).

ويُرجّ الأنبوب للمزج ثم يُنبذ (خطوة القراءة).

The cells are examined both macroscopically and microscopically for agglutination.

تُفحص الكريات بالعين المجردة وبالمجهر للتلازن.

The results should be recorded

وتُسجَّل النتائج.

The three phases at a glance الأطوار الثلاثة باختصار

Phase الطور	Tubes الأنابيب	Conditions الظروف
Room temperature حرارة الغرفة	I & III I وIII	RT 30 min; centrifuge 1000 rpm/30 sec حرارة الغرفة 30 دقيقة؛ نبذ 1000 دورة/دقيقة لمدة 30 ثانية
Incubation الحضن	II & VI II وVI	3 drops albumin; 37°C 30 min 3 قطرات ألبومين؛ 37 مْ لمدة 30 دقيقة
Antiglobulin مضاد الغلوبيولين	II & VI II وVI	Wash ×3 (3000 rpm/3 min); add AHG; centrifuge غسل 3 مرات (3000 دورة/3 دقائق)؛ إضافة AHG؛ نبذ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Minor cross match :** It involves testing of **donor's serum with recipient's red cells** to determine the presence of any antibody which may cause hemolysis or agglutination of recipient's red cells.

AR **المطابقة الصغرى:** فحص **مصل المتبرّع مع كريات المتلقّي الحمر** لتحديد وجود أي ضد قد يسبّب انحلال كريات المتلقّي أو تلازنها.

It is **not carried out as a routine test**, done only in those who reports **history of transfusion reaction**

لا تُجرى فحصًا روتينيًا، بل فقط لمن لديهم **تاريخ تفاعل نقل دم.**




Figure 5. Minor cross match: donor's serum + recipient's RBCs

الشكل 5. المطابقة الصغرى: مصل المتبرّع + كريات المتلقّي

EN **Report of cross matching:** The report of cross matching must contain the following information.

AR **تقرير المطابقة التصالبية:** يجب أن يحتوي التقرير المعلومات الآتية:

1. The name of the patient and number, age, blood group.
   اسم المريض ورقمه وعمره وفصيلة دمه.
2. The number of the donor pint, blood group and expiry date.
   رقم قنينة (وحدة) المتبرّع وفصيلتها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
3. The result of each phase. نتيجة كل طور.
4. The result of compatibility (compatible/incompatible).
   نتيجة التوافق (متوافق/غير متوافق).
5. The date التاريخ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. If **all phases show no agglutination**, the blood is **compatible**.

إذا **لم يظهر تلازن في كل الأطوار** فالدم **متوافق**.

2. If the **auto controls (own) show agglutination**, the patient may suffer from **AIHA (Autoimmune hemolytic anemia) or HDN**, the condition should followed and solved by directed physician.

إذا **أظهر الشاهد الذاتي تلازنًا** فقد يكون المريض مصابًا بـ**فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي (AIHA) أو داء انحلال الدم عند الوليد (HDN)**، وتُتابَع الحالة وتُحل بإشراف الطبيب المختص.

3. In some patients who are on **chronic Tx**, express sensitization to enormous Ags, and shows no compatible unit, in these occasions, the unit which shows **least incompatibility** (the lowest degree of agglutination grading) should be given.

لدى بعض المرضى الذين يتلقّون **نقل دم مزمنًا** ويظهرون تحسّسًا لمستضدات كثيرة ولا تتوافق معهم أي وحدة، تُعطى الوحدة التي تُظهر **أقل عدم توافق** (أدنى درجة تلازن).

Note ملاحظة

Always remember to document your work, in every step.

تذكّر دائمًا أن توثّق عملك في كل خطوة.

Major vs minor cross match المطابقة الكبرى مقابل الصغرى

Test الفحص	Mixes يمزج	When متى
Major cross match المطابقة الكبرى	Recipient's serum + donor's RBCs مصل المتلقّي + كريات المتبرّع	Always — more important دائمًا — الأهم
Minor cross match المطابقة الصغرى	Donor's serum + recipient's RBCs مصل المتبرّع + كريات المتلقّي	Only with history of transfusion reaction فقط عند وجود تاريخ تفاعل نقل
Own (auto) control الشاهد الذاتي	Recipient's serum + recipient's RBCs مصل المتلقّي + كرياته	Agglutination → AIHA or HDN التلازن ← AIHA أو HDN

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Cross match within **48 hours**; **major** = recipient serum + donor cells (more important); **minor** = donor serum + recipient cells.

المطابقة خلال **48 ساعة**؛ **الكبرى** = مصل المتلقّي + كريات المتبرّع (الأهم)؛ **الصغرى** = مصل المتبرّع + كريات المتلقّي.

3 phases: **RT 30 min** (I, III) → **37 °C + albumin 30 min** (II, VI) → **wash ×3 + AHG**; all negative = compatible.

3 أطوار: **حرارة الغرفة 30 دقيقة** (I وIII) ← **37 مْ + ألبومين 30 دقيقة** (II وVI) ← **غسل 3 مرات + AHG**؛ كلها سالبة = متوافق.

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Cross matching	المطابقة التصالبية / فحص التوافق / التطابق المتصالب
Compatibility	التوافق / الملاءمة
Donor deferral	تأجيل المتبرّع / استبعاد المتبرّع مؤقتًا
Remunerated (paid) donor	متبرّع مدفوع الأجر / متبرّع بمقابل
Leukodepletion	إزالة الكريات البيض / ترشيح البيض / إنقاص الكريات البيض
Alloimmunization	التمنيع الخيفي / التحسّس المناعي الخيفي / التمنيع المغاير

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Pathogen inactivation	تعطيل الممرضات / إبطال الممرضات
Viremia	التفيرس / وجود الفيروس في الدم / فيروسية الدم
Incubation period	فترة الحضانة / فترة الكمون
Intravascular hemolysis	انحلال داخل الأوعية / تحلّل دموي داخل الأوعية
Extravascular hemolysis	انحلال خارج الأوعية / تحلّل دموي خارج الأوعية
Haptoglobin	الهابتوغلوبين / الغلوبين الرابط للهيموغلوبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hemoglobinuria	بيلة هيموغلوبينية / الهيموغلوبين في البول
Agglutination	التلازن / التراص / التكتّل
AHG (antihuman globulin)	مضاد الغلوبيولين البشري / كاشف كومبس
Hemophiliac	مريض الناعور / مريض الهيموفيليا / مريض نزف الدم الوراثي
Suspension	معلّق / عالق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t